



الفصل الدراسي الثاني

مؤسسة سما التعليمية

حولي مجمع بيروت الدور الأول

المادة

الرياضيات

الصف

العاشر

سما
SAMA

لطلب المذكرات
60084568


أ/ وليد حسين

للاشتراك بالمراجعات الحضورية
50855008



www.samakw.com


(أ) في الشكل المقابل دائرة مركزها و ، أ ب ، أ ج مماسان للدائرة عند ب ، ج
أ ب = ٤ سم ، و ب = ٣ سم ، ق (ب أ ج) = ٧٤°



أوجد :


- (١) ق (أ ب و)
- (٢) ق (ب و ج)
- (٣) محيط الشكل أ ب و ج

(أ) في الشكل المقابل م ل ، م ن مماسان للدائرة التي مركزها و
ق (ل و ن) = ١٢٠° ، م ل = ٨ سم ، ن ق = ٤ سم




أوجد مع ذكر السبب :

- ١- ق (ل م ن) .
- ٢- محيط الشكل ل م ن و .



ب) في الشكل المقابل دائرة مركزها و ، $\overline{AB}$ ، $\overline{AJ}$ قطعان مماسان للدائرة عند ب ، ج على الترتيب



و ، $\widehat{A} = 40^\circ$ ، $AJ = 6$ سم

أوجد (١) $\overline{AB}$

(٢) $\widehat{AJB}$

(٣) $\widehat{JHB}$

السؤال الأول : (١٢ درجات)



(أ) في الشكل المقابل :

دائرة مركزها و ، $\overline{OH} \perp \overline{MP}$ ،

و $\widehat{P} = 37^\circ$

أوجد : (١) طول $\overline{AP}$

(٢) $\widehat{B}$ و $\widehat{H}$



(أ) في الشكل المقابل :


دائرة مركزها و ، $\overline{AB}$ قطر فيها ، $\overline{PM}$ مماس للدائرة عند P ،

$$\angle BDP = 30^\circ$$

أوجد : (١) $\angle PAB$

(٢) $\angle PAB$

(٣) $\angle PAB$



(أ) في الشكل المقابل د ه مماسا للدائرة عند أ



$$\angle ADB = 30^\circ, \angle ADB = 45^\circ$$

أوجد مع ذكر السبب:


١- $\angle ADB$

٢- $\angle ADB$


٣- $\angle ADB$



في الشكل المقابل : دائرة مركزها و ، هـ ج مماس للدائرة عند ج ، ق (ب ج هـ) = ٢٨° ، أوجد كل من :



ق (أَبْج) ، ق (بْأَج) ، ق (أَذْب)




في الشكل المقابل : دائرة مركزها O ، إذا كان Q (ج ب أ) = 90°

أوجد كلاً مما يلي مع ذكر السبب :

(١) ق (أ ج ب)



(٢) ق (ج أ ب)


(٣) ق (ج د ب)



في الشكل المقابل: لدينا $\overleftrightarrow{DE}$ مماس للدائرة عند النقطة A . $\overline{AB}$ وتر في الدائرة مواز للمماس $\overleftrightarrow{DE}$.

اثبت ان المثلث AB ج متطابق الضلعين .






في الشكل المقابل و $(\angle DPC) = 40^\circ$ ، و $(\angle BPH) = 50^\circ$ ،


(١) أوجد قياسات زوايا المثلث P ب ج

(٢) أثبت أن جـ ب قطر للدائرة .



أ ب ج مثلث متطابق الضلعين حيث أ ، ب ، ج نقاط على الدائرة مركزها و .


و $(\angle BPC) = 40^\circ$ ، فأوجد قياس كل من $(\angle PAB)$ ، $(\angle PBC)$ ، $(\angle PCA)$.



في الشكل المقابل : دائرة مركزها م ، أ د مماس للدائرة عند النقطة د ، أ ج = ٣ سم ،

أ هـ = ٢ سم ، ج و = ٩ سم



أوجد كلاً من : أ د ، هـ م




في الشكل المقابل دائرة مركزها و ، طول نصف قطرها يساوي ٦ سم ،

أ م = ٥ سم ، ج م = ٣ سم .

أوجد طول $\overline{AB}$




في الشكل المقابل : $\overline{m}$ د قطعة مماسية حيث $m = 10$ ، $m = 5$ (٦ درجات)



أوجد بذكر السبب :

طول كلام من : م ج ، هـ ج

اذا كانت $\begin{bmatrix} 2 + 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 4 & 4 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ أوجد س، ص




إذا كانت $\begin{bmatrix} 4 & س \\ 6 & ١٢ \end{bmatrix}$ منفردة أوجد قيمة س.

(ب) إذا كانت: $\begin{bmatrix} ١ & ٠ \\ ٣ & ٢ \end{bmatrix} = \underline{\underline{أ}}$ ، $\begin{bmatrix} ٢ & ٢- \\ ٤- & ٥ \end{bmatrix} = \underline{\underline{ب}}$

أوجد:

(١) $\underline{\underline{أ}} - \underline{\underline{ب}}$ (٢) $\underline{\underline{ب}}^{-١}$ (٣) $\underline{\underline{ب}} \times \underline{\underline{ج}}$




$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{حل المعادلة : } 4 \text{ س} + 2$$

حل المعادلة المصفوفية التالية :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} - 2 \text{ س}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \overline{\text{س}} \times \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



حل النظام :
$$\left. \begin{array}{l} 5 \text{ س} + 3 \text{ ص} = 7 \\ 3 \text{ س} + 2 \text{ ص} = 5 \end{array} \right\}$$
 باستخدام النظير الضربي للمصفوفة .



حل النظام :
$$\left. \begin{array}{l} 3 \text{ س} + 2 \text{ ص} = -6 \\ 4 \text{ س} - 3 \text{ ص} = 7 \end{array} \right\}$$
 باستخدام طريقة كرامر .




$$\left. \begin{aligned} 5 &= 3ص + 7 \\ 3 &= 2ص + 5 \end{aligned} \right\} \text{اكتب نظام المعادلات}$$

على صورة المعادلة المصفوفية $P \times E = B$ حيث P هي مصفوفة المعاملات ، E هي مصفوفة المتغيرات ، B هي مصفوفة الثوابت . ثم حل نظام المعادلات (باستخدام النظير الضربي للمصفوفة أو باستخدام المحددات (قاعدة كرامر))

بسط كلاً من التعبيرات لأبسط صورة

$$\textcircled{أ} \quad \text{جا} (\pi^9 + \theta) = \text{جا} (\pi^8 + \theta + \pi) = \text{جا} (\pi + \theta)$$

$$\textcircled{ب} \quad \text{جتا} \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) = \text{جتا} \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right) = \text{جتا} \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right)$$




بسّط التعبير التالي لأبسط صورة :

$$\text{جاس} + \text{جا} (90^\circ + \text{س}) + \text{جا} (180^\circ + \text{س}) + \text{جا} (90^\circ - \text{س}) .$$

ب) ١ أثبت أن


$$\text{جا} (90^\circ + \text{س}) + \text{جتا} (180^\circ - \text{س}) + \text{جا} (270^\circ) + \text{جتا} (180^\circ) = -2$$



إذا كان $\theta = \frac{1}{4}$ ، $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ ، أوجد جتا θ ، ظا θ

بدون استخدام الآلة الحاسبة، إذا كان $\theta = \sqrt{2}$ جتا $\theta > 0$


فأوجد جتا θ ، جا θ ، قتا θ



حل المعادلة : $\sqrt{2x} - 3 = 1$

حل المعادلة : $\sqrt{2x} - 3 = 1$

حل المعادلة : $\sqrt{2x} - 3 = 1$



أثبت أن : $(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) - (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = 2$


أثبت أن : $\cos^2 \theta = \cos^2 \theta \times \cos^2 \theta + \sin^2 \theta$

$$\cos^2 \theta = \frac{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)}{\cos^2 \theta}$$

أثبت صحة المتطابقة :


$$\frac{1}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}$$

أثبت صحة



إذا كان أ (٤ ، ١٢) ، ب (٢٨ ، ٤) ويراد تقسيم $\overline{AB}$ من الداخل
من جهة أ في نقطة ج بنسبة ٢ : ٥ أوجد إحداثيات النقطة ج


أثبت أن النقاط (٢ ، -١) ، ب (-١ ، ٥) ، ج (٣ ، -٣) على استقامة واحدة.



اكتب معادلة الخط المستقيم يمر بالنقطتين ج (٣ ، ١) ، د (٢ ، ٢)

إذا كان المستقيم ل : $ص = ٢س + ١$
أوجد معادلة المستقيم ك العمودي على المستقيم ل ويمر بالنقطة (٤ ، ٣)


إذا كان المستقيم ك: $٣ص + س + ٣ = ٠$
فأوجد معادلة المستقيم ب العمودي على المستقيم ك والذي يمر بالنقطة (١ ، ٤).



إذا كان المستقيم ك : ص = ٥ س + ٣
أوجد معادلة المستقيم ل الموازي للمستقيم ك و الذي يمر بالنقطة (-٣ ، ٢)

أوجد البعد بين النقطة ط (٣ ، -٤) إلى المستقيم ل : ص = $\frac{٤}{٦}$ - $\frac{٣}{٦}$ س

أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (٨ ، ٠) على المستقيم: ٥ س + ١٢ ص = ٠




أوجد معادلة الدائرة التي مركزها (٣ ، ٤) وتمس محور الصادات .

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها : $٣٦ = ٢(٥ + ص) + ٢(٤ - س)$


عين مركز ونصف قطر الدائرة الممثلة بالمعادلة :

$$٢س^٢ + ٢ص^٢ - ١٢س - ٤ص - ٣٠ = ٠$$




سما SAMA أوجد معادلة الدائرة قطرهما $\overline{PQ}$ حيث $P(-3, 6)$ ، $Q(1, -2)$.

سما SAMA أوجد معادلة دائرة قطرهما $\overline{AB}$ حيث $A(4, -2)$ ، $B(2, 4)$




أوجد معادلة مماس دائرة معادلتها : (س - ٢)^٢ + (ص - ١)^٢ = ٢٥
عند النقطة م (٤ ، ٦)



إذا كان المستقيم ٢س - ٣ص = ١٠ مماس لدائرة مركزها (-٢، ٤). أوجد معادلة هذه الدائرة.

أوجد التباين والانحراف المعياري للقيم التالية : ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ٧ ، ٩




الانحراف المعياري لمجموعة قيم من بيانات هو $\sigma = 4$, ومجموعة مربعات انحرافات هذه القيم عن متوسطها الحسابي هو 480 . فما عدد قيم هذه البيانات ؟

إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة قيم من البيانات هو $\sigma = 6$ و كان $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 540$ فاوجد عدد القيم.

ما عدد اللجان المكون من شخصين والتي يمكن تكوينها من مجموعة من مجموعة من أربعة أشخاص ؟

يوجد ثلاثة مرشحين لمنصب الرئيس وأربعة مرشحين لمنصب نائب الرئيس . كم عدد الأزواج التي يمكن أن تكون من رئيس ونائب رئيس ؟



أوجد قيمة مايلي بدون استخدام الآلة الحاسبة : ${}^{10}P_3$ ، $\binom{7}{2}$


أوجد قيمة كل مما يلي :

8P_4 ${}^{14}C_6$

في لعبة "رمي حجري نرد منتظمين ومتميزين " والتجربة هي ملاحظة

الوجه العلوي لكل من الحجرين وكان الحدث ب " الحصول على مجموع أصغر من ١٣ "


ما احتمال وقوع الحدث ب ؟



في التمارين (١-٣)، عند رمي حجر نرد أحمر اللون وحجر نرد أخضر اللون معًا وملاحظة الوجه العلوي لهما.
فما النواتج الممكنة لهذا الحدث؟ وما احتمال ونوع كل حدث في ما يلي؟
(١) مجموع العددين الظاهرين أصغر من ١٠. (٢) العددين الظاهران عدداً فرديان.

إذا كان P ، B حدثين مستقلين وكان $P = 3, 0$ ، $L(B) = 4, 0$. أوجد كلا من:
(أ) $L(P \cup B) = L(B) \cdot L(\bar{P}) = (ج) L(P \cap B) =$

ليكن: $L(P) = 3, 0$ ، $L(B) = 7, 0$ ، $L(P \cup B) = 8, 0$. احسب:
(أ) $L(P \cap B) = L(B) \cdot L(P|B) =$




إذا كان A ، B حدثين في فضاء العينة وكان $A \cap B = \emptyset$ ، $A \cup B = \Omega$ ، $P(A) = 0.7$ ، $P(B) = 0.5$ ، $P(A \cap B) = 0.8$ ،
أوجد كلاً من: (أ) $P(A \cup B)$ (ب) $P(\bar{A})$





في فضاء العينة Ω لدينا حدثان A ، B متنافيان حيث: $P(A) = 0.4$ ، $P(B) = 0.5$ ،
أوجد كلاً من: (أ) $P(A \cup B)$ (ب) $P(\overline{A \cup B})$


ليكن A ، B حدثان مستقلان في فضاء عينة Ω حيث $P(A) = 0.2$ ، $P(B) = 0.7$ ،
احسب:





(أ) $P(A \cap B)$ (ب) $P(B|A)$ (ج) $P(A \cup B)$




ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة أو ب إذا كانت خاطئة.

✓	القطر العمودي على وتر في دائرة ينصفه وينصف كلا من قوسيه .	١
✗	 في الشكل المقابل : إذا كان $\angle P = 80^\circ$ فإن $\angle AOB = 80^\circ$.	٢
✓	كل زاويتين محيطيتين في دائرة تحصران القوس نفسه متطابقتان .	٣
✗	 في الشكل المقابل $\overleftrightarrow{AB}$ يكون مماسًا للدائرة عند ب $\angle AOB = 60^\circ$.	٤
✗	 في الشكل المقابل : دائرة داخلية للمثلث أ ب ج ، إذا كان المثلث أ ب ج متطابق الأضلاع ، ب د = ١٠ سم فإن محيط المثلث أ ب ج يساوي ٤٥ سم	٥
✓	كل ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة تمر بها دائرة واحدة .	٦
✓	إذا كان طول قطر دائرة يساوي ٢٠ سم وطول أحد أوتارها ١٦ سم فإن البعد بين مركز الدائرة وذلك الوتر هو ٦ سم	٧
✓	القطر العمودي على وتر في الدائرة ينصفه	٨
✓	 دائرتان مركزاهما على الترتيب أ ، ب تتقاطعان بالنقطتين ج ، د . وطول نصف قطر كل دائرة ٦ سم . فإن طول أ ب يساوي ٨ سم .	٩



	١٠ قياس الزاوية المركزية يساوي نصف قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس	١٠
ساما SAMA	١١ في الشكل المقابل دائرة مركزها و ، ص ن ، ع ل وترين متقاطعين فيها كما هو موضح في الشكل فإن قيمة س =  ١٥ (ب) ٢٢ (أ) ١٢ (د) ٨ (ج)	١١
ساما SAMA	١٢ في الشكل المقابل دائرة مركزها و ، د ه مماس لها عند النقطة م ، و (ه م ب) = ٤٥° ، و (م ب ج) = ٣٥° فإن و (ج م ب) =  (ب) ٨٠° (أ) ٧٠° (د) ١٠٠° (ج) ٩٠°	١٢
ساما SAMA	١٣ من الشكل المقابل : إذا كان ق (أ ب) = ٧٢° ، ق (ب ج ه) = ٥١° فإن ق (أ ه) =  (أ) ٣٠° (ب) ٦٨° (ج) ٧٢° (د) ١٠٢°	١٣
ساما SAMA	١٤ في الشكل المقابل العبارة الخاطئة فيما يلي هي:  (أ) ج = د (ب) ب = ٢ (ج) ج = ٢ + ه (د) د = ه	١٤





إذا كان $\widehat{DB}$ ، دج مماسان للدائرة. فإن $\widehat{S} =$

SAMA


(د) ١١٤°

(ج) ٦٦°

(ب) ٥٧°

(أ) ٢٦°

١٥



في الشكل المقابل، قيمة كل من $\widehat{S}$ ، ص على الترتيب هما:

(ب) ٣٥، ٧٠°

(أ) ١٤٠، ٢٨٠°


(د) ٧٠، ١٤٠°

(ج) ٤٠، ١٤٠°

مذكرات قلب الأم

قلب الأم رياضيات

١٦



١ في الشكل المقابل، إذا كان $\widehat{D} = ١٤٠^\circ$ ، فإن $\widehat{B} =$ (ج) =


(د) ١٢٤°

(ج) ٥٦°

(ب) ٥٠°

(أ) ٧٠°

١٧



في الشكل المقابل، إذا كان $\widehat{B} = ٧٢^\circ$ ، $\widehat{D} = ٥١^\circ$.

فإن قياس القوس $\widehat{H} =$

(د) ٦٨°

(ج) ٧٢°


(ب) ١٠٢°


(أ) ٣٠°

١٨

مذكرات قلب الأم


قلب الأم رياضيات






في الشكل المقابل إذا كان M مركز الدائرة ، $AB = 12$ سم
 $MD = 12$ ، فإن طول $AB =$

- ٦ سم (ب) ١٢ سم (ج) ٢٤ سم (د) ٣٦ سم




في الشكل المقابل : إذا كان $\widehat{DAB} = 60^\circ$ ، $\widehat{CAB} = 70^\circ$ ، فإن $\widehat{CDB} =$

- ٥٠° (أ) ٦٠° (ب) ٧٠° (ج) ١٣٠° (د)



في الشكل المقابل دائرة مركزها A ونصف قطرها ٨ سم ،
 إذا كان D مماس للدائرة عند B ، $AD = 9$ سم ، فإن $AB =$




- ٨ سم (أ) ٩ سم (ب) ١٥ سم (ج) ١٧ سم (د)



في الشكل المقابل دائرة مركزها O ، E منتصف AB ، $AB = 6$ سم
 و $OE = 4$ سم ، طول نصف قطر الدائرة يساوي

- ١٠ سم (أ) ٦ سم (ب) ٥ سم (ج) ٤ سم (د)




٢٣ في الشكل المقابل : $\overline{AB}$ قطري الدائرة التي مركزها O ، $\angle AOM$ يساوي  ☐ أ ٤٥° ☐ ب ١٨٠° ☒ ج ٥٦° ☐ د ٥٩°	
٢٤ في الشكل المقابل : دائرة مركزها M محيط المثلث ABC يساوي:  ☐ أ ٤٣ ☐ ب ٦٦ ☒ ج ٥٦ ☐ د ٧٠	
٢٥ في الشكل المقابل : إذا كان $\overleftrightarrow{AD}$ مماس للدائرة عند D حيث O مركز الدائرة ، فإن قيمة $\angle S$ تساوي :  ☐ أ ٥٢° ☐ ب ٩٠° ☒ ج ٣٨° ☐ د ١٢٨°	
٢٦ إذا كان طول قطر دائرة يساوي ٢٥ سم وطول أحد أوتارها ١٦ سم فإن البعد بين مركز الدائرة والوتر هو تقريباً: ☐ أ ٩ سم ☒ ب ٩,٦ سم ☐ ج ١٨ سم ☐ د ١٩,٢ سم	



في الشكل المقابل : دائرة مركزها و ، و هـ = ٣ سم ،

هـ منتصف جد ، ون $\perp$ أب ، فإذا كان أب = ٨ سم
فإن طول نصف قطر الدائرة يساوي :



١ (أ) ٤ سم (ب) ٥ سم (ج) ١١ سم (د) ٢٥ سم

✓	إذا كانت $\underline{ب} = \begin{bmatrix} ٤ & ٣- \\ ٥- & ٢ \end{bmatrix}$ فإن $\underline{ب} = ٧$	٢٨
✓	إذا كانت المصفوفة $\begin{bmatrix} ٤ & س \\ ٦ & ١٢ \end{bmatrix}$ مفردة فإن قيمة $س = ٨$	٢٩
✓	إذا كانت المصفوفة $\begin{bmatrix} ٢ & س \\ ٤ & ٨ \end{bmatrix}$ مفردة فإن $س = ٤$	٣٠
✗	إذا كانت المصفوفة $\underline{أ} = \begin{bmatrix} ٤ & ٣ \\ س & ٦ \end{bmatrix}$ مفردة ، فإن قيمة $س$ هي $٨-$	٣٢
✓	المصفوفة $\begin{bmatrix} ١- & ٢ \\ ١ & ٣- \end{bmatrix}$ هي النظير الضربي للمصفوفة $\begin{bmatrix} ١- & ١- \\ ٢- & ٣- \end{bmatrix}$	٣٢
✓	للمصفوفة $\underline{ج} = \begin{bmatrix} ٠ & ٤- \\ ٢- & ٨ \end{bmatrix}$ نظير ضربي.	٣٣
✗	إذا كانت $\begin{bmatrix} ٣ & ١-س \\ ٤ & ٢- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ & ٢ \\ ٤ & ٢- \end{bmatrix}$ فإن $س = ٢$	٣٤
✓	إذا كانت $\underline{أ} \text{ } ٤ \times ٢$ ، $\underline{ب} \text{ } ٢ \times ٤$ فإن رتبة المصفوفة $\underline{أ} \times \underline{ب}$ هي ٢×٢	٣٤


35	لاي مصفوفتين $\underline{P}$ ، $\underline{B}$ يكون $\underline{P} \times \underline{B} = \underline{B} \times \underline{P}$	✓
36	إذا كانت $\underline{A} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ، $\underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ وكان $\underline{A} \times \underline{B} = \underline{B}$ فإن $\underline{B}$ من الرتبة 1×1	✗
37	إذا كانت $\underline{A}$ 3×2 ، $\underline{B}$ 2×4 فإن رتبة المصفوفة $\underline{A} \times \underline{B}$ هي 2×2	✗

38	إذا كان $\underline{P} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ، $\underline{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ فإن $\underline{P} \times \underline{B} =$	
39	إذا كانت $\underline{P} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ، $\underline{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ فإن $\underline{P} + \underline{B} =$	
40	إذا كانت $\underline{B} = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ منفردة فإن S تساوي :	
41	إذا كانت المصفوفة $\underline{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ فإن $\underline{A}^{-1} =$	
42	إذا كانت $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ فإن $S =$	



٤٣	محدد المصفوفة $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ هو	١ (أ) ٥ (ب) ١- (ج) ٧ (د)
٤٤	إذا كانت $\begin{bmatrix} 4 & 25 \\ 8+ص & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5-س \\ 2+ص & 3 \end{bmatrix}$ فإن قيمة س و ص على الترتيب هي:	١ (أ) ٣ ، ١٥ (ب) ٤ ، ١٢ (ج) ٣- ، ١٥- (د) ٤- ، ١٢
٤٥	إذا كانت $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ فإن $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} =$	١ (أ) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
٤٦	حل المعادلة المصفوفية : $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ - س هو :	١ (أ) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

✓	جنا $٢٤٠^\circ = -\frac{1}{2}$	٤٧
✗	إذا كانت $٣١٥^\circ = (\hat{A})$ فإن $\theta < ٠$	٤٨
✗	جا $(١٢٠^\circ) = \frac{1}{3}$	٤٩
✓	$١ + \text{ظنا}^2 \theta = \text{قتا}^2 \theta$	٥٠



✓	قأ $\sqrt{2} = (0315)$	٥١
✗	إذا كانت ظا $\theta = 3$ فإن ظتا $(\theta + \pi) = 3$	٥٢
✓	مجموعة حل قاس $\theta = 3$ هي $\emptyset$	٥٣
✗	جا $\theta^2 - \theta \text{جتا} = 1 - 1$	٥٤

حل المعادلة ظا $\theta = \sqrt{3}$ حيث $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ هو	٥٥
☒ أ $\frac{\pi}{3}$ ☐ ب $\frac{\pi}{2}$ ☐ ج $\frac{\pi}{6}$ ☐ د $\frac{\pi}{4}$	
إن قيمة المقدار : جتا $(\theta - \pi^2) \times$ جا $(\theta + \frac{\pi}{2}) -$ جتا $(\theta + \frac{\pi}{2})$ جا θ هي :	٥٦
☐ أ $1 -$ ☐ ب صفر ☐ ج $\frac{1}{2}$ ☒ د 1	
الزاوية التي في الوضع القياسي و قياس زاوية إسنادها يساوي 30° هي :	٥٧
☐ أ 120° ☐ ب 150° ☐ ج 130° ☐ د 300°	
الزاوية التي في الوضع القياسي و قياس زاوية إسنادها تختلف عن الزوايا الأخرى هي :	٥٨
☐ أ 190° ☐ ب 170° ☒ د 110° ☐ ج 350°	




٥٩	الزاوية التي في الوضع القياسي وقياس زاوية إسنادها $\frac{\pi}{3}$ هي:	(أ) $\frac{\pi 11}{6}$ (ج) $\frac{\pi 7}{8}$	(ب) ٥٢٥٥ (د) $\frac{\pi 5}{3}$
٦٠	$[\text{جا}(-١٣٥^\circ)]^2 + [\text{جتا}(-١٣٥^\circ)]^2 =$	(أ) ١ (ج) $\frac{1}{4}$	(ب) $\frac{1}{2}$ (د) صفر
٦١	إن قيمة المقدار $\text{قا}(\theta - \pi 2) - \text{قتا}(\theta + \frac{\pi}{2}) + \text{جتا}(\theta + \frac{\pi}{2}) + \text{جا}\theta$ هي:	(أ) ١ - (ب) صفر (ج) $\frac{1}{2}$ (د) ١	
٦٢	إذا كانت $\text{جتا}\theta = -\frac{5}{7}$ ، θ تقع في الربع الثالث. فإن $\text{جا}\theta =$	(أ) $\frac{7-}{\sqrt{72}}$ (ج) $\frac{\sqrt{72}-}{7}$	(ب) $\frac{\sqrt{72}}{7}$ (د) $\frac{7}{\sqrt{72}}$
٦٣	جاس × قاس يساوي:	١ ظتاس ٢ ظاس ٣ قتاس ٤ قاس	
٦٤	النسبة المثلثية في مايلي التي قيمتها $(\frac{1}{2})$ هي :	١ جا (-٣٣٠°) ٢ جتا (-٢٤٠°) ٣ ظتا (-١٥٠°) ٤ ظا (٧٦٥°)	
٦٥	الزاوية التي يقع ضلعها النهائي في الربع الرابع في مايلي هي:	(أ) -٣٢٠° (ب) -٢٧٠° (ج) $\frac{\pi 5}{3}$ (د) $\frac{\pi 13}{9}$	

٦٦	إذا كانت $\theta = \frac{3}{2}$ ، θ تقع في الربع الرابع. فإن $\theta =$
(أ) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$	(ب) $\frac{2}{5\sqrt{2}}$
(ج) $\frac{2-\sqrt{2}}{5\sqrt{2}}$	(د) $\frac{5\sqrt{2}-2}{2}$

الهندسة الاحداثية

٦٧	إن ميل المستقيم الذي يمر بالربع الثالث ونقطة الأصل هو دائماً سالب.	✗
٦٨	المستقيم الذي ميله يساوي ١ دائماً يمر بنقطة الأصل.	✗
٦٩	بعد النقطة (٠ ، ٠) عن المستقيم الذي معادلته $ص = ٤$ يساوي	
٧٠	معادلة المستقيم المار بالنقطة (٣ ، ٢) و يوازي المستقيم $س = ٠$ هي :	
٧١	معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (٣ ، ٢) و تمس محور الصادات هي :	
٧٢	طول نصف قطر الدائرة التي معادلتها : $(س - ١) + (ص + ١) = ٤$ هو :	
٧٣	نصف قطر الدائرة التي معادلتها : $٢س + ٢ص - ١٢ = ٠$ هو :	



٧٤	النقطة التي تنتمي للمستقيم ٣ ص - س + ١ = ٠ هي:	١ (٣ ، ٣) ٢ (٠ ، ٢) ٣ (٢ ، ٠) ٤ (١ ، ٤)
٧٥	المسافة بين النقطتين ك (٠ ، ٤) ، ل (٣ ، ٠) بوحدات الطول تساوي:	١ ٥ ٢ ٦ ٣ ٧ ٤ ٨
٧٦	البعد بين نقطة الأصل والمستقيم ٤ ص = ٣ س + ٥ يساوي :	١ ١ - ٢ ١ - ٣ ٤ - ٥
٧٧	احداثي منتصف المسافة بين النقطتين (٠ ، ٢) ، (٤ ، ٠) هو	١ (٤ ، ٢) ٢ (٢ ، ١) ٣ (١ ، ١) ٤ (٢ ، ٤)
٧٨	معادلة المستقيم المار بالنقطة (٤ ، ٥) ويوازي المستقيم ص = ٠ هي :	١ س = ٤ ٢ ص = ٥ ٣ ص = ٤ ٤ س = ٥

٧٩	إذا كان ل، ب حدثين في فضاء العينة وكان ل (٢) ، ٧ = (ب) ، ٥ = (ب) ، ٠ ، ٨ = (ب ∪ ل) فإن ل (ب ∩ ل) =	١ (أ) ٠ ، ٢ ٢ (ب) ٠ ، ٤ ٣ (ج) ٠ ، ٦ ٤ (د) ١ ، ٢
٨٠	إذا كان أ ، ب حدثين مستقلين في فضاء العينة وكان ل (أ) ، ٦ = (ب) ، ٤ = (ب ∩ أ) فإن ل (أ ∪ ب) =	١ (أ) ٠ ، ٢ ٢ (ب) ٠ ، ٤ ٣ (ج) ٠ ، ٦ ٤ (د) ١
٨١	إذا كان ل، ب حدثين مستقلين وكان ل (٢) ، ٢ = (ب) ، ٥ = (ب ∪ ل) فإن ل (ب ∩ ل) =	١ (أ) ٠ ، ٥ ٢ (ب) ٠ ، ٧ ٣ (ج) ٠ ، ٨ ٤ (د) ٠ ، ٦

٨٢	عدد طرق اختيار رئيس ، نائب رئيس ، أمين سر من بين ٦ أعضاء في نادي الرياضيات هو : ١ ٣٠ ٢ ١٢٠ ٣ ١٨٠ ٤ ٢٠
٨٣	إذا كان ب حدث في فضاء العينة ف وكان ل (ب) = ٠,٤ ، فإن ل (ب̄) = ١ ١ ٢ ٠,٠٦ ٣ ٠,٦ ٤ ٦
٨٤	إذا كان ل، ب حدثين مستقلين في فضاء العينة وكان ل (ب) = ٠,٦ ، ل (ب̄) = ٠,٤ فإن ل (ب ل) = ١ ٠,٦ ٢ ٠,٤ ٣ ٠,٢ ٤ ١
٨٥	إذا كانت أ، ب حدثين و كان ل (ب أ) = ٠,٢ ، ل (أ) = ٠,٥ فإن ل (أ ∩ ب) = ١ ٠,٥ ٢ ٠,١ ٣ ٠,٢ ٤ ٠,٢٥
٨٦	في البيانات: ١٠، ١٣، ٩، ٧، ١٢، ١٥ الانحراف المعياري هو: ١ ٧ ٢ ٦ ٣ ٦ ٤ ٦
٨٧	إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة قيم بيانات يساوي ٤ ومجموع مربعات انحرافات قيم البيانات عن متوسطها الحسابي يساوي ١٩٢ فإن عدد قيم هذه البيانات هو: ١ ١٦ ٢ ٤٨ ٣ ١٢ ٤ ٦
٨٨	إذا كان التباين لمجموعة قيم من بيانات هو $\sigma^2 = ٣٦$ و مجموع مربعات انحرافات القيم عن متوسطها الحسابي هو ٥٤٠ فإن عدد قيم هذه البيانات يساوي : ١ ١٥ ٢ ٩٠ ٣ ٥٠٤ ٤ ٥٧٦
٨٩	إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة قيم بيانات يساوي ٤ ومجموع مربعات انحرافات قيم هذه البيانات عن متوسطها الحسابي يساوي ١٩٢ فإن عدد قيم هذه البيانات هو : ١ ١٢ ٢ ١٦ ٣ ٤٨ ٤ ٦

٩٠	$\binom{n}{n} \times n!$	سما	١
٩١	2^n	١٢٠	٦٠

قلب الأم رياضيات ساما SAMA مذكرات قلب الأم	١	٢	٣	٤
١	٢	٣	٤	٥

ساما
SAMA

ساما
SAMA

