

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



ملفات الكويت
التعليمية

com.kwedufiles.www/:https

* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/10>

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة فизياء ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/10physics>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة فизياء الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/10physics1>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف العاشر اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade10>

* لتحميل جميع ملفات المدرس يوسف عزمي اضغط هنا

bot_kwlinks/me.t//:https للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف العاشر على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام



وزارة التربية
منطقة حولي التعليمية
ثانوية فهد الدويري بنين

قسم الفيزياء و الكيمياء

أوراق عمل

فيزياء الصف العاشر (10)


الفصل الدراسي الأول

العام الدراسي 2018 / 2017

٢٣

اسم الطالب /

الصف /



الوحدة الأولى : الحركة

التاريخ :/...../.....

الفصل الأول : الحركة في خط مستقيم**الدرس (1-1) : مفهوم الحركة والكميات الفيزيائية المازمة لوصفها**تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة إلى موضع جسم آخر ساكن

.....
.....
.....




الجسم الذي يحتفظ بمسافة ثابتة بالنسبة للنقطة المرجعية

.....
.....
.....

الجسم الذي تتغير مسافته بالنسبة للنقطة المرجعية

.....
.....
.....

الحركة الدورية	الحركة الانتقالية	وجه المقارنة
.....	التعريف
.....	أمثلة



الحركة الدائرية المنتظمة

الحركة في خط مستقيم

الحركة الاهتزازية

الكميات المشتقة

الكميات الأساسية

وجه المقارنة

التعريف

أمثلة

الكميات المشتقة	الكميات الأساسية	وجه المقارنة
.....	التعريف
.....	أمثلة

١- حركة المقذوفات حركة انتقالية بينما حركة البندول البسيط حركة دورية .

٢- الطول من الكميات الأساسية بينما السرعة من الكميات المشتقة .

٣- حصان سباق يعتبر جسم متحرك بالنسبة لمراقب يجلس في مضمار السباق.

رمز الوحدة	وحدة القياس	رمز الكمية	الكميات الأساسية
.....	(Meter)	الطول (Length)
.....	(Kilo gram)	الكتلة (mass)
.....	(Second)	الزمن (time)

الكميات الأساسية والكميات المشتقة

التاريخ : / /

مقارنة مقدار معين بمقدار آخر من نوعه أو كمية بكمية أخرى من نوعها


** نظام القياس في معظم أنحاء العالم هو

1- قياس الطول :

$\frac{1}{3 \times 10^8}$ من الثانية المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال زمن


*** أدوات قياس الطول :**

الاستخدام	الأداة
.....	1- المسطرة المترية
.....	2- الميكرو متر
.....	3- القدمة ذات الورنية



و الأطوال الصغيرة نستخدم

أستنتج :



15 km = cm

50 cm = m

120 mm = m

2 m = km


أستنتج :

2- قياس الكتلة :


كتلة اسطوانة من سبيكة البلاتين والايريديوم قطرها (39 mm) ارتفاعها (39 mm)

*** أدوات قياس الكتلة :**

الاستخدام	الأداة
.....	1- الميزان ذو الكفتين
.....	2- الميزان الكهربائي



كيلو جرام (kg)



$$400 \text{ g} = \dots \text{ kg}$$

$$5 \text{ kg} = \dots \text{ g}$$

$$300 \text{ g} = \dots \text{ mg}$$

$$2000 \text{ mg} = \dots \text{ kg}$$

أستنتج :

3- قياس الزمن :

الزمن اللازم للموجات الكهرومغناطيسية (الضوء) لقطع $m = 10^8 \times 3$ في الفراغ

أو زمن (9×10^9) ذبذبة من ذرة السيريوم

* أدوات قياس الزمن :

الاستخدام	الأداة
.....	1- ساعة الإيقاف اليدوية
.....	2- ساعة الإيقاف الكهربائية
.....	3- الوماض الضوئي



ساعة (h)

(min)

ثانية (s)

X 60

X 60

$$1 \text{ h} = \dots \text{ min}$$

$$1 \text{ h} = \dots \text{ s}$$

$$1 \text{ min} = \dots \text{ s}$$

$$7200 \text{ s} = \dots \text{ h}$$

أستنتاج :

ساعة الإيقاف الكهربائية أكثر دقة من ساعة الإيقاف اليدوية .

علل :

الوحدة الدولية	معادلة الأبعاد (الأبعاد الثلاثة للكميات الفيزيائية)	الكميات الفيزيائية المشتقة
.....	1- المساحة = (الطول x الطول)
.....	2- الحجم = (الطول x الطول x الطول)
.....	3- السرعة = (المسافة / الزمن)
.....	4- العجلة = (السرعة / الزمن)

لكي نضيف أو نطرح كميتين فيزيائيتين يجب أن يكون لهما

أستنتاج :

لا نستطيع إضافة أو طرح القوة مع السرعة .

علل :

** إجراء الدرس العلمي (1) في الكتاب العلمي : استخدام أدوات القياس الدقيقة

الكميات العددية والكميات المتجهة

التاريخ : / /

الكميات المتجهة	الكميات العددية (القياسية)	وجه المقارنة
.....	التعريف
.....	أمثلة


علل : المسافة كمية عددية بينما الإزاحة كمية متجهة .

علل :

الكميات العددية**طول المسار المقطوع أثناء الحركة من موضع إلى آخر**

-2

-1

عوامل الوصف الكمي للحركة**المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن**

$$V = \frac{d}{t}$$

← $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \text{السرعة}$

- 1- وحدات قياس السرعة :
 (m/s) = (km/h) 2- وحدة ← أستنتج :

السرعة العددية المتغيرة	السرعة العددية المنتظمة (الثابتة)
.....

ما المقصود بأن : 1- سرعة سيارة تساوي (15 m/s) .2- سرعة سيارة تساوي (80 km/h) .



مثال 1 : دخل قطار طوله (150 m) نفق طوله (L) فاستغرق زمان (S) وكانت سرعته تساوي (90 km/h) . أحسب :

أ- المسافة التي قطعها القطار .

ب- طول النفق .

تابع الكميّات العدديّة


التاريخ : / /

4- السرعة الحظية :	3- السرعة المتوسطة :	
$V = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{\text{التغيير في المسافة}}{\text{التغيير في الزمن}}$	$\bar{V} = \frac{d_{total}}{t_{total}} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$	القانون
.....	التعريف
		الرسم البياني
<u>ميل منحنى (المسافة - الزمن) يمثل :</u>	<u>ميل منحنى (المسافة - الزمن) يمثل :</u>	

قد تتساوى السرعة المتوسطة أحياناً مع السرعة الحظية وقد لا تتساوى


علل :

سؤال : صفات حركة الجسم من خلال الأشكال التالية :



مثال 2 : قطع لاعب على دراجته مسافة (72 km) في زمن قدره ساعتان . أحسب السرعة المتوسطة للدراجة ؟


مثال 3 : احسب السرعة المتوسطة لسيارة إذا كانت قراءة عداد المسافات عند بدأ الحركة صفر و بعد نصف ساعة كانت 36 km .



مثال 4 : المنحنى البياني المجاور يمثل منحنى (المسافة - الزمن) لسيارة متحركة . أجب :

أ) ميل المنحنى يمثل :

ب) ميل المنحنى يساوي :

**الكميات المتجهة**

التاريخ : / /

المسافة في خط مستقيم في اتجاه معين**أو أقصر خط مستقيم من نقطة بداية الحركة إلى نقطة النهاية**

** تتساوي المسافة والإزاحة عندما يتحرك الجسم في

** إذا تحرك الجسم على محيط الدائرة دورة كاملة فإن الإزاحة تساوي

السرعة العددية في اتجاه محدد

السرعة المتجهة المتغيرة	السرعة المتجهة المنتظمة
.....

سيارة تسير في مسار منحني بسرعة عددي ثابتة فتكون سرعتها المتجهة بسبب
تعتبر السرعة المتجهة كمية متجهة .

استنتج :

علل :

كمية فيزيائية تعبر عن تغير متجه السرعة خلال وحدة الزمن

$$a = \frac{V - V_0}{t}$$


←—————→

السرعة النهائية - السرعة الابتدائية = العجلة
التغير في الزمن

وحدة قياس العجلة هي

استنتاج :

عجلة سالبة (تباطؤ)	عجلة موجبة (تسارع)
تكون <u>تناقصية</u> بسبب	تكون <u>تزايدية</u> بسبب

1- الجسم بدأ الحركة من السكون فإن

a = و v_0 =

2- الجسم توقف فإن

3- في الشكل : العجلة تساوي بسبب

استنتاج

1- العجلة كمية متجهة .

علل لما يأتي :

2- العجلة كمية مشتقة .

3- خطورة الحركة بعجلة موجبة .

4- ارتداء ملابس خاصة لمن يقود مركبة تتحرك بعجلة موجبة .

5- يفقد قائد الطائرات النفاثة وكذلك رواد الفضاء وعيهم لفترة زمنية معينة .



6- يتحرك جسمك في اتجاه معاكس لاتجاه انحصار الطريق عندما تكون داخل سيارة تسير بسرعة ثابتة .

7- يصبح تسارع الجسم صفرًا عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة .

ما المقصود بأن : 1- العجلة التي تتحرك بها السيارة تساوي (5 m / s²) .

2- العجلة التي تتحرك بها السيارة تساوي (- 4 m / s²) .


سؤال : أرسم المنحنيات أو الخطوط البيانية الدالة على المطلوب بين العلاقات التالية :



مثال 1 : المنحنى البياني المجاور يمثل منحنى (السرعة - الزمن) لسيارة متحركة : أجب

أ) ميل المنحنى يمثل :

ب) ميل المنحنى يساوي :




مثال 2 : في الشكل : الخطان البيانيان (A , B) يمثلان علاقة (السرعة - الزمن) لسيارتين :

أي في السيارات له عجلة أكبر . ولماذا ؟ ← السيارة :

السبب :

التاريخ :/...../..... الدرس (1 - 2) : معادلات الحركة المعجلة في خط مستقيم

الحركة المعجلة في خط مستقيم	الحركة المعجلة
.....

علاقة السرعة النهائية بالازاحة والوحدة $V^2 = V_0^2 + 2 ad$	علاقة الإزاحة بالزمن والوحدة $d = V_0 t + \frac{1}{2} at^2$	علاقة السرعة النهائية بالزمن والوحدة $V = V_0 + at$
 <p>** مربع السرعة و الإزاحة لجسم بدأ حركته من السكون الميل يمثل</p>	 <p>** الإزاحة و مربع الزمن لجسم بدأ حركته من السكون الميل يمثل</p>	 <p>** السرعة النهائية و الزمن لجسم بدأ حركته من السكون الميل يمثل</p>
 <p>** مربع السرعة و الإزاحة لجسم سرعته الابتدائية (V_0) الميل يمثل</p>	 <p>** الإزاحة و مربع الزمن لجسم سرعته الابتدائية (V_0) الميل يمثل</p>	 <p>** السرعة النهائية و الزمن لجسم سرعته الابتدائية (V_0) الميل يمثل</p>
	<p>* الإزاحة التي يقطعها جسم بدأ حركته من السكون بعجلة منتظمة تتناسب طردياً مع</p>	<p>* السرعة التي يتحرك بها جسم بدأ حركته من السكون بعجلة منتظمة تتناسب طردياً مع</p>

الزمن اللازم لكي تقل السرعة النهائية حتى تصل إلى الصفر

..... 1- يمكن حساب زمن التوقف من العلاقة :

أستنتج :

..... 2- العوامل التي يتوقف عليها زمن التوقف

$V = V_0 + at$	1- حساب السرعة النهائية بدلالة الزمن
$V^2 = V_0^2 + 2ad$	2- حساب السرعة النهائية بدلالة المسافة
$d = V_0 t + \frac{1}{2} at^2$	3- حساب المسافة بدلالة الزمن
$d = \frac{V^2 - V_0^2}{2a}$	4- حساب المسافة بدلالة السرعة النهائية
$a = \frac{V - V_0}{t}$	5- حساب العجلة بدلالة الزمن
$a = \frac{V^2 - V_0^2}{2d}$	6- حساب العجلة بدلالة السرعة النهائية
$t = \frac{V - V_0}{a}$	7- حساب الزمن بدلالة السرعة النهائية

مثال 1 : أحسب سرعة متزلج بعد (3 s) من انطلاقه من السكون بعجلة (5 m/s^2) .

مثال 2 : سيارة بدأت حركتها من السكون و بعد (5 s) أصبحت سرعتها (90 km/h) أحسب عجلة السيارة و حدد نوعها .

مثال 3 : سيارة تسير بسرعة (72 km/h) ثم توقفت السيارة بعد مرور (10 s) . أحسب عجلة السيارة و حدد نوعها .

مثال 4 : قطار يتحرك بسرعة (50 m/s) بعجلة منتظمة سالبة (4 m/s) . أحسب : أ) الزمن اللازم لتوقف القطار .

ب) إزاحة القطار حتى يتوقف .

مثال 5 : سيارة تتحرك بسرعة (30 m/s) وقد قرر السائق تخفيض السرعة إلى النصف مستخدماً عجلة منتظمة سالبة (3 m/s)

أ) أحسب الزمن اللازم لتخفيض السرعة إلى السرعة المطلوبة .

ب) أحسب المسافة التي تقطعها السيارة حتى تصل إلى هذه السرعة .

تابع معادلات الحركة الموجة في خط مستقيم

التاريخ : / /

مثال 6 : يتحرك جسم في خط مستقيم طبقاً للعلاقة $d = 12t + 8t^2$ أحسب :

أ) السرعة الابتدائية للجسم .

ب) العجلة التي يتحرك بها الجسم و ما نوعها .

ج) المسافة التي يقطعها الجسم خلال (4) ثواني .

مثال 7 : قاص أطلق رصاصة تتحرك في خط مستقيم بسرعة 30 m/s فأصابت الهدف وغاصت مسافة مقدارها (45 m)

أ) العجلة التي تتحرك بها الرصاصة أثناء تحركها داخل الهدف .

ب) الزمن الذي تستغرقه الرصاصة حتى تتوقف .

مثال 8 : يبدأ راكب دراجة حركته من السكون بعجلة منتظمة قدرها 3 m/s^2 فلكي تصل سرعته إلى (30 m/s) . أحسب :

أ) المسافة المقطوعة .

ب) الزمن اللازم للوصول لهذه السرعة .


مثال 9 : يمثل الرسم البياني المقابل العلاقة بين (السرعة - الزمن) لسيارة متحركة و المطلوب حساب :

أ) المسافة التي تقطعها السيارة بين ($S = 2 - 0$) .

ب) المسافة التي تقطعها السيارة بين ($S = 4 - 2$) .

ج) السرعة المتوسطة للسيارة .

**** إجراء الدرس العملي (2) في الكتاب العملي :** تعين العجلة التي يتحرك بها جسم ما




الدرس (3 - 1) : السقوط الحر


التاريخ : / /

حركة جسم بدون سرعة ابتدائية بتأثير ثقله مع إهمال مقاومة الهواءالعجلة التي تسقط بها الأجسام سقوطاً حرّاً مع إهمال مقاومة الهواءملاحظة : يرمز لعجلة الجاذبية الأرضية بالرمز (g) وتساوي تقريرياً (10 m/s^2)


علاقة سرعة السقوط بمسافة السقوط	علاقة مسافة السقوط بزمن السقوط	علاقة سرعة السقوط بزمن السقوط
$V^2 = V_0^2 + 2gd$	$d = V_0t + \frac{1}{2}gt^2$	$V = V_0 + gt$




** مربع سرعة السقوط ومسافة السقوط
الميل يمثل
.....



** مسافة السقوط ومربيع زمن السقوط
الميل يمثل
.....



** سرعة السقوط وزمن السقوط
الميل يمثل
.....



مسافة السقوط والزمن
أثناء السقوط الحر

الجسم يسقط سقوطاً حرّاً لأسفل فإن
الجسم يقذف راسياً لأعلى فإن
.....

الزمن اللازم لوصول الجسم من أقصى ارتفاع إلى الأرض

يحسب زمن السقوط من العلاقة :
استنتاج :

مجموع زمن السقوط و زمن الصعود

** زمن التحليق = +

** يمكن حساب زمن التحليق من خلال حساب زمن السقوط فقط لأن
.....

الشكل المقابل يمثل قطعة معدنية وريشة في أنبوب زجاجي :

نشاط

1- ماذا يحدث عند إسقاطهما معاً من نفس الارتفاع في وجود الهواء .


الملاحظة :
.....

الاستنتاج :
.....

2- عند تكرار النشاط مرة أخرى مع تفريغ الهواء داخل الأنبوب .

الملاحظة :
.....

الاستنتاج :
.....



التاريخ : / /


تابع السقوط الحر

$V = V_0 + gt$	1- حساب سرعة السقوط بدلالة زمن السقوط
$V^2 = V_0^2 + 2gd$	2- حساب السرعة النهائية بدلالة مسافة السقوط
$d = V_0 t + \frac{1}{2} g t^2$	3- حساب مسافة السقوط بدلالة زمن السقوط
$d = \frac{V^2 - V_0^2}{2g}$	4- حساب مسافة السقوط بدلالة سرعة السقوط
$t = \frac{V - V_0}{g}$	5- حساب زمن السقوط بدلالة سرعة السقوط
$t = \sqrt{\frac{2d}{g}}$	6- حساب زمن السقوط بدلالة مسافة السقوط $d = \frac{1}{2} g t^2$ (حيث $V_0 = 0$) و بالتالي

** قذف حجر إلى أعلى بسرعة ابتدائية m/s (30) وعند عودته إلى نقطة القذف تصبح سرعته

** يطلق جسم رأسياً لأعلى فإذا كان زمن الصعود (3 s) فإن زمن السقوط يساوي وזמן التحليق يساوي

** جسمان كتلة الأول (m) وكتلة الثاني (3m) سقطا من نفس الارتفاع نحو سطح الأرض سقوطاً حرّاً فإذا كانت سرعة الأول

مثال 1 : في إحدى مباريات كرة السلة كانت أقصى قفزة إلى أعلى قد سجلها أحد اللاعبين m (1.8) أحسب :

ب) زمن التحليق .

مثال 2 : يسقط حجر من ارتفاع (100 m) و أستطيع شخص أن يقيس سرعة السقوط عند هذا الارتفاع وكانت (40 m / s) .

أ) أحسب السرعة عند ارتطام الحجر بالأرض .

ب) أحسب زمن السقوط .

مثال 3 : سقطت كرة من برج و بعد (4) ثواني ارتطمت بالأرض . أحسب :

أ) سرعة الكرة لحظة اصطدامها بالأرض .

ب) متوسط سرعة الكرة .

ج) ارتفاع البرج .

مثال 4 : يقوم صبي بابلات حجر من أعلى منزله وقام بقياس الزمن اللازم لوصوله للأرض فوجد أنه (2 s) . أحسب ما يلي :

أ) سرعة وصول الحجر للأرض .

ب) الارتفاع الذي سقط منه الحجر .

ج) زمن السقوط إذا تم إجراء التجربة على سطح القمر من الارتفاع نفسه (حيث جاذبية القمر تساوي $\frac{1}{6}$ جاذبية الأرض) .

مثال 5 : أطلق جسم من سطح مبني باتجاه رأسى إلى أعلى و بسرعة ابتدائية ($v_0 = 20 \text{ m/s}$) . أحسب :


أ) بعد الجسم بعد زمن (1 s) بالنسبة إلى سطح المبني .

ب) أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم فوق سطح المبني .

ج) سرعة الجسم على ارتفاع (15 m) فوق سطح المبني .

د) زمن الوصول لأقصى ارتفاع فوق سطح المبني .

هـ) ارتفاع المبني إذا كان زمن السقوط (5) . (من لحظة الإطلاق إلى لحظة الوصول إلى الأرض)



**** إجراء الدرس العملي (3) في الكتاب العملي : تعين مقدار عجلة الجاذبية الأرضية**

الفصل الثاني : القوة والحركة

التاريخ :/...../.....

الدرس (2 - 1) : القانون الأول لنيوتن**مؤثر خارجي يؤثر على الأجسام مسبباً تغييراً في شكل الجسم أو حجمه أو حالته الحركية****كمية فيزيائية متوجهة تتحدد بمقدار واتجاه ونقطة تأثير** **يكون الجسم متزناً في الحالات الآتية****قام أرسطو بتقسيم الحركة إلى نوعين :**

وجه المقارنة	الحركة الطبيعية	الحركة غير الطبيعية
مثال

قوة معيقة لحركة الجسم و تقلل من سرعته و تنشأ من تلامس الأجسام**عوامل تتوقف عليها قوة الاحتكاك : 1- 2- 3-****يستمر الجسم في الحركة قبل أن يتوقف لمسافة معينة تتوقف هذه المسافة على العوامل الآتية :****-1- 2- 3-****الجسم الساكن يبقى ساكناً والجسم المتحرك يبقى متحركاً في خط مستقيم****ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته****خاصية ميل الجسم لمقاومة التغير و الحفاظ على حالته الحركية****يزداد القصور الذاتي كلما زادت****علل لما يأتي :****1- القصور الذاتي للسيارة أكبر من القصور الذاتي للدراجة إذا كانا يتحركان بنفس السرعة .****2- يسمى قانون نيوتن الأول بقانون القصور الذاتي .****3- اندفاع التلاميذ إلى الأمام عند توقف باص المدرسة فجأة .****4- تأكيد شرطة المرور على ضرورة ربط حزام الأمان أثناء قيادة السيارة .****5- سقوطك على الأرض عند اصطدام رجلك بالرصيف أثناء السير .**

6- تتناقص سرعة الأجسام المتحركة على سطح الأرض .

7- قد لا يتحرك الجسم برغم تأثيره باكثر من قوة (الجسم الموضع على مستوى أفقى أملس يكون متزنًا ما لم يؤثر عليه مؤثر خارجي)

8- يستخدم الشحوم والزيوت أو محمل الكريات (Ball bearing) في الأجزاء الداخلية للآلات الميكانيكية .

9- يصعب إيقاف السيارة في الأيام الممطرة أو يجد المترافق على الجليد صعوبة عند التوقف .


ماذا يحدث : إذا اختفت قوة التجاذب بين الشمس و الكواكب و ما شكل المسار الذي تتحرك فيه الكواكب .

ما يحدث : إذا تحركت كرة ناعمة على سطح أفقى و مصقول . ← الحدث :


السبب :

في الشكل أسطح ناعمة ذات زوايا ميل مختلفة ماذا يحدث لسرعة الكرة في كل حالة :


نشاط 1



C



B



A




الحدث

السبب

.....
.....

.....
.....

.....
.....



نشاط 2

سقوط العملة داخل الكأس

.....
.....
.....

لم تتحرك العملة أفقياً عند سحب الورقة

.....
.....
.....

العملة المعدنية في حالة سكون

.....
.....
.....

الحدث

السبب







الدرس (2 - 2) : القانون الثاني لنيوتن

التاريخ : / /

أستنتج :

** العلاقة بين العجلة (a) و القوة (F) علاقة

** العلاقة بين العجلة (a) و الكتلة (m) علاقة




$$a = \frac{F}{m} = \frac{\text{القوة}}{\text{الكتلة}} = \frac{\text{العجلة}}{\text{الكتلة}}$$

العجلة التي يتحرك بها جسم تتناسب طردياً مع القوة المؤثرة على الجسم

و عكسياً مع كتلته

$$F = m \cdot a$$

$$N = kg \cdot m / s^2$$

القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته kg (1) تجعله يتحرك بعجلة m/s^2 (1)

من الشكل المقابل أي من الجسيمين يتحرك بعجلة أكبر و لماذا ؟

الجسم :
السبب :

1- يصعب إيقاف جسم متحرك ذي كتلة كبيرة .

2- تحتاج الشاحنة المحملة إلى مسافة أكبر حتى تتوقف عن المسافة التي تحتاجها الشاحنة الفارغة عند الضغط عليهمما

بنفس قوة الفرامل علمًا بأن السيارات كانوا تتحركان بنفس السرعة .

3- تستمر الأجسام المتحركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم في حركتها عندما لا تؤثر عليها قوة ($F = 0$) .

1- لمقدار العجلة التي يتحرك بها جسم تحت تأثير قوة ثابتة عند مضاعفة الكتلة إلى مثلي ما كانت عليها .

2- لمقدار العجلة التي يتحرك بها جسم عند مضاعفة القوة إلى مثلي ما كانت عليها .

مثال 1 : طائرة تحلق في الهواء بسرعة ثابتة عندما كانت قوة دفع محركها تساوي (80 000 N) . أحسب :

أ) العجلة التي تتحرك بها الطائرة .

ب) قوة مقاومة الهواء للطائرة .

مثال 2 : سيارة بدأت من السكون ثم زادت سرعتها إلى (20 m / s) خلال (5) ثواني . أحسب : أ) العجلة التي تتحرك بها السيارة

ب) القوة المؤثرة على السيارة حيث كتلة السيارة (1000 kg)

مثال 3 : أثرت قوة ثابتة N (40) على جسم ساكن وزنه N (200) فتحرك في خط مستقيم . أحسب :

أ) كتلة الجسم

ب) العجلة التي يتحرك بها الجسم

ج) السرعة النهائية للجسم عندما يقطع مسافة m (400)

مثال 4 : في إحدى التجارب التي أجريت لاستنتاج العلاقة بين السرعة ، الزمن لجسم متحرك كتلته K g (100) كانت النتائج :

t	0	5	10	15	20
v	0	10	20	30	40

من الجدول أجب عما يلي :

أ) أرسم العلاقة بين (v,t)

ب) أحسب ميل الخط المستقيم و ماذا يمثل ؟

ج) أحسب المسافة التي يقطعها الجسم خلال تلك الفترة الزمنية ؟

د) أحسب مقدار القوة المؤثرة على الجسم ؟

تابع القانون الثاني لنيوتون

التاريخ : / /


وجه المقارنة	الكتلة	الوزن
التعريف
وحدة القياس
جهاز القياس
تأثير تغير المكان
العلاقة بينهما	$W = mg$	

1- يتغير الوزن بتغير المكان على سطح الأرض و لا تتغير الكتلة .

2- يفضل شراء البضائع بالكتلة وليس بالوزن .

مثال 5 : جسم كتلته $kg (0.4)$ يتحرك تحت تأثير قوة ثابتة بعجلة مقدارها $m/s^2 (0.9)$ تحت تأثير نفس القوة على جسم آخر كتلته $kg (1.2)$ أحسب العجلة التي يتحرك بها الجسم الثاني .


مثال 6 : تتحرك العربة الموضحة بالشكل المجاور بسرعة منتظمة مقدارها $m/s (5)$. أحسب :

أ) مقدار القوة (F) .

ب) محصلة القوى المؤثرة على العربة .

ج) العجلة التي تتحرك بها العربة .

مثال 7 : في الشكل المجاور جسم (A) كتلته $Kg (50)$ تؤثر عليه قوة $N (600)$ كما موضح بالشكل . أجب :



أ) أحسب مقدار وزن الجسم .

ب) أحسب محصلة القوى المؤثرة على الجسم .

ج) أحسب العجلة التي تتحرك بها الجسم .

د) حدد اتجاه حركة الجسم في الهواء .

السقوط الحر و مقاومة الهواء



التاريخ : / /

علل :



..... يتم استبدال الفوائل الصلبة من الحديد للطرق بأخرى من الخرسانة الأسمنتية العريضة من أسفل .

- ** لا يمكن ملاحظة احتكاك (مقاومة) الهواء سوي للأجسام المتحركة بـ
 ** يكون اتجاه قوة الاحتكاك دائمًا اتجاه القوة الأصلية .

في الشكل المقابل : الصندوق و الكرة تؤثر عليهما قوتين متساويتين في المقدار و متعاكستين في الاتجاه :



- (أ) محصلة القوى المؤثرة على الجسم تساوي
 (ب) العجلة التي يتحرك بها الجسم تساوي
 (ج) يتحرك الصندوق أو الكرة بسرعة



في الشكل المقابل :

- (أ) محصلة القوى المؤثرة على الجسم
 (ب) العجلة التي يتحرك بها الجسم
 (ج) ماذا يحدث لسرعة الصندوق أو الكرة

علل : تصل جميع الأجسام إلى سطح الأرض في وقت واحد مهما اختلفت كتلتها وذلك من الارتفاع نفسه عند إهمال مقاومة الهواء .

** القوة المؤثرة على الجسم في الهواء هي و لذلك فالعجلة التي يتحرك بها هي

سؤال : لديك جسم كتلته (M) يسقط سقطاً حرّاً في مكان ما بسرعة (V) فكم تكون سرعة جسم كتلته (M2) ؟ و لماذا ؟

الملاحظة :

التفسير :

سؤال : لو كنت على سطح القمر و في لحظة معينة و من ارتفاع محدد (على سطح القمر أيضا) حاولت أن تسقط جسمين

و هما قطعة من الحديد و ريشة طائر ، فهل يرتطمان بسطح القمر في اللحظة نفسها ؟

الملاحظة :

التفسير :


علل : عند سقوط جسم سقطاً حرّاً تزداد سرعته .

* القوة المحصلة الكلية المؤثرة على الجسم الساقط =

علل : يتحرك الجسم الساقط بسرعة ثابتة عندما يتزن وزن الجسم مع قوة مقاومة الهواء .

السرعة الثابتة التي تسقط بها الأجسام نحو الأرض وتكون محصلة القوى المؤثرة عليه صفر

..... ** العلاقة بين مساحة سطح الجسم المعرض للهواء و مقدار قوة مقاومة الهواء له علاقة



نشاط

في الشكل المقابل : قطعة نقود و ريشة طائر تسقط في أنبوبة بها هواء . ماذا يحدث :

1- إذا كان وزن الجسم أكبر من مقاومة الهواء مثل قطعة النقود ؟

2- إذا كان وزن الجسم صغير مثل ريشة الطائر ؟

3- إذا كان وزن الجسم يساوي قوة مقاومة الهواء ؟

..... 1- السنجب الطائر يزيد من مساحة جسمه عند سقوطه .

..... 2- جندي المظلات (الباراشوت) يزيد من مساحة المظلة عند سقوطه .

..... 3- تكون الطيور الملقة في السماء أثناء هجرتها سربا في شكل حرف V أو رأس سهم .

..... 4- يستطيع الطائر التحليق لمسافة كبيرة دون تحريك جناحيه .

..... 5- عندما يقفز مظليان يحملان نفس النوع من الباراشوت من نفس الارتفاع فإن المظلي الأثقل يصل لسطح الأرض أولاً .

..... 6- يرتفع البالون المملوء بالهواء لأعلى عند قلبه رأس على عقب و تركه .

..... 7- يلجا قائداً مركبة الفضاء إلى إطفاء محركها عند الخروج من جاذبية الأرض .

سؤال : قام جنديان من سلاح المظلات بفتح الباراشوت الخاص بكل منهما من الارتفاع نفسه وفي الوقت نفسه .

إذا كان الجندي (A) أثقل وزناً . بينما الجندي (B) أخف وزناً .

(أ) فما يحصل إلى سرعته الحدية أولاً ؟

(ب) فما يحصل إلى سطح الأرض أولاً ؟

(ج) التفسير :

سؤال : إذا أخذنا كرتين إدعاهما كرة التنس (أثقل وزناً) والأخرى كرة تنس الطاولة (أخف وزناً) وأسقطنا كلتا الكرتين من

ارتفاع منخفض . فماذا يحدث ؟ ثم أسقطنا كلتا الكرتين من ارتفاع عالٍ . فماذا يحدث ؟

(أ) من ارتفاع منخفض : السبب :

(ب) من ارتفاع عالٌ : السبب :

** إجراء الدرس العملي (4) في الكتاب العملي : تأثير قوة الاحتكاك على حركة الأجسام



التاريخ :/...../..... الدرس (3 - 2) : القانون الثالث لنيوتن

تأثير المتبادل للقوى المؤثرة في الشكل المقابل .




أستنتج :

كل فعل رد فعل مساوى له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه

إذا فرضنا جسم (A) و جسم (B) يؤثران كلا منهما في الآخر فإن :

القوة التي يؤثر بها الجسم الاول على الجسم الثاني

قوة مساوية للقوة الأولى في المقدار ومضادة لها في الاتجاه



إذا قام شخصان بركل كرة قدم في وقت واحد وبقوتين متساويتين
في المقدار ومتضادتين في الاتجاه .

إذا قام شخص بركل كرة قدم بمفرده .

ملاحظة :

علم لما يأتي :

1- لا تستطيع أن تضرب ورقة في الجو بقوة (2000 N) .

2- عند سقوط كرة من اعلى نري الكرة تتحرك نحوية الأرض و لكن لا نري الأرض تتحرك نحوية الكرة .


3- يدفع السباح لوحدة الغطس لأسفل بقدميه .

4- الفعل و رد الفعل قوتان متساويتان في المقدار متعاكستان في الاتجاه و لا يلغى كل منهما الآخر

5- الفعل و رد الفعل قوتان غير متزنتين و محصلتهما لا تساوي صفر .

قانون الجذب العام لنيوتن

التاريخ :/...../.....



تناسب قوة التجاذب بين جسمين طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين




وعكسياً مع مربع البعد بينهما

$$F \propto \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$



$$F = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

حيث (G) يسمى ثابت الجذب العام :

ماذا يحدث : لقوة التجاذب (F) بين كتلتين عندما تزداد المسافة (d) بينهما إلى ثلاثة أمثال (3d) ؟

ماذا يحدث : لقوة التجاذب (F) بين كتلتين عندما تزيد كل منهما إلى المثلثي وتقل المسافة بينهما إلى النصف (½ d) ؟

مثال 1 : كرتين كتلتها (m₁ = 10 kg) و (m₂ = 5 kg) و تساوي المسافة التي تفصل بين مركز كتلتيهما (0.5 m).

أ- أحسب قوة التجاذب بين الكرتدين .

ب- أحسب قوة التجاذب بين الكرتدين عند زيادة المسافة بينهما إلى المثلثي .

ج- أحسب قوة التجاذب بين الكرتدين عند زيادة الكتلة الثانية إلى المثلثي .

د- هل النتيجة مقبولة ؟

مثال 2 : وضعت كرة من الرصاص مجهولة الكتلة على بعد (0.4 m) من كرة أخرى من النوع نفسه كتلتها (10 kg) وكانتقوة التجاذب بينهما تساوي (8 × 10⁻⁸ N). احسب الكتلة المجهولة .

الوحدة الثانية : المادة و خواصها الميكانيكية**الفصل الأول : خواص المادة****الدرس (1 - 1) : مقدمة عن حالات المادة**

وجه المقارنة	1- الحالة الصلبة	2- الحالة السائلة	3- الحالة الغازية
1- الشكل
2- الحجم
3- قوة التماسك بين الجزيئات
4- المسافات بين الجزيئات
5- حركة الجزيئات

شكل هندسي منتظم تترابط فيه جزيئات المادة الصلبة بروابط قوية بحيث تسمح لها

بالحركات الاهتزازية و لا تسمح لها بالحركة الانتقالية

أنواع التركيبات البلورية

2- تركيبات بلورية معقدة مثل

1- تركيبات بلورية بسيئة مثل

مادة قابلة للانسياط ولا تتخذ شكلًا محدداً

علل لما يأتي :

2- تتمتع المادة الصلبة بشكل و حجم ثابتين .

3- تتوارد المادة الصلبة في شكل بلوري .

4- السوائل لها شكل متغير .

5- انسياط الزيت بسرعة أقل من الماء .

6- تسمى الغازات و السوائل موائع .

7- نشم الروائح العطرة و روائح الطعام أثناء الطهي في أي مكان توجد فيه بغض النظر عن موقعنا .

خلط من الأيونات السالبة (الإلكترونات) والأيونات الموجبة**خواص البلازما**

-2

-1

الغاز المتوجه الموجود في لمبات الفلورسنت هو البلازما**ملاحظة :****علل لما يأتي :**

1- تختلف خواص البلازما عن خواص الغازات .

2- توجد البلازما في الشمس و معظم النجوم و لا توجد على سطح الأرض .

3- البلازما موصلة للكهرباء .

تحول المادة :

عملية

عملية

الحالة الغازية**الحالة السائلة****الحالة الصلبة**

عملية

عملية

1- عند تسخين الثلج يتحول إلى ماء و عند تسخين الماء يتتحول إلى بخار .

علل لما يأتي :

1- عند إمداد الثلج بالطاقة .


2- عند إمداد الماء السائل بطاقة كبيرة .

3- عند خفض درجة حرارة المادة السائلة .



4- عند تسخين المادة إلى درجات حرارة أعلى من 2000°C .

الدرس (1 - 2) : التغير في المادة



التاريخ : / /

خاصية للأجسام تتغير بها أشكالها عندما تؤثر عليها قوة ثم تعود إلى أشكالها الأصلية عندما تزول القوة

الأجسام غير المرنة	الأجسام المرنة	وجه المقارنة
.....	التعريف
.....	أمثلة

على : يعتبر الرصاص من الأجسام الغير مرنة بينما الحديد من الأجسام المرنة .على : عند تصميم الآلات و الجسور و المنشآت الهندسية يؤخذ بعين الاعتبار خواص المواد الصلبة المستخدمة في صناعتها .يتناصف مقدار الاستطالة أو الانضغاط الحادث لنابض تناسباً طردياً مع قيمة القوة المؤثرة


$$F \propto \Delta x \Rightarrow F = k \Delta x$$

العوامل التي يتوقف عليها مقدار الاستطالة الحادثة في النابض هي استنتاجالنسبة بين القوة المؤثرة على النابض والاستطالة الحادثةيمكن حساب ثابت هو ك من العلاقة و وحدة قياسه هي استنتاجفي الشكل المقابل : منحنى (القوة - الاستطالة) : استنتاج

1- ميل المنحني يمثل 1


2- ميل المنحني يساوي 2

لحساب مقدار قوة الشد على نابض (F) بدالة كتلة الجسم المعلق به نستخدم العلاقة استنتاج



نشاط : من الرسم الموضح بالشكل :

- أ- أيهما أكثر استطالة :
ب- السبب :
ج- مادا تستتج :



مثال 1: عند تأثير قوة مقدارها (10 N) على نابض استطال الأخير بمقدار (4 cm) .

أ) أحسب مقدار ثابت هوك .

-
.....
.....
.....
.....
.....
- ب) الاستطالة التي تحدث بتأثير قوة مقدارها (15 N) على النابض نفسه .

مثال 2: إذا علمت أن فرع شجرة يتبع قانون هوك عند تعليق كتلة مقدارها (20 kg) من طرف فرع الشجرة تتدلى الأخير مسافة (10 cm) .

أ) أحسب مقدار ثابت هوك .

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ب) كم يتتدلى الفرع عند تعليق كتلة مقدارها 40 kg من النقطة نفسها .

مثال 3: نابض من طوله (10 cm) علقت كتلة مقدارها (40 g) فأصبح طوله (12 cm) . احسب :

أ) مقدار الاستطالة الحادثة بوحدة المتر .

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ب) ثابت المرنة للنابض .

تابع التغير في المادة

التاريخ : / /

الحد الأعلى الذي يتحمله جسم من دون تغير دائم في شكله

لنا بضم من علقنا به قوة مقدارها (50 N) و ثابت المرونة له (100 N/m) إذا علمت أن أكبر قيمة

ماذا يحدث :

لاستطالة النابض قبل أن ينقطع هي (0.4 m) .


الحدث :

السبب :

الانفعال	الإجهاد	وجه المقارنة
.....	التعريف
.....	أمثلة

الضغط على كرة من المطاط يمثل فيتغير شكلها الكروي (انضغاط) يمثلالشد على نابض من الصلب يمثل فيزداد مقدار الاستطالة (استطالة) يمثل

استنتاج

زيادة مقدار الاستطالة لنا بضم من الصلب تسمى المرونةخواص المادة المتصلة بالمرونة :1- الصلابة :2- الصلادة :3- المليونة :4- الطرق :ترتب المعادن حسب الصلادة كالتالي : الصلب - الحديد - النحاس - الألمنيوم - الفضة - الذهب - الرصاص

ملاحظة


تصنع الحلي من الذهب و النحاس و ليس من الذهب الخالص .

علل :

تطبيقات حياتية

المهندسون المدنيون يستخدمون دراسة الإجهاد والانفعال في بناء الجسور والأنفاق وطرق العامة لكي تكون أكثر متانة و مرونة

** اجراء الدرس العملي (5) في الكتاب العملي : التحقق من قانون هوك



الدرس (1 - 3) : خواص المسوائل السائبة

التاريخ : / /

القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحات







$$P = \frac{F}{A}$$

القوة العمودية
المساحة

= الضغط

$$P = \rho gh$$

** حساب الضغط بدلالة الكثافة (ρ) و العمق (h)



2- الضغط في باطن السائل :

** في الشكل المقابل الضغط عند نقطة (X) في السائل يساوي

** العوامل التي يتوقف عليها ضغط السائل عند نقطة هي

** الوحدة الدولية لقياس الضغط هي

** في الشكل المقابل أواني مستطرقة مختلفة الحجم :

1- قارن بين الضغط عند النقطة (A) و الضغط عند النقطة (B) ؟

2- ماذا تستنتج ؟

علل لما يأتي :


2- عندما تسبح في الماء ستشعر بالضغط نفسه علي أذنيك مهما اختلف اتجاه انحناء رأسك .

3- يراعي العمق عند بناء السدود المائية .

3- الضغط الكلي عند نقطة في باطن السائل :

$$P_T = P_a + \rho h g$$

** الضغط الكلي في باطن السائل =



4- الضغط الكلي عند نقطة في باطن إناء يحتوي علي عدة سوائل غير قابلة للامتزاج :

$$P_T = + +$$

سؤال : أستنتاج قانون لحساب ضغط السائل عند نقطة بدلالة كثافة السائل و العمق :

تابع خواص المسوائل السائلة

التاريخ : / /

$$g = 10 \text{ m/s}^2$$

$$P_a = 101300 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

مثال 1 : أسطوانة من النحاس نصف قطرها (10 cm) و كتلتها (6.28 kg) . أحسب الضغط الذي تسببه هذه الاسطوانة .

مثال 2 : أسطوانة من الحديد ارتفاعها (10 cm) . فإذا علمت أن كثافة الحديد (7600 kg/m³) . أحسب الضغط الذي تسببه .

مثال 3 : حوض يحوي ماء مالح كثافته (1030 kg/m³) إذا افترضنا أن ارتفاع الماء (1 m) وأن مساحة قاعدة الحوض

(أ) الضغط الكلي على القاعدة تساوي (500 cm²) . أحسب :

ب) القوة المؤثرة على القاعدة .


ج) الضغط على أحد الجوانب الرئيسية للحوض .

مثال 4 : يحتوي الوعاء الموجود في الشكل المقابل على (20 cm) من الزنيق الذي كثافته

تساوي (13600 kg/m³) وعلى (40 cm) من الماء المالح الذي كثافته تساوي

(1040 kg/m³) . اعتبار أن الضغط الجوي يساوي (10⁵ Pa) .

أ) أحسب الضغط المؤثر على نقطة A على السطح العلوي للماء .



ب) أحسب الضغط المؤثر على نقطة B على السطح الفاصل بين الهواء والماء .


ج) أحسب الضغط المؤثر على نقطة C في قاع الوعاء المستخدم .


مثال 5 : الرسم يمثل العلاقة بين الضغط عند نقطة والعمق داخل سائل كثافته (1000 kg/m³) .

أ) الضغط الجوي عند سطح السائل .

ب) الضغط عند النقطة (A) .

ج) عمق النقطة (A) تحت سطح السائل .



**الأنابيب ذات الشعوبتين**

التاريخ : / /

من الشكل المقابل يكون الضغط عند النقطة B الضغط عند النقطة A

أستنتج

$$P_a + \rho_1 h_1 g = P_a + \rho_2 h_2 g$$

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$

حيث (h_1) ارتفاع سطح الزيت عن السطح الفاصل و (h_2) ارتفاع سطح الماء عن السطح الفاصل

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{h_2}{h_1}$$

النسبة بين كثافة السائل إلى كثافة الماء

مثال 1 : وضع سائل في وعاء ذي شعوبتين حتى أصبح السطحان الفاصلان بين السائل والماء في الشعوبتين على مستوى واحد . ثم أضيف ماء بمقدار (16 cm) . إذا علمت أن كثافة السائل تساوي (800 kg / m³) و كثافة الماء تساوي (1000 kg / m³)

أ- أحسب ارتفاع السائل عن السطح الفاصل في الشعبة الأخرى .

ب- أحسب الكثافة النسبية للسائل .

وحدات قياس الضغط :


$$1 \text{ (torr)} = \dots \text{ mm Hg}$$

$$1 \text{ (cm Hg)} = \dots \text{ mm Hg}$$


$$1 \text{ (bar)} = \dots \text{ Pa}$$

$$1 \text{ (Pa)} = \dots \text{ N/m}^2$$

$$P_a = 1.013 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \text{ (Pa)} = 1.013 \text{ bar} = 76 \text{ cm Hg} = 760 \text{ mm Hg}$$

الضغط الجوي المعتاد :**جهاز يستخدم لقياس الضغط الجوي**

-2

**** أنواع البارومترات :****جهاز يستعمل في قياس ضغط الغاز المحبوس أو البخار****** فكرة عمل المانومتر :**

لحساب ضغط الغاز في المستودع =

$$P_g = \dots + \dots$$


يسخدم الزئبق في المانومتر في الحالات التي يكون فيها فرق الضغطيسخدم الماء في المانومتر في الحالات التي يكون فيها فرق الضغط

أستنتاج

مثال 1 : مانومتر وصل بواء به غاز محبوس فارتفع السائل في الشعبة (25 cm) و كثافة السائل المستخدم في المانومتر تساوي (800 kg / m³) . أحسب ضغط الغاز المحبوس في المانومتر .

قاعدة (بساكال) مبدأ

التاريخ :/...../.....

ينقل كل سائل محبوس أي تغير في الضغط إلى باقي نقاط السائل وفى جميع الاتجاهاتاستخدامات قاعدة بساكال :

في الشكل المقابل : يفترض وجود مكبس مثالي .

أستنتج

1- الضغط عند المكبس الصغير (P_1) الضغط عند المكبس الكبير (P_2)

2- مساحة المكبس الدائري (A) تساوي

3- القوة المؤثرة على إحدى المكبسين بدلالة مساحتها تساوي

4- القوة المؤثرة على إحدى المكبسين بدلالة نصف قطريهما تساوي

5- الشغل المبذول على المكبس الكبير ($W_2 = F_2 \cdot d_2$) الشغل المبذول على المكبس الصغير ($W_1 = F_1 \cdot d_1$)

6- القوة المؤثرة على إحدى المكبسين بدلالة المسافة التي يتحركها كل منهما تساوي

7- المكبس المثالي :

علل لما يأتي : 1- لا تطبق قاعدة بساكال على الغازات .

2- لا يمكن استخدام الماء بدلاً من الزيت في الروافع الهيدروليكي في محطات البترول .

3- لا يوجد عملياً مكبس مثالي (مكبس كفاءته % 100) .

4- إبرة الخياطة ذات طرف مدبب .

$$\varepsilon = \frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \frac{d_1}{d_2}$$

النسبة بين القوة الكبيرة المؤثرة على المكبس الكبير إلى القوة الصغيرة المؤثرة على المكبس الصغيرأو النسبة بين مساحة المكبس الكبير إلى مساحة المكبس الصغيرأو النسبة بين المسافة التي يتحركها المكبس الصغير إلى المسافة التي يتحركها المكبس الكبير

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{F_2 d_2}{F_1 d_1} = \text{كفاءة المكبس الهيدروليكي}$$

النسبة بين الشغل المبذول من المكبس الكبير إلى الشغل المبذول من المكبس الصغير

تابع قاعدة (مبدأ) باسكال

التاريخ : / /

مثال 1 : مكبس هيدروليكي قطره مكبسه (4 cm) و (40 cm) أحسب :

أ) مقدار القوة المؤثرة على المكبس الصغير عند رفع كتلة مقدارها (200 kg) .

ب) المسافة التي يتحركها المكبس الكبير إذا تحرك المكبس الصغير مسافة (2 m) .

ج) الفاندة الآلية للمكبس الهيدروليكي .

مثال 2 : أثرت قوة مقدارها (20 N) على المكبس الصغير الذي تبلغ مساحة مقطعه (0.2 m²) وكانت مساحة المقطع الكبيرتساوي (2 m²) أحسب :

أ) الضغط الذي انتقل عبر السائل .

ب) القوة الناتجة عن المكبس الكبير .

ج) الفاندة الآلية للمكبس الهيدروليكي .

مثال 3 : مكبس هيدروليكي مساحة مكبسه (0.04 m²) و (4 m²) بفرض عدم فقد أي طاقة أحسب :

أ) مقدار الشغل المبذول على المكبس الصغير إذا كانت القوة المؤثرة عليه (N 50) و تحرك المكبس مسافة (3 m) .

ب) أكبر كتلة يمكن رفعها على المكبس الكبير .

ج) المسافة التي يتحركها المكبس الكبير .

د) الفاندة الآلية للمكبس الهيدروليكي .