

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية




دلال سعد المسعود

الملف بنك أسئلة يشمل الوحدة الرابعة الكيمياء الكهربائية والوحدة الخامسة المركبات الهيدروكربونية غير محلول منهاج جديد

[موقع المناهج](#) ← [ملفات الكويت التعليمية](#) ← [الصف الحادي عشر العلمي](#) ← [كيمياء](#) ← [الفصل الثاني](#)

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر العلمي



روابط مواد الصف الحادي عشر العلمي على تلغرام

الرياضيات	اللغة الانجليزية	اللغة العربية	التربية الاسلامية
---------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر العلمي والمادة كيمياء في الفصل الثاني

امتحان قصير حادي عشر كيمياء	1
امتحان الفترة الرابعة 2016	2
امتحان الفترة الثانية 2016 2017	3
تطبيقات على الخلايا الحلقانية	4
مراجعة	5



وزارة التربية
Ministry of Education
State of Kuwait | دولة الكويت

بنك الأسئلة

لمادة الكيمياء

موقع
المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

للمصف الحادي عشر العلمي

الفترة الدراسية الثانية

العام الدراسي 2025 - 2026 م

الكيمياء

المصف الحادي عشر



فريق العمل



مدير إدارة التوجيه الفني للعلوم

أ / دلال سعد المسعود

CS CamScanner



وزارة التربية
Ministry of Education
دولة الكويت | State of Kuwait

فريق التوجيهات الفنية و بنك الأسئلة مادة الكيمياء للصف الحادي عشر العلمي الفصل الدراسي الثاني - العام الدراسي 2025 - 2026 م

موقع
المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

الاسم	المسمى الوظيفي	المنطقة التعليمية	العمل بالفريق
1. أ. طارق شهاب	الموجه الفني الأول للعلوم رئيس اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء	الأحمدي	رئيس الفريق
2. أ. السيد محمد السيد	موجه فني	الفروانية	مقرر
3. أ. موسى المطيري	موجه فني	مبارك الكبير	عضو
4. أ. بدور العتيبي	موجه فني	مبارك الكبير	عضو
5. آلاء الكندري	موجه فني	مبارك الكبير	عضو
6. أ. حصة موسى العجمي	موجه فني	مبارك الكبير	عضو
7. أ. ليلي المطيري	موجه فني	الفروانية	عضو
8. أ. ريم مطلق المطيري	موجه فني	الفروانية	عضو
9. أ. سعاد غازي المطيري	موجه فني	الفروانية	عضو
10. أ. منى الرشدي	موجه فني	الفروانية	عضو
11. أ. ابتسام سعد المطيري	موجه فني	الفروانية	عضو
12. أ. جميلة الدقباسي	موجه فني	الفروانية	عضو
13. أ. سعاد فرج المطيري	موجه فني	الفروانية	عضو

مدير إدارة التوجيه الفني للعلوم
أ. دلال سعد المسعود

الوحدة الرابعة: الكيمياء الكهربائية

الفصل الأول: تفاعلات الأكسدة والاختزال

درس 1-1 طبيعة الخلايا الإلكتروليتية

السؤال الأول: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

1. أحد فروع الكيمياء الفيزيائية الذي يهتم بدراسة التحولات الكيميائية التي تنتج أو تمتص تياراً كهربائياً. ()
2. عملية اكتساب الإلكترونات ونقص في عدد التأكسد. ()
3. مادة تكتسب إلكترونات ويحدث لها نقص في عدد التأكسد. ()
4. عملية فقد إلكترونات وزيادة في عدد التأكسد. ()
5. مادة تفقد إلكترونات ويحدث لها زيادة في عدد التأكسد. ()

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ في كل مما يلي:

1. عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي لكبريتات النحاس II أزرق اللون يبهت لون المحلول. ()
2. عند غمر شريحة خارصين في محلول كبريتات النحاس II أزرق اللون يتآكل الخارصين. ()

السؤال الثالث: اكمل الفراغات في الجمل والمعادلات الكيميائية التالية بما يناسبها علمياً :

1. عند وضع شريحة خارصين في محلول مائي من كبريتات النحاس II يسلك كاثيون النحاس II كعامل
2. عند غمر شريحة خارصين في محلول كبريتات النحاس II أزرق اللون يتناقص تركيز كاثيونات Cu^{2+} بسبب حدوث عملية لها.
3. طبقاً لتفاعلات الأكسدة والاختزال، عندما يزداد عدد تأكسد العنصر يكون عاملاً
4. تحدث عملية الاختزال عندما تكتسب المادة إلكترونات و عدد تأكسدها.
5. طبقاً لتفاعلات الأكسدة والاختزال، تسمى المادة التي يتم اختزالها بالعامل

السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي وضع علامة (✓) في المربع المقابل لها:

1. جميع التغيرات التالية تتم عند وضع شريحة من الخارصين في محلول كبريتات النحاس II ماعداً واحداً:

☐ يبهت لون محلول CuSO_4 الأزرق تدريجياً	☐ يزداد تركيز كاثيونات النحاس Cu^{2+} في المحلول
☐ يتغطى سطح الخارصين بطبقة بنية من النحاس	☐ يتآكل سطح شريحة الخارصين

2. عند غمر شريحة من الخارصين في محلول كبريتات النحاس II، تحدث جميع التغيرات التالية، عدا واحداً:

☐ تتأكسد ذرات الخارصين إلى كاثيونات Zn^{2+}	☐ يختفي اللون الأزرق للمحلول تدريجياً
☐ تختزل الكاثيونات Cu^{2+} إلى ذرات Cu	☐ تتأكسد كاثيونات النحاس II إلى ذرات Cu

السؤال الخامس : علل (فسر) ما يلي تعليلا علميا صحيحا :

1. تكون طبقة بنية اللون من ذرات النحاس (Cu) على سطح شريحة خارصين عند غمرها بمحلول CuSO_4 .

.....

.....

2. يبهت لون محلول كبريتات النحاس (II) الأزرق تدريجيا حتى يختفي كلياً بعد بضع ساعات من غمر شريحة خارصين فيه.

.....

.....



3. تآكل سطح شريحة خارصين عند غمرها في محلول مائي لكبريتات النحاس (II).

.....

.....

السؤال السادس: استخدم المفاهيم الموضحة في الشكل لرسم خريطة تنظم الافكار الرئيسية الواردة فيها

عامل مؤكسد - عامل مختزل - عدد التأكسد يقل - عدد التأكسد يزيد	(1)
تفاعلات الأكسدة والاختزال	

تحول المغنسيوم الي كاتيوناته - عملية اكسدة - اكتساب الالكترونات - فقد الالكترونات - عملية اختزال - تحول ذرات الكبريت إلى أنيونات الكبريتيد	(2)
الأكسدة والاختزال	

السؤال السابع : حدد نوع العملية (أكسدة أو اختزال) من خلال المعادلات الموضحة

نوع العملية (أكسدة أو اختزال)	نصف التفاعل
	$\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$
	$\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$
	$\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$
	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$
	$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$

الوحدة الرابعة: الكيمياء الكهربائية

الفصل الأول: تفاعلات الأكسدة والاختزال

درس 1-2 وزن معادلات الأكسدة والاختزال

السؤال الأول: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:

1. تفاعلات يحدث فيها انتقال الكترونات من أحد المتفاعلات الى الاخر. ()
2. العدد الذي يمثل الشحنة الكهربائية التي تبدو على الذرة في المركب أو الايون. ()
3. الطريقة التي يتم فيها تقسيم التفاعل النهائي الى نصف تفاعل أكسدة ونصف تفاعل اختزال ووزن كل منهما على حده. ()

موقع
المنهج الكويتية
almanahi.com/kw

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ في كل مما يلي:

1. عدد التأكسد للأكسجين في المركب Na_2O_2 يساوي (-2) ()
2. عدد التأكسد للهيدروجين في المركب MgH_2 يساوي (+1) ()
3. عدد التأكسد للفوسفور في المركب $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$ يساوي (+ 5) ()
4. عدد تأكسد النيتروجين في المركب NH_4Cl يماثل عدد تأكسده في الأيون NH_4^+ . ()
5. عدد تأكسد النيتروجين في (Li_3N) يساوي عدد تأكسده في NH_4Cl . ()
6. عدد التأكسد للكربون في مركب $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ يماثل عدد تأكسده في مركب CH_3COOH . ()
7. التغير التالي $\text{BF}_3 \rightarrow \text{BF}_4^-$ يعتبر مثالا على عملية الأكسدة. ()
8. يعتبر تحول ClO_2^- إلى ClO_3^- تفاعل أكسدة. ()
9. التغير التالي $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_3^-$ يمثل عملية اختزال. ()
10. التغير التالي : $\text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{SO}_3^{2-}$ يلزم لإتمامه وجود عامل مؤكسد ()
11. التغير التالي $\text{N}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{NO}$ يلزم لإتمامه وجود عامل مختزل ()
12. التغير التالي: $\text{CH}_3\text{CHO} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$ يصحبه زيادة في عدد تأكسد الكربون، لذلك يلزم لإتمامه وجود عامل مؤكسد. ()
13. طبقا للتفاعل التالي: $2\text{P} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{PCl}_3$ يعتبر الكلور عاملاً مؤكسداً. ()
14. طبقا للتفاعل التالي $2\text{Na}^+ + 2\text{Br}^- + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Na}^+ + 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$ ، يسلك Br^- كعامل مؤكسد. ()

15. طبقا للتفاعل التالي: $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ لا يعتبر ثاني اكسيد الكربون عاملا مؤكسدا ولا عاملا مختزلا. ()
16. التفاعل التالي: $\text{Fe} + \text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni} + \text{Fe}^{2+}$ يدل على حدوث عملية اختزال لكاتيون النيكل. ()
17. طبقا للتفاعل التالي: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$ فإن غاز الكلور يؤكسد الصوديوم الى كاتيونات الصوديوم. ()
18. طبقا للتغير التالي: $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \text{CO}_3^{2-}$ يضاف اثنان جزئ ماء للمتفاعلات وذلك لوزن ذرات الاكسجين. ()
19. طبقا للمعادلة التالية: $\text{I}_2 + \text{Pb} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{Pb}^{2+}$ يكون اليود I_2 عامل مؤكسد. ()
20. طبقا للتفاعل التالي: $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ يعتبر فوق اكسيد الهيدروجين عامل مختزل و عامل مؤكسد. ()

السؤال الثالث: اكمل الفراغات في الجمل والمعادلات الكيميائية التالية بما يناسبها علمياً :

- طبقا لتفاعلات الأكسدة والاختزال ، عندما يزداد عدد تأكسد العنصر يكون عاملاً
- تحدث عملية الاختزال عندما تكتسب المادة إلكترونات عدد تأكسدها.
- طبقا لتفاعلات الأكسدة والاختزال ، تُسمى المادة التي يتم اختزالها بالعامل
- عدد تأكسد العناصر الفلزية القلوية (Li, Na , K) في جميع مركباتها يساوي
- عدد تأكسد الفوسفور في المركب $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$ يساوى
- عدد تأكسد الأكسجين في المركب (K_2O_2) يساوى
- عدد تأكسد الحديد في الأيون $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ يساوى
- عدد تأكسد النحاس في الأيون $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ يساوى
- عدد تأكسد الألومنيوم في الأيون $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ يساوى
- عدد تأكسد الهيدروجين في هيدريد الصوديوم NaH يساوى
- عدد تأكسد الكربون في المركب $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ يساوى
- عدد تأكسد الكربون في الايون CO_3^{2-} يساوى
- عدد تأكسد الكربون في المركب Na_2CO_3 يساوى
- عدد تأكسد النيتروجين في الصيغة (Li_3N) عدد تأكسده في الصيغة NH_3
- عدد تأكسد الكلور في ClO^- يساوي
- التغير التالي: $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2$ يصحبه الكترولونات.
- التغير التالي $\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ يمثل عملية
- نصف التفاعل التالي $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ يمثل عملية

19. تحول ClO_3^- إلى ClO^- يعتبر عملية

20. تحول $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ إلى Cr^{3+} يعتبر عملية

21. طبقا لمعادلة الأكسدة والاختزال غير الموزونة التالية : $\text{P} \rightarrow \text{PH}_3 + \text{H}_2\text{PO}_2^-$ فإن المعادلة الجزيئية التي

تمثل نصف تفاعل الاختزال هي : و نصف تفاعل الأكسدة هي :

22. طبقا للتفاعل التالي $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ ، ناتج عملية الأكسدة هو

23. طبقا للمعادلة التالية: $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{ClO}^- + \text{Cl}^-$ فإن ناتج عملية الأكسدة هو

24. طبقا للتفاعل التالي : $3\text{Co}^{2+} \rightarrow \text{Co} + 2\text{Co}^{3+}$ ، فإن ناتج عملية الاختزال هو

25. طبقا للتفاعل التالي : $\text{NO}_2^- + \text{Al} \rightarrow \text{NH}_3 + \text{AlO}_2^-$ ، فإن ناتج عملية الاختزال هو

26. طبقا للتفاعل التالي: $\text{Br}_2 \rightarrow \text{BrO}^- + \text{Br}^-$ فإن ناتج عملية الأكسدة هو

27. التغير الكيميائي التالي $\text{Cd} \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2$ يحتاج لإتمامه إلى وجود عامل

المناهج الكويتية
almanahj.com/kw

28. التغير الكيميائي التالي $\text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{SO}_3^{2-}$ يحتاج لإتمامه الى وجود عامل

29. يلزم لإتمام التغير التالي: $2\text{NH}_3 \rightarrow \text{N}_2$ وجود عامل

30. التغير التالي: $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{NH}_3$ يحتاج اتمامه الى وجود عامل

31. نصف التفاعل التالي: $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnO}_2^{2-}$ يمثل عملية ولذلك يحتاج اتمامه الى وجود عامل

32. المادة التي تعمل كعامل مختزل في التفاعل التالي $\text{Zn} + \text{NO}_3^- \rightarrow [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-} + \text{NH}_3$ هي

33. العامل المؤكسد في التفاعل التالي: $\text{MnO}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ، هو

34. طبقا للتفاعل التالي: $2\text{HCl} + \text{Fe} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ ، فإن العامل المؤكسد هو

35. طبقا لنصف التفاعل التالي: $\text{Zn}_{(s)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}_{(aq)} + 2\text{e}^-$ ، فإن ذرات الخارصين تسلك كعامل

36. $\text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_4^- + \dots + 3\text{e}^-$ (طريقة أنصاف التفاعلات في وسط حمضي)

37. $\text{SO}_3^{2-} + \dots \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ (طريقة أنصاف التفاعلات في وسط حمضي)

السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي وضع علامة (✓) في المربع المقابل لها:

1. عدد التأكسد للأوكسجين يساوي (+1) في أحد المركبات التالية:

- | | |
|---|---|
| O_2F_2 ☐ | BaO_2 ☐ |
| OF_2 ☐ | MnO_2 ☐ |

2. عدد تأكسد الكبريت يساوي (+2) في أحد المركبات التالية:

- | | |
|---|--|
| SO_3 ☐ | H_2S ☐ |
| $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ☐ | H_2SO_3 ☐ |

3. عدد تأكسد النتروجين في الأيون NO_3^- هو أحد ما يلي :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (-1) ☐ | (-5) ☐ |
| (+5) ☐ | (+1) ☐ |

4. عدد تأكسد الأكسجين في المركب Li_2O_2 يساوي أحد ما يلي:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (-1) ☐ | (-2) ☐ |
| (0) ☐ | (-0.5) ☐ |

5. أحد ما يلي هو أعداد تأكسد كل من الأكسجين والنتروجين والصوديوم في المركب NaNO_3 على الترتيب :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| +1 ، -5 ، +2 ☐ | +1 ، +5 ، -2 ☐ |
| -2 ، +3 ، -1 ☐ | +1 ، +5 ، -6 ☐ |

6. عدد تأكسد الكربون في المركب C_3H_4 هو أحد ما يلي :

- | | |
|---|---|
| $\frac{-4}{3}$ ☐ | -4 ☐ |
| +3 ☐ | $\frac{+2}{3}$ ☐ |



7. المركب الذي فيه عدد التأكسد للهيدروجين يساوي (-1) ، هو أحد ما يلي :

- | | |
|--|---|
| H_2SO_4 ☐ | H_2O ☐ |
| MgH_2 ☐ | HCl ☐ |



8. عدد الإلكترونات الناتجة عند وزن نصف المعادلة التالية : $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ يساوي أحد ما يلي :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 2 ☐ | 1 ☐ |
| 5 ☐ | 3 ☐ |


9. أحد التغيرات التالية يدل على عملية اكسدة:





10. أحد التفاعلات التالية يمثل تفاعل اكسدة واختزال:




11. أحد التفاعلات التالية يعتبر تفاعل اكسدة واختزال:




12. أحد التفاعلات التالية يعتبر تفاعل اكسدة واختزال:





13. أحد التفاعلات التالية يعتبر تفاعل اكسدة واختزال :




14. جميع التفاعلات التالية من تفاعلات الاكسدة والاختزال عدا واحداً :





15. أحد ما يلي هو العامل المختزل في التفاعل التالي: $\text{Mg} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu} + \text{Mg}^{2+}$



16. المادة التي تعمل كعامل مختزل في التفاعل التالي: $\text{Zn} + \text{NO}_3^- \rightarrow [\text{Zn(OH)}_4]^{2-} + \text{NH}_3$ هي أحد ما يلي:



17. العامل المؤكسد في التفاعل التالي: $\text{Cr} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2 + \text{Cr}^{3+}$ ، هو أحد ما يلي:



18. طبقا للتفاعل التالي: $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{ClO}^- + \text{Cl}^-$ يسلك الكلور كأحد العوامل التالية :

مؤكسد ومختزل معاً ☐

مؤكسد فقط ☐

مساعد (حفاز) ☐

مختزل فقط ☐


19. طبقا لتفاعل الأكسدة والاختزال التالي: $\text{Zn} + \text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{Pb} + \text{Zn}^{2+}$ فإن أحد ما يلي صحيح :

☐ كاتيون الرصاص قد تأكسد لأنه اكتسب إلكترونين ☐ ذرة الخارصين قد تأكسدت لأنها فقدت إلكترونين



☐ الرصاص عامل مؤكسد ☐ كاتيون الرصاص عامل مختزل



20. جميع النواتج التي تحتها خط في التفاعلات الكيميائية تكونت نتيجة عملية أكسدة عدا واحدا :



21. طبقا للتفاعل التالي: $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{MgCl}_2$ فإن نصف تفاعل الأكسدة هو أحد ما يلي: -



22. طبقا للتفاعل التالي: $4\text{HNO}_3 + \text{Cu} \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{NO}_2$ فإن جميع العبارات التالية صحيحة، عدا واحدة :

☐ ناتج تفاعل الاختزال هو $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$

☐ يسلك الحمض كعامل مؤكسد





☐ المول الواحد من ذرات النحاس يفقد إلكترونين

☐ ناتج تفاعل الاختزال هو NO_2




23. ناتج عملية الأكسدة في التفاعل التالي: $\text{Bi}_2\text{S}_3 + \text{HNO}_3 \rightarrow 2\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 + 2\text{NO} + 3\text{S} + 4\text{H}_2\text{O}$ هو أحد ما يلي :



24. التفاعل الذي لا يتغير فيه عدد تأكسد الكبريت هو أحد ما يلي :



25. أحد التغيرات التالية يحتاج الى عامل مؤكسد لإتمامه :



السؤال الخامس : علل (فسر) ما يلي تعليلا علميا صحيحة

1. التفاعل التالي $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ لا يعتبر من تفاعلات الأكسدة والاختزال.

2. يعتبر الكاديوم في التفاعل الكيميائي التالي $\text{Cd} \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2$ عامل مختزل.

3. نصف التفاعل التالي $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ يعتبر عملية أكسدة

موقع
المنهج الكويتي
almanahj.com/kw

السؤال السادس : أجب عن الأسئلة التالية :

1. ادرس المعادلات غير الموزونة التالية و ضع علامة ☒ امام المعادلة التي تمثل تفاعلات أكسدة و اختزال:

☐	$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$	(أ)
☐	$2\text{HCl} + \text{Fe} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$	(ب)
☐	$\text{Li} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{LiOH} + \text{H}_2$	(ج)
☐	$\text{K}_2\text{CrO}_7 + \text{HCl} \rightarrow \text{KCl} + \text{CrCl}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$	(د)
☐	$\text{Al} + \text{HCl} \rightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$	(هـ)

2. حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعلات التالية:

العامل المؤكسد	العامل المختزل	المعادلة الكيميائية
		$\text{MnO}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
		$\text{P} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NO} + \text{H}_3\text{PO}_4$
		$\text{Bi}(\text{OH})_3 + \text{Na}_2\text{SnO}_2 \rightarrow \text{Bi} + \text{Na}_2\text{SnO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

3. حدد المادة التي تأكسدت والمادة التي اختزلت في التفاعلات التالية:

المادة التي اختزلت	المادة التي تأكسدت	المعادلة
		$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
		$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
		$2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$

4. اكتب نصفي تفاعل الأكسدة و الاختزال والمعادلة النهائية الموزونة لكل من التفاعلات التالية



..... نصف تفاعل الأكسدة:
 نصف تفاعل الاختزال:
 المعادلة النهائية الموزونة :



..... نصف تفاعل الأكسدة:
 نصف تفاعل الاختزال:
 المعادلة النهائية الموزونة :



..... نصف تفاعل الأكسدة:
 نصف تفاعل الاختزال:
 المعادلة النهائية الموزونة :

السؤال السابع : أجب عن الأسئلة التالية:

اولاً- باستخدام طريقة أنصاف التفاعلات زن أنصاف التفاعلات التالية التي تجري في وسط حمضي مع تحديد العامل اللازم لإتمام التفاعل:




.....




.....

السؤال الثامن : أجب عن الأسئلة التالية:


* زن معادلات الأكسدة والاختزال التالية في وسط حمضي باستخدام طريقة أنصاف التفاعلات ، مع تحديد العامل المؤكسد والعامل المختزل



العوامل	العامل المختزل	العامل المؤكسد
انصاف التفاعلات		
نزن الذرة المركزية		
نزن ذرات الاكسجين		
نزن ذرات الهيدروجين		
نزن الشحنات		
نساي الشحنات		
الجمع والاختصار		



العامل المختزل	العامل المؤكسد



العامل المختزل	العامل المؤكسد



العامل المؤكسد	العامل المختزل



العامل المؤكسد	العامل المختزل

الوحدة الرابعة: الكيمياء الكهربائية

الفصل الأول: تفاعلات الأكسدة والاختزال


درس 1-3 الخلايا الإلكتروليتية

السؤال الأول: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :

1. أنظمة أو أجهزة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية أو العكس من خلال تفاعلات أكسدة واختزال. ()
2. خلايا تنتج طاقة كهربائية من خلال التفاعلات الكيميائية من نوع الأكسدة والاختزال. ()
3. خلايا تحتاج إلى طاقة كهربائية وينتج منها تفاعل كيميائي من نوع الأكسدة والاختزال. ()
4. الطاقة المصاحبة لاكتساب المادة للإلكترونات أي ميلها إلى الاختزال. ()
5. جهد الاختزال عند الظروف القياسية (درجة الحرارة 25°C وضغط غاز إن وجد 101.3 kPa وتركيز المحلول 1M) ()
6. وعاء يحتوي على شريحة مغمورة جزئياً في محلول إلكتروليتي لأحد مركبات مادة الشريحة. ()
7. وعاء يحتوي على شريحة مغمورة جزئياً في محلول إلكتروليتي لأحد مركبات مادة الشريحة عند الظروف القياسية (درجة الحرارة 25°C وضغط غاز إن وجد 101.3 kPa وتركيز المحلول 1M) ()
8. رمز يعبر بإيجاز عن الخلية الجلفانية إذ يدل على تركيبها والتفاعلات التي تحدث خلال عملها. ()
9. أنبوب على شكل حرف U يحتوي على محلول إلكتروليتي مثل نترات البوتاسيوم المذاب في جيلاتين لربط نصفي الخلية الجلفانية. ()


السؤال الثاني : أكمل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علمياً:

1. عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي لمحلول كبريتات النحاس II نحصل على طاقة
الرمز الاصطلاحي لنصف خلية النحاس التي يحدث فيها نصف التفاعل التالي: $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$ هو
3. الرمز الاصطلاحي لنصف خلية الهيدروجين القياسية هو
4. يشترط لتوليد تيار كهربائي وجود ناتج من الاختلاف في النشاط الكيميائي للقطبين
5. تحدث عملية الاختزال عند، بينما تحدث عملية الأكسدة عند في جميع الخلايا الإلكتروليتية.



6. الرسم المقابل يمثل نصف خلية خارصين قياسية ومنه نستنتج أن:

- المعادلة الكيميائية عند حالة الاتزان هي
- تركيز الكاتيونات في المحلول
- كتلة الشريحة
- نصف الخلية المفرد منها يُعتبر دائرة
- الرمز الاصطلاحي لنصف الخلية هو



7. الرسم المقابل يمثل نصف خلية الهيدروجين القياسية ومنه نستنتج أن:

- المعادلة الكيميائية عند حالة الاتزان
- الرمز الاصطلاحي لنصف الخلية هو
- قيمة جهد الاختزال القياسي له يساوي فولت.

8. عند ربط قطبي الخلية الجلفانية لتشغيلها ينحرف مؤشر الفولتميتر مما يدل على مرور تيار إلكتروني (تيار كهربائي) في الدائرة الخارجية من قطب إلى قطب

9. عند تشغيل الخلية الجلفانية تتحرك الموجودة في الجسر الملحي إلى نصف خلية الأنود لإعادة التعادل الكهربائي للمحالييل في نصفي الخلية الجلفانية

10. عند تشغيل الخلية الجلفانية تتحرك الكاتيونات الموجودة في الجسر الملحي وفي محلولي نصف الخلية نحو محلول قطب لإعادة التعادل الكهربائي للمحالييل في نصفي الخلية الجلفانية

11. العامل المؤكسد في الخلية الجلفانية التي لها الرمز الاصطلاحي: $\text{Fe} / [\text{Fe}^{2+}] // [\text{Cd}^{2+}] / \text{Cd}$ هو

12. عند غلق الدائرة واثناء تشغيل الخلية الجلفانية $\text{Ag} / [\text{Ag}^{+}] // [\text{Mg}^{2+}] / \text{Mg}$ تركيز الكاتيون Ag^{+} .

13. الأنود في الخلية الجلفانية هو القطب الذي تحدث عنده عملية الأكسدة ويكون جهد اختزاله من الكاثود.

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي وضع علامة (✓) في المربع المقابل لها :

- عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي من كبريتات النحاس II، تحدث جميع التغيرات التالية عدا واحدة:

☐ يزداد تركيز الكاتيونات Zn^{2+} في المحلول	☐ تختزل كاتيونات النحاس II إلى ذرات النحاس
☐ يمكن الحصول على طاقة كهربائية	☐ يبهت لون المحلول الأزرق تدريجياً حتى يختفي

2. عند وضع قطعة من الخارصين في محلول كبريتات النحاس II ، فإن أحد ما يلي صحيح :

- | | |
|---|---|
| ☐ كل أنيون كبريتات يفقد إلكترونين ويتعادل. | ☐ ذرات الخارصين تتأكسد ويترسب النحاس |
| ☐ جزيئات حمض الكبريتيك تتكون في المحلول | ☐ لا يحدث أي تفاعل |

3. جميع ما يلي يحدث في نصف الخلية القياسية ماعدا واحدا :

- ☐ تبقى كتلة الشريحة ثابتة ☐ يزداد تركيز الايونات الموجبة في المحلول
☐ يبقى تركيز الكاتيونات ثابتاً في المحلول ☐ يعتبر نصف الخلية المفردة دائرة مفتوحة.

4. عند وضع شريحة خارصين في محلول مائي يحتوي على Zn^{2+} في الظروف القياسية يحدث احد ما يلي :

- ☐ تزيد كتلة شريحة الخارصين ☐ تقل كتلة شريحة الخارصين
☐ تبقى كتلة شريحة الخارصين ثابتة ☐ يقل تركيز محلول Zn^{2+}

5. عند وضع شريحة من الخارصين مغمورة جزئياً في محلول الكتروليتي لأحد مركباته تركيزه (1M) ، ودرجة حرارة $25^{\circ}C$ وضغط يعادل (101kpa) ، فإن إحدى العبارات التالية صحيحة :

- ☐ تتولد طاقة حرارية ☐ تقل كتلة الشريحة
☐ تتولد طاقة كهربائية ☐ تحدث حالة اتزان بين ذرات الخارصين وكاتيوناته

6. عند غمر قطعة من الخارصين في محلول كبريتات النحاس II ، فإن جميع التغيرات التالية تحدث ، عدا واحدة:

- ☐ تقل كتلة الخارصين ☐ يتم اختزال كاتيونات النحاس II
☐ يتأكسد الخارصين ☐ يزداد تركيز كاتيونات النحاس II في المحلول

7. جميع ما يلي من وظائف الجسر الملحي ماعدا واحدة :

- ☐ يغلق الدائرة الخارجية في الخلية الجلفانية ☐ يسمح بهجرة الكاتيونات الى منطقه الكاثود
☐ يعيد التعادل الكهربائي الى نصف الخلية ☐ يسمح بهجرة الأنيونات إلى منطقه الأنود

8. جميع ما يلي يحدث أثناء عمل الخلية الجلفانية عدا واحدًا -

- ☐ تفاعل أكسده واختزال بشكل تلقائي ومستمر ☐ زيادة كتلة الكاثود
☐ تتجه الكاتيونات خلال الجسر الملحي نحو الأنود ☐ نقص كتلة الأنود

9. طبقاً للخلية الجلفانية التي لها الرمز الاصطلاحي $Mg / [Mg^{2+}] // [Ni^{2+}] / Ni$ ، فإن أحد ما يلي صحيح :

- ☐ تقل كتلة قطب النيكل ☐ العامل المختزل هي كاتيون النيكل Ni^{2+}
☐ نصف خليه الأنود هو $Ni^{2+} (1M) / Ni$ ☐ نصف خليه الأنود هو $Mg^{2+}(1M) / Mg$

10. جميع ما يلي يحدث أثناء عمل الخلية الجلفانية ما عدا واحدا :

- ☐ تفاعل أكسدة واختزال بشكل غير تلقائي .
☐ سريان للإلكترونات من الأنود للكاثود خلال الدائرة الخارجية
☐ زيادة في تركيز الأيونات الموجبة في محلول الأنود
☐ هجرة للأنيونات خلال الجسر الملحي نحو الأنود

11. احدى العبارات التالية غير صحيحة عن الخلية الجلفانية :

- ☐ تتحرك الكاتيونات خلال الجسر الملحي نحو القطب السالب
- ☐ الكاثود هو القطب الموجب
- ☐ يزداد تركيز الايونات الموجبة في محلول الانود
- ☐ تحدث عملية الاكسدة عند قطب الانود

السؤال الرابع: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة غير الصحيحة في كل من العبارات التالية:

1. ينتج تيار كهربائي عند وضع قطعة من الخارصين في محلول كبريتات النحاس II . ()
2. تنتج طاقة حرارية عند وضع قطعة من الخارصين في محلول من كبريتات النحاس II . ()
3. عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي لكبريتات النحاس (II) تزداد شدة اللون الأزرق للمحلول بعد فترة . ()
4. عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي لكبريتات النحاس (II) تتكون طبقة لونها بني غامق بعد فترة على سطح شريحة الخارصين. ()
5. عند وضع ساق من الخارصين في محلول CuSO_4 يقل تركيز كاتيونات النحاس II في المحلول. ()
6. تحدث عملية الاكسدة عند قطب الأنود في جميع الخلايا الالكتروكيميائية. ()
7. تحدث عملية الاختزال عند القطب الموجب للخلية في جميع الخلايا الالكتروكيميائية. ()
8. الكاثود هو القطب الذي تحدث عنده عملية الاكسدة في الخلايا الالكتروكيميائية. ()
9. يمكن أن تختلف مادة الشريحة عن الأيونات الموجودة في المحلول في بعض أنواع أنصاف الخلايا. ()
10. الرمز الاصطلاحي التالي $\text{Fe} / \text{Fe}^{2+}(1\text{M}) // \text{Cd}^{2+}(1\text{M}) / \text{Cd}$ لخلية جلفانية ومنه نستنتج أن القطب الذي تقل كتلته هو الكاديوم . ()

السؤال الخامس: علل لما يلي تعليلا علميا صحيحا :

1. عند غمر قطب من الخارصين في محلول كبريتات النحاس II لا يمكن الحصول على طاقة كهربائية

2. يجب فصل فلز الخارصين عن المحلول الذي يحتوي على كاتيونات النحاس II للحصول على تيار كهربائي.

3. عند غمر لوح خارصين في محلول مائي لكبريتات النحاس II يبهت اللون الأزرق للمحلول تدريجياً

4. تتكون طبقة بنية اللون على سطح شريحة الخارصين عند وضعها في محلول كبريتات النحاس II.

5. يبقى تركيز كاتيون الخارصين ثابت في نصف خليه الخارصين القياسية.

6. تزداد كتلة الرصاص في الخلية الجلفانية التي لها الرمز الاصطلاحي $\text{Sn} / [\text{Sn}^{2+}] // [\text{Pb}^{2+}] / \text{Pb}$



السؤال السادس: ماذا يحدث في الحالات التالية مع تفسير السبب

1. للون محلول كبريتات النحاس II الأزرق عند غمر شريحة خارصين فيه لفترة.

الحدث:

السبب:

2. لكتلة قطب الرصاص Pb في الخلية الجلفانية ذات الرمز الاصطلاحي $\text{Sn} / [\text{Sn}^{2+}] // [\text{Pb}^{2+}] / \text{Pb}$.

الحدث:

السبب:

3. لكتلة قطب القصدير Sn في الخلية الجلفانية ذات التفاعل الكلي التالي: $\text{Ni} + \text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn} + \text{Ni}^{2+}$

الحدث:

السبب:

4. لكتلة قطب الحديد في الخلية الجلفانية التي لها الرمز الاصطلاحي $\text{Fe} / [\text{Fe}^{2+}] // [\text{Ag}^{+}] / \text{Ag}$

الحدث:

السبب:

5. لتركيز أيونات الفضة Ag^{+} أثناء عمل خلية جلفانية لها الرمز الاصطلاحي $\text{Fe} / [\text{Fe}^{2+}] // [\text{Ag}^{+}] / \text{Ag}$

الحدث:

السبب:

السؤال السابع قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب بالجدول :


وجه المقارنة	Fe/Fe ²⁺ //Ag ⁺ /Ag	2Al + 3 Zn ²⁺ → 2Al ³⁺ + 3Zn
المادة التي تأكسدت اثناء عمل الخلية		
المادة التي اختزلت اثناء عمل الخلية		

السؤال الثامن: استخدم المفاهيم الموضحة في الجدول لتنظيم خريطة مفاهيم تحتوي على الأفكار الرئيسية الواردة فيها


كاثود- خلية الكتروليمائية - انود - عامل مؤكسد - أكسدة - عامل مختزل - اختزال

1.

المناهج الكويتية
almanahj.com/kw



- تقل كتلة القطب - Ag - القطب الموجب - القطب السالب - تزيد كتلة القطب - Sn -
- Sn / Sn²⁺_(aq)//Ag⁺_(aq) / Ag



السؤال التاسع : أ - ادرس الجدول التالي وضع خطأ تحت الجمل أو العبارات التي لها صلة بالعبارة الرئيسية

العبارة الرئيسية	الخلايا الجلفانية		
الجمل والعبارات	الأنود سالب الشحنة	الجسر الملحي	الأنود موجب الشحنة
	تفاعلات الأكسدة والاختزال تلقائية	تفاعلات الأكسدة والاختزال غير تلقائية	تحتاج الي مصدر خارجي (بطارية)
	الكاثود سالب الشحنة	المركم الرصاصي	الكاثود موجب الشحنة

ب - ادرس الجدول التالي وضع خطأ تحت الجمل أو العبارات التي ليس لها صلة بالعبارة الرئيسية

العبارة الرئيسية	الخلايا الجلفانية		
الجمل والعبارات	الأنود سالب الشحنة	الجسر الملحي	الأنود موجب الشحنة
	تفاعلات الأكسدة والاختزال تلقائية	المركم الرصاصي	تحتاج الي مصدر خارجي (بطارية)
	الكاثود سالب الشحنة	تفاعلات الأكسدة والاختزال غير تلقائية	الكاثود موجب الشحنة

السؤال العاشر: اختر من القائمة (ب) ما يناسبها من القائمة (أ) بوضع الرقم المناسب بين القوسين:

الرقم المناسب	القائمة (أ)	الرقم	القائمة (ب)
()	رمز اصطلاحي لخلية جلفانية يزداد فيها تركيز أيونات الحديد II	1	$\text{Fe} / [\text{Fe}^{2+}] // [\text{Cu}^{2+}] / \text{Cu}$
()	رمز اصطلاحي لخلية جلفانية يقل فيها تركيز أيونات الخارصين	2	$\text{Zn} / [\text{Zn}^{2+}] // [\text{Fe}^{2+}] / \text{Fe}$
		3	$\text{Al} / [\text{Al}^{3+}] // [\text{Zn}^{2+}] / \text{Zn}$
الرقم المناسب	القائمة (أ)	الرقم	القائمة (ب)
()	تفاعل كلي لخلية جلفانية يزداد فيها تركيز أيونات الحديد II	1	$\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$
()	تفاعل كلي لخلية جلفانية يقل فيها تركيز أيونات الخارصين	2	$\text{Zn} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe} + \text{Zn}^{2+}$
		3	$2\text{Al} + 3\text{Zn}^{2+} \rightarrow 3\text{Zn} + 2\text{Al}^{3+}$
الرقم المناسب	القائمة (أ)	الرقم	القائمة (ب)
()	قطب الكاثود في الخلية الجلفانية	1	سالب الشحنة
()	قطب الكاثود في الخلية الإلكتروليتية	2	موجب الشحنة
		3	تتجه له الأنيونات

الوحدة الرابعة: الكيمياء الكهربائية

الفصل الثاني : الخلايا الإلكتروليتية أنصافها وجهودها

(الدرس (1-2) أنصاف الخلايا وجهود اختزالها

السؤال الأول: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :

1. مقياس قدرة الخلية على إنتاج تيار كهربائي، ويقاس عادة بالفولت. ()
2. الفرق بين جهد الاختزال لنصف الخلية الذي يحدث عنده الاختزال وجهد الاختزال لنصف الخلية الذي يحدث عنده الأكسدة. ()
3. ترتيب العناصر في سلسلة تنازلياً بحسب النشاط الكيميائي وتصاعدياً بحسب جهود الاختزال القياسية لأنصاف الخلايا. ()
4. ترتيب أنصاف خلايا مختلفة ترتيباً تصاعدياً تبعاً لجهود اختزالها القياسية مقارنة بنصف خلية الهيدروجين القياسية. ()
5. النوع الذي يمثل أقوى عامل مؤكسد في السلسلة الإلكتروليتية. ()

السؤال الثاني : أكمل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علمياً:

1. إذا كان جهد خلية الهيدروجين - النحاس القياسية يساوي $+0.34 \text{ V}$ بعد توصيل قطب الهيدروجين بالقطب السالب لمقياس الجهد، فذلك يدل على أن ميل كاتيونات النحاس إلى الاختزال لذرات نحاس من ميل كاتيونات الهيدروجين إلى الاختزال إلى غاز الهيدروجين.
2. خلية فولتية مكونة من نصف خلية مغنسيوم قياسية Mg^{2+}/Mg أنوداً ونصف خلية هيدروجين قياسية كاثوداً وجهد الخلية $E^0_{\text{Cell}} = 2.37 \text{ V}$ ، فإن جهد الاختزال القياسي للمغنسيوم Mg^{2+}/Mg يساوي
3. طبقاً للتفاعلين التاليين : $\text{X}^{2+} + \text{Y}^{2+} \rightarrow \text{X} + \text{Y}^{2+}$ - $\text{X}^{2+} + \text{Z} \rightarrow \text{X} + \text{Z}^{2+}$ نستنتج أن جهد الاختزال القياسي للعنصر Y من جهد الاختزال القياسي للعنصر Z.
4. التفاعل التالي يمثل التفاعل الكلي لخلية جلفانية $\text{X}_{(s)} + \text{Y}^{2+}_{(aq)} \rightarrow \text{X}^{2+}_{(aq)} + \text{Y}_{(s)}$ ، مما يدل على أن جهد الاختزال القياسي للعنصر X من جهد الاختزال القياسي للعنصر Y.
5. إذا علمت أن جهد الاختزال القياسي لقطب $(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn} = -0.14\text{V})$ ولقطب $(\text{Ag}^+/\text{Ag} = +0.8\text{V})$ فإن الجهد القياسي للخلية الجلفانية المكونة منهما يساوي فولت.
6. العامل المؤكسد في الخلية الجلفانية التي لها الرمز الاصطلاحي: $\text{Fe} / [\text{Fe}^{2+}] // [\text{Cd}^{2+}] / \text{Cd}$ هو
7. إذا كان جهد الاختزال القياسي للنحاس يساوي $(+0.34 \text{ V})$ فإن جهد خلية الهيدروجين - النحاس القياسية يساوي

8. خلية جلفانية مكونة من نصف الخلية القياسية X^{2+} / X بحيث كان قطبها انودا ونصف خلية الهيدروجين القياسية كاثودا وجهد الخلية القياسي لهذه الخلية يساوي (+0.14) فولت، فإن جهد الاختزال القياسي لنصف الخلية X^{2+} / X يساوي فولت.
9. إذا كان جهد اختزال المغنسيوم يساوي (-2.4) فإن التفاعل الكلي الحادث في هذه الخلية الجلفانية المكونة من المغنسيوم والهيدروجين هو
10. خلية جلفانية مكونة من النصفين (X^{2+} / X) ، $(H^+ / H_2, Pt)$ ، فإن غاز الهيدروجين يتصاعد إذا كانت قيمة جهد الاختزال القياسي للقطب (X^{2+} / X) ذات إشارة
11. كلما قلت قيمة جهد اختزال الفلز شدة تفاعله مع حمض الهيدروكلوريك.
12. يتفاعل الصوديوم بشدة مع الماء ويتصاعد غاز الهيدروجين، لأن جهد اختزاله من جهد اختزال الهيدروجين.
13. إذا علمت أن جهد اختزال كل من المغنسيوم والفضة $(-2.38 V, +0.8 V)$ على الترتيب، فإنه عند وضع شريحة من المغنسيوم في محلول نترات الفضة يؤدي ذلك الى اختزال
14. إذا علمت أن $(E^0_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76 V)$ ، $(E^0_{Fe^{2+}/Fe} = -0.44 V)$ ، فإن تفاعل الخارصين مع حمض الهيدروكلوريك نشاطاً من تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك.
15. الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية ذات أكبر جهد قياسي طبقاً لجهود الاختزال القياسية من بين الأنواع التالية :
 $[E^0_{Mg^{2+}/Mg} = -2.4, E^0_{Cu^{2+}/Cu} = +0.34 V, E^0_{Ag^+/Ag} = +0.8 V]$
هو:
16. إذا علمت أن تفاعل فلز الحديد مع حمض الهيدروكلوريك أقل شدة من تفاعل فلز الخارصين مع الحمض نفسه ، فإن ذلك يدل على أن الخارصين نشاطاً من الحديد.
17. لا يتصاعد غاز الهيدروجين عند وضع قطعة من فلز النحاس في محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف، لأن جهد الاختزال القياسي للنحاس قيمته ذات إشارة
18. لا يمكن حساب جهد اختزال نصف خلية معينة بمفرده ولكي يمكن ذلك ، يتم توصيلها مع نصف خلية القياسية والذي جهد الاختزال القياسي له يساوي فولت.
19. طبقاً لخلية (الخارصين – الهيدروجين) القياسية إذا علمت أن جهد الاختزال القياسي لنصف خلية الخارصين يساوي $-0.76 V$ فإن ميل كاتيونات الخارصين للاختزال لذرات الخارصين من ميل كاتيونات الهيدروجين الى الاختزال لغاز الهيدروجين
20. كاتيون الهيدروجين أسهل اختزالاً من كاتيونات العناصر التي في سلسلة جهود الاختزال القياسية
21. إذا كان التفاعل التالي: $Mg + Ni^{2+} \rightarrow Ni + Mg^{2+}$ يحدث تلقائياً ، فإن ذلك يدل على أن جهد الاختزال القياسي للمغنسيوم من جهد الاختزال القياسي للنكل.
22. يحل المغنسيوم تلقائياً محل الرصاص في محاليل مركباته مما يدل على أن جهد اختزال الرصاص من جهد اختزال المغنسيوم .

23. طبقاً للتفاعل التلقائي التالي $M + X^{2+} \rightarrow X + M^{2+}$ فإن العنصر الافتراضي X يقع العنصر الافتراضي M في السلسلة الالكتروكيميائية.
24. إذا كان التفاعل التالي $Fe + Cd^{2+} \rightarrow Cd + Fe^{2+}$ يحدث تلقائياً ، فإن فلز الحديد فلز الكاديوم في السلسلة الالكتروكيميائية.
25. خلية الجلفانية رمزها الاصطلاحي: $Al / Al^{3+}(1M) // H^{+}(1M) / H_2(1 \text{ atm}), Pt$ فإن معادلة التفاعل الكلي الموزونة لها هي:
26. طبقاً للتفاعل التالي $2Na + H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$ فإن الأنود هو
27. تهاجر من الأنود إلى الكاثود خلال الجسر الملحي في الخلية الجلفانية و تهاجر من الكاثود إلى الأنود إعادة التعادل الكهربائي لمحلول نصفي الخلية الجلفانية.
28. التفاعل التلقائي التالي: $Fe + Ni^{2+} \rightarrow Ni + Fe^{2+}$ يدل على حدوث عملية لكاتيون النيكل
29. عند غلق الدائرة واثناء تشغيل الخلية الجلفانية $Mg/[Mg^{2+}] // [Ag^{+}] / Ag$ تركيز الكاتيون Ag^{+} .
30. الأنود في الخلية الجلفانية هو القطب الذي تحدث عنده عملية الأكسدة ويكون جهد اختزاله من الكاثود.
31. التفاعل الحادث في الخلية الفولتية التالية: $Zn + 2H^{+} \rightarrow Zn^{2+} + H_2$ تلقائي، ونصف خليه فيها يعمل أنود للخلية.
32. العامل المؤكسد طبقاً للتفاعل التالي: $Fe + Ni^{2+} \rightarrow Ni + Fe^{2+}$ هو
33. عند عمل الخلايا الالكتروليزية تحدث عملية عند الكاثود وعملية عند الأنود .
34. إذا علمت ان جهود الاختزال القياسية للعنصرين الافتراضيين Y , X هي علي الترتيب (+1.06 V , +1.36 V) فإن ذلك يعني أن التفاعل التالي: $X_2 + 2NaY \rightarrow 2NaX + Y_2$ تلقائياً.
35. طبقاً للسلسلة الالكتروكيميائية يعتبر الفلور أقوى ، وكاتيون الليثيوم أضعف عامل
36. أقوى عامل مختزل في سلسلة جهود الاختزال القياسية هو
37. الفلز الذي يقع في سلسلة جهود الاختزال القياسية يحل محل الفلز الذي يقع في هذه السلسلة.
38. كاتيونات البلاتين والنحاس اختزالاً من كاتيونات الهيدروجين في حمض الهيدروكلوريك أو الماء.
39. يزداد نشاط الفلز وقدرته على فقد الإلكترونات قيمة جهد الاختزال القياسي له.
40. الفلز الذي له جهد اختزال أقل كاتيون الفلز الذي يليه في السلسلة الالكتروكيميائية.
41. أقوى العوامل المؤكسدة هي الانواع التي تقع على يسار العلامة "/" وفي سلسلة جهود الاختزال القياسية.
42. أقوى العوامل المختزلة هي تلك الانواع التي تقع على يمين العلامة "/" وفي السلسلة الالكتروكيميائية.
43. قيم جهود اختزال لأصاف الخلايا التي تلي الهيدروجين في السلسلة الالكتروكيميائية ذات إشارة
44. يعتبر الليثيوم أقوى العوامل في السلسلة الالكتروكيميائية، بينما أضعفها هو
45. إذا كانت قيمة جهد التفاعل ذات إشارة سالبة ، فإن هذا التفاعل تلقائياً.
46. إذا علمت ان جهد اختزال النيكل ($E^0_{Ni^{2+}/Ni} = - 0.25 \text{ V}$) وجهد اختزال الحديد ($E^0_{Fe^{2+}/Fe} = - 0.44 \text{ V}$) ، فإن هذا التفاعل التالي: $Fe + Ni^{2+} \rightarrow Ni + Fe^{2+}$ بشكل تلقائي.

47. إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية التالية ($Mg^{+2} / Mg = -2.4 V$) و ($Zn^{+2} / Zn = -0.76 V$) ، فإن

التفاعل التالي: $Zn^{2+} + Mg \rightarrow Mg^{2+} + Zn$ بشكل تلقائي.

48. اللافلز الذي يقع أسفل السلسلة الالكتروكيميائية يكون ميله الى الكترولونات أكبر من ميل اللافلز الذي يسبقه .

49. إذا كان العنصر (X) يحل محل أنيونات العنصر (Y) في محاليل مركباته ، فإن ذلك يدل على أن جهد الاختزال

القياسي للعنصر (X) جهد الاختزال القياسي للعنصر Y.

50. يستطيع أن يحل محل جميع أنيونات الهالوجينات الأخرى في محاليل مركباتها.

51. إذا كانت جهود الاختزال القياسية لكل من الكلور ($1.36 V$) واليود ($0.54 V$) على الترتيب ، فإن قيمة جهد

التفاعل التالي: $Cl_2 + 2KI \rightarrow 2KCl + I_2$ يساوى

52. إذا علمت ان جهد الاختزال القياسي لليود يساوى ($+0.54V$) وجهد الاختزال القياسي للبروم ($+1.07 V$) فإن

التفاعل التالي: $2NaBr + I_2 \rightarrow 2NaI + Br_2$ بشكل تلقائي.

53. طبقاً للتفاعل التالي $Br_2 + 2KI \rightarrow 2KBr + I_2$ وعلماً أن ($E^0_{I_2/I^-} = +0.54V$, $E^0_{Br_2/Br^-} = +1.07V$) ،

فإن التفاعل بشكل تلقائي .

54. اللافلز الذي له جهد اختزال يحل محل أنيون اللافلز الذي يسبقه في السلسلة ويطرده من محاليل أملاحه.

55. اللافلز الوحيد الذي يستطيع أن يحل محل الكلور في محاليل أملاحه هو.....

56. الكلور يحل محل اليود في محاليل مركباته تلقائياً ، لأن اليود الكلور في السلسلة الالكتروكيميائية.

57. يستطيع الفلور..... أنيون الكلوريد في محاليل مركباته لأنه يليه في السلسلة الالكتروكيميائية.

السؤال الثالث: اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي وضع علامة (✓) في المربع المقابل لها :

1. جميع ما يلي تعمل كنصف خلية أنود عند توصيلها مع نصف خلية الهيدروجين القياسية ، ماعدا واحدة :

☐ نصف الخلية (Z) التي يتم توصيلها بالطرف السالب عند قياس جهد الخلية

☐ نصف الخلية (X) التي لها جهد اختزال أقل من الصفر

☐ نصف الخلية (M) التي يحدث فيها عملية الاختزال

☐ نصف الخلية (Y) التي ينتقل الإلكترونات منها لنصف خلية الهيدروجين.

2. يمكن تحديد قطب الأنود في الخلايا الجلفانية بواسطة أحد ما يلي :

☐ الرمز الاصطلاحي حيث يكون الانود على اليمين

☐ التفاعل الكلي حيث يكون الانود هو القطب الذي يحدث له عملية اختزال

☐ قيم جهود الاختزال حيث يكون الأنود هو النوع الذي له أكبر جهد اختزال

☐ التفاعل الكلي حيث يكون الانود هو القطب الذي تحدث له عملية اكسدة

3. طبقا للتفاعل الكلي التالي لخلية جلفانية: $Zn + 2H^+ \rightarrow H_2 + Zn^{2+}$ ، فإن أحد ما يلي صحيح :
☐ جهد اختزال الخارصين (أكبر من الهيدروجين) ☐ الخارصين يلي الهيدروجين في السلسلة
☐ الخارصين عامل مختزل أقوى من الهيدروجين ☐ الخارصين عامل مؤكسد أقوى من الهيدروجين
4. طبقا للخلية الجلفانية ذات الرمز الاصطلاحي التالي: $Zn / Zn^{2+}(1M) // H^+(1M) / H_2(1atm) , Pt$ نصف خلية الهيدروجين القياسية يمثل أحد الأقطاب التالية :
☐ ذو إشارة سالبة ☐ الكاثود
☐ تتم عنده عملية أكسدة ☐ الأنود
5. خلية جلفانية مكونة من نصفين، مغنسيوم ($E^0_{Mg^{2+}/Mg} = - 2.37V$) و حديد ($E^0_{Fe^{2+}/Fe} = - 0.44 V$) ،
 فإن أحد العبارات التالية غير صحيحة :
☐ تقل كتلة قطب المغنسيوم ☐ المغنسيوم عامل مختزل
☐ نصف خلية الكاثود هو Fe^{2+}/Fe ☐ الحديد عامل مختزل
6. طبقا للخلية الجلفانية ذات الرمز الاصطلاحي: $Pt, H_2(1atm) / H^+(1M) // Cu^{2+}(1M) / Cu$ فإن أحد ما يلي صحيح :
☐ تنتقل الإلكترونات من قطب الهيدروجين الى كاثيون النحاس وينتج تيار كهربائي عند تشغيل الخلية
☐ جهد الخلية يساوي $(E^0_{Cell} = - E^0_{Cu^{2+}(1M) / Cu})$.
☐ معادلة العملية الحادثة عند قطب الانود هي $2H^+_{(aq)} + 2e^- \rightarrow H_{2(g)}$
☐ يحدث اختزال لفلز النحاس
7. خلية جلفانية رمزها الاصطلاحي: $Sc / Sc^{3+}(1M) // Zr^{4+}(1M) / Zr$ ، فإن التفاعل الكلي الحادث فيها هو أحد ما يلي :
 $3Sc_{(s)} + 4Zr^{4+}_{(aq)} \rightarrow 4Zr_{(s)} + 3Sc^{3+}_{(aq)}$ ☐ $4Sc_{(s)} + 3Zr^{4+}_{(aq)} \rightarrow 4Sc^{3+}_{(aq)} + 3Zr_{(s)}$ ☐
 $4Sc^{3+}_{(aq)} + 3Zr^{4+}_{(aq)} \rightarrow 4Zr_{(s)} + 4Sc_{(s)}$ ☐ $Sc_{(s)} + Zr^{4+}_{(aq)} \rightarrow Zr_{(s)} + Sc^{3+}_{(aq)}$ ☐
8. خلية جلفانية رمزها الاصطلاحي: $Pt, H_2(1atm) / H^+(1M) // Cu^{2+}(1M) / Cu$ فإذا علمت أن جهد الاختزال القياسي للنحاس (+0.34) فولت فإن جميع العبارات التالية صحيحة عدا واحدة :
☐ تسري الإلكترونات من قطب الهيدروجين إلى قطب النحاس في الدائرة الخارجية.
☐ الجهد القياسي للخلية $E^0_{cell} =$ جهد الاختزال القياسي للنحاس
☐ التفاعل النهائي في الخلية هو $Cu + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + H_2$
☐ جهد الأكسدة القياسي للنحاس = جهد الاختزال القياسي للخلية E^0_{cell} مسبقا بإشارة سالبة.

9. إذا كانت جهود الاختزال القياسية لكل من المغنيسيوم و الألمنيوم و الخارصين و النحاس على الترتيب هي (-2.37 , -1.66 , -0.76 , +0.34) فإن ذلك يدل على أحد ما يلي:

- ☐ النحاس يختزل كاتيون الخارصين ☐ الخارصين يختزل كاتيونات المغنيسيوم
- ☐ المغنيسيوم يختزل كاتيون الألمنيوم ☐ الخارصين يختزل كاتيون الألمنيوم

10. إذا علمت ان جهود الاختزال القياسية لكل من (المغنيسيوم ، الفضة ، النحاس ، الخارصين) هي على الترتيب

(-2.38 V , +0.8 V , +0.34 V , -0.76 V) فان احد التفاعلات التالية يتم بشكل تلقائي:



11. جميع أنصاف الخلايا التي تسبق الهيدروجين في السلسلة الالكتروكيميائية تتميز بأحد ما يلي :

☐ تحل فلزاتها محل الهيدروجين في مركباته كالماء والأحماض

☐ توجد العناصر الفلزية منها في الطبيعة بصورة منفردة

☐ أسهل في الاختزال من الهيدروجين

☐ قيم جهود الاختزال لها ذات إشارة موجبة

12. المعادلة التالية تمثل التفاعل الكلي لخلية جلفانية $X + Y^{2+} \rightarrow Y + X^{2+}$ مما يدل على أحد ما يلي:

☐ جهد اختزال العنصر X أكبر من Y ☐ العنصر X يعتبر عامل مؤكسد

☐ جهد اختزال العنصر X اقل من Y ☐ العنصر Y يعتبر عامل مختزل

13. إذا كان الفلز (A) مغمور في محلول الفلز (B) وحتى يحدث تفاعل الأكسدة والاختزال بشكل تلقائي يجب أن

يكون جهد اختزال النوع (A) والنوع (B) كأحد ما يلي:



14. إذا كان التفاعل التالي: $Mg + Fe^{2+} \rightarrow Fe + Mg^{2+}$ يحدث بشكل تلقائي فان ذلك يدل على أحد ما يلي:

☐ المغنيسيوم يلي الحديد في السلسلة الالكتروكيميائية ☐ جهد اختزال الحديد اقل من جهد اختزال المغنيسيوم

☐ الحديد عامل مختزل أقوى من المغنيسيوم ☐ الحديد اقل نشاطا من المغنيسيوم





15. إذا علمت ان قيمه جهود الاختزال القياسية للأنواع التالية هي:

$$[E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0.34 \text{ V}, E^0_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}} = -1.66 \text{ V}, E^0_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = +0.8 \text{ V}, E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0.25 \text{ V}]$$





فإن الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية التي لها أكبر جهد يمكن الحصول عليه هو:







16. أقوى العوامل المؤكسدة من الأنواع التالية (جهود الاختزال القياسية بين القوسين):






17. أكثر العناصر التالية قدرة على اكتساب الإلكترونات من الأنواع التالية (جهود الاختزال القياسية بين القوسين):



18. أفضل العوامل المختزلة من الأنواع التالية (جهود الاختزال القياسية بين القوسين):




19. اقل الفلزات التالية قدره على فقد إلكترونات أثناء التفاعلات الكيميائية (جهود الاختزال القياسية بين القوسين):






20. الشكل يمثل جهود الاختزال الافتراضية لعدة فلزات ومنه يكون

الترتيب التنازلي للفلزات حسب نشاطها الكيميائي هو أحد ما يلي :



21. اللافلز الأكثر نشاطاً كيميائياً فيما يلي هو (قيمة جهد الاختزال بين القوسين):



22. يتفاعل العنصر X مع محلول العنصر Y طبقاً للمعادلة التالية $\text{X} + \text{Y}^{2+} \rightarrow \text{Y} + \text{X}^{2+}$ ، فإن إحدى

العبارات التالية صحيحة:

☐ العنصر X يلي عنصر Y في سلسله جهود الاختزال

☐ العنصر X عامل مؤكسد أقوى من العنصر Y

☐ العنصر X عامل مختزل أقوى من العنصر Y

☐ جهد الاختزال القياسي للعنصر X أكبر منه للعنصر Y



23. ستة قطع معدنية مرتبة تنازلياً حسب النشاط في السلسلة الالكتروكيميائية من (الخاصين ، الحديد ، الرصاص ، النحاس ، الفضة ، الذهب) ، غمرت في محاليل أملاح مختلفة فالفلز الذي يتغذى بطبقة من فلز آخر نتيجة غمره في المحلول هو أحد ما يلي:




☐ الفضة في محلول نترات الرصاص II

☐ النحاس في محلول كبريتات الحديد II




☐ الحديد في محلول كلوريد النحاس II

☐ الذهب في محلول كبريتات الخاصين

24. إذا علمت ان التفاعلات التالية تحدث بصفه تلقائيه مستمرة: -



فان أحد التفاعلات التالية لا يحدث بشكل تلقائي :



السؤال الرابع: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة غير الصحيحة في كل من

العبارات التالية:

1. كاتيون الهيدروجين أسهل اختزالاً من كاتيونات العناصر التي تسبقه في سلسلة جهود الاختزال ()

2. طبقاً للخلية الجلفانية المكونة من النصفين $\text{X}^{2+}(1\text{M}) / \text{X}$ و $\text{H}^+(1\text{M}) / \text{H}_2(1\text{atm}), \text{Pt}$ ،

يتصاعد غاز الهيدروجين اذا كان جهد الاختزال القياسي للقطب $\text{X}^{2+}(1\text{M}) / \text{X}$ اشارته سالبة. ()

3. عند توصيل نصف خلية الهيدروجين بالطرف الموجب للفولتميتر ونصف خلية الخارصين بالطرف السالب وكانت القراءة موجبة فإن ناتج الاختزال هو تساعد غاز الهيدروجين عند الكاثود. ()
4. إذا كان القطب X يعمل كأنود عند توصيله بنصف خلية الهيدروجين في الخلية الجلفانية فإن ذلك يدل على أن جهد اختزال القطب X ذو قيمة سالبة. ()
5. التفاعل التالي $X + Y^{2+} \rightarrow Y + X^{2+}$ يحدث تلقائياً مما يدل على أن جهد اختزال العنصر X أكبر من جهد اختزال العنصر Y . ()
6. جميع الأنواع التي تسبق الهيدروجين في سلسلة جهود الاختزال يمكن أن توجد بصورة منفردة في الطبيعة. ()
7. الفلز الأعلى في سلسلة جهود الاختزال يحل محل كاتيونات الفلزات التي تليه في السلسلة. ()
8. إذا حدث التفاعل التالي بشكل تلقائي: $2Al + 3Zn^{2+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3Zn$ ، فإن ذلك يدل على أن فلز الألمنيوم يسبق الخارصين في سلسلة جهود الاختزال القياسية. ()
9. أقوى العوامل المؤكسدة هي تلك الأنواع التي تقع على يمين السهمين وفي أسفل السلسلة. ()
10. يحل المغنسيوم تلقائياً محل الحديد في محاليل أو مصاهير مركباته مما يدل على أن المغنسيوم يلي الحديد في سلسلة جهود الاختزال القياسية. ()
11. يقع الليثيوم Li أعلى السلسلة الالكتروكيميائية بينما يقع الفلور F_2 أسفلها، لذلك يكون أنيون الفلوريد F^- عاملاً مؤكسداً أقوى بكثير من عنصر الليثيوم Li . ()
12. يعتبر عنصر الليثيوم أقوى العوامل المختزلة في السلسلة الالكتروكيميائية. ()
13. يمكن ان يسلك الليثيوم Li في أي تفاعل كيميائي سلوك العامل المؤكسد. ()
14. يمكن للكلور ان يحل تلقائياً محل اليود في محاليل مركباته مما يدل على ان اليود يسبق الكلور في سلسلة جهود الاختزال. ()
15. يقاس نشاط اللافلزات بقدرتها على الأكسدة، لذلك يحل اللافلز الذي يقع أعلى السلسلة محل أنيونات اللافلزات التي تليه في محاليل مركباته. ()

السؤال الخامس: علل لما يلي تعليلاً علمياً صحيحاً :

1. لا يمكن قياس الجهد الكهربائي لنصف خلية مفردة.
2. لا يمكن قياس الجهد الكهربائي لنصف خلية الخارصين أو لنصف خلية النحاس وهما منفصلان عن بعضهما البعض ولكن يمكن ذلك عند توصيلهما لتكوين خلية فولتية.

3. تستخدم نصف خلية الهيدروجين القياسية لتحديد قيمة جهد الاختزال القياسي لأي نصف خلية آخر.

4. يتصاعد غاز الهيدروجين عند تفاعل الخارصين مع حمض الهيدروكلوريك.

5. لا يتأثر النحاس بمحاليل الأحماض المخففة في الظروف العادية



6. لا يتصاعد غاز الهيدروجين عند تفاعل النحاس مع حمض الهيدروكلوريك.

أو لا يصلح فلز النحاس لتحضير غاز الهيدروجين من حمض الهيدروكلوريك في المختبر.

7. يمكن استخدام فلز المغنسيوم ولا يمكن استخدام فلز النحاس في تحضير غاز الهيدروجين من الأحماض

8. يتآكل سطح فلز المغنسيوم عند وضعه في محلول كبريتات حديد II

9. لا يستخدم الصوديوم في صناعته الحلى أو العملات المعدنية ($E^0_{Na^+/Na} = -2.7V$)

أو يحفظ الصوديوم تحت سطح الكيروسين في المختبر أو لا يحفظ الصوديوم تحت سطح الماء.

أولا يوجد الصوديوم منفردا في الطبيعة

10. يستخدم كل من الذهب والفضة والبلاتين في صناعة الحلى وتوجد في الطبيعة بالحالة العنصرية.

11. انصاف الخلايا التي تلي الهيدروجين بالسلسلة دائماً تسلك كقطب كاثود إذا وصلت بنصف خلية الهيدروجين القياسية

12. لا يمكن الحصول علي فلز الألومنيوم عمليا باختزال كاتيوناته من المحاليل المائية بالتحليل الكهربائي.

{ جهد الاختزال القياسي للماء للاختزال = -0.41 فولت , جهد الاختزال القياسي للألومنيوم = -1.67 فولت }

13. لا يصح حفظ محلول كبريتات النحاس II المستخدم كمبيد حشري في أواني من الحديد

موقع
المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

14. يعتبر الألومنيوم عاملاً مختزلاً أقوى من الفضة

15. يغطي سطح فلز المغنسيوم بطبقة من الفضة عند وضع شريط مغنسيوم في محلول نترات الفضة

16. العناصر الفلزية التي تسبق الهيدروجين لا توجد على الحالة العنصرية في الطبيعة وإنما توجد على شكل مركبات.

17. يصدأ الحديد عند تركه معرضاً للهواء الرطب.

18. العناصر الفلزية التي تلي الهيدروجين يمكن أن توجد في الطبيعة في الحالة العنصرية.

19. الفلور يستطيع ان يحل محل جميع الهالوجينات في محاليل مركباتها.

20. لا يستطيع اليود أن يحل محل أنيونات الهالوجينات الاخرى في محاليل مركباتها.

21. لا يستطيع الكلور أن يحل محل الفلور في محاليل مركباته.

22. يمكن تحضير البروم بتفاعل محاليل املاحه مع عنصر الكلور.

23. يمكن حفظ محلول كبريتات الخارصين في اناء من النحاس ولا يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس II في اناء من الخارصين

24. جهد الاختزال القياسي للنحاس يكون بإشارة موجبة في خلية النحاس-الهيدروجين القياسية.

السؤال السادس: ماذا يحدث في الحالات التالية مع تفسير السبب

1. لإناء الحديد عند استخدامه لحفظ محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف. ($E^0_{Fe^{2+}/Fe} = - 0.44 V$)

الحدث:

السبب:

2. لإناء النحاس عند استخدامه لحفظ محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف. ($E^0_{Cu^{2+}/Cu} = +0.34 V$)

الحدث:

السبب:

3. إضافة البلاتين لمحاليل الأحماض المخففة في الظروف العادية. (من حيث وجود التفاعل)

الحدث:

السبب:

4. لقطب المغنسيوم عند وضعه في محلول كبريتات حديد II
علما بأن جهود الاختزال القياسية لكل من : ($\text{Fe}^{2+}/\text{Fe} = -0.44 \text{ V}$, $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg} = -2.37 \text{ V}$)

الحدث:
السبب:

5. للحديد عند تركه معرضاً للهواء الرطب.

الحدث:
السبب:

السؤال السابع : أجب عما يلي:

القطب	الجهود القياسية بالفولت
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$	(-2.71V)
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	(-2.37V)
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	(0.00V)
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	(+0.34V)
$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$	(1.36 V)

1- مستعيناً بالجدول المقابل أجب عن الأسئلة التالية :

أ- اقوى العوامل المؤكسدة من هذه الانواع هو

ب- اقوى العوامل المختزلة من هذه الانواع هو

ج- الفلز الذي له القدرة على اختزال الكاتيون Mg^{2+} هو

د- الفلز الذي يمكن أن يوجد في الحالة العنصرية في الطبيعة هو

2- قطعتان من Mg ، Cu متلاصقتان وضعتا في محلول لحمض (HCl) تركيزه 0.1M فإذا علمت أن جهود الاختزال

لكل من (المغنسيوم ، النحاس ، الهيدروجين) على التوالي هي (0 V , +0.34 V , -2.37 V)

والمطلوب الإجابة عن الأسئلة التالية:

أ- حدد أي من التفاعلات التالية يمكن أن يحدث تلقائياً:



ب- فسر لماذا لا يتأكسد النحاس Cu إلى Cu^{2+} ؟

3- عند غمر الفلز (A) في محلول نترات الفلز (B) تترسب طبقة على القطب (A) أما عند غمر الفلز (C) في

نفس المحلول لا يحدث تغير ، مما سبق اجب عن الأسئلة التالية:


أ- الفلز الذي له أقل جهد اختزال هو والفلز الذي له أكبر جهد

اختزال هو

ب- المادة المترسبة على القطب A هي ذرات الفلز

ج- ماهي التغيرات التي تحدث عند القطب (A) ؟

.....



4- مستعيناً بالجدول المقابل أجب عن الأسئلة التالية:

نصف التفاعل	الجهد القياسي
$\text{Sn}^{+2} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Sn}$	-0.14
$\text{Pb}^{+2} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{pb}$	-0.13
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	0.00
$\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Br}^-$	+1.07
$\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^-$	+1.36

1. أكثر العناصر ميلاً لفقد الكترونات بالجدول ، هو
2. أفضل العناصر ميلاً لاكتساب الكترونات بالجدول ، هو
3. التفاعل التالي: $\text{pb} + \text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn} + \text{pb}^{+2}$ بشكل تلقائي.
4. البروم محل الكلور في محاليل مركباته.

5 - إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية لكل من أنصاف الخلايا التالية


($\text{Al}^{3+}/\text{Al} = -1.67 \text{ V}$ - $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu} = +0.34 \text{ V}$ - $\text{Pb}^{2+}/\text{Pb} = -0.13 \text{ V}$) ، فاجب عن الأسئلة التالية:

- أ- القطب الذي لا يمكن أن يكون أنوداً في أي خلية جلفانية مكونة من الأنصاف السابقة ، هو:
- ب- لا يمكن حفظ محلول نترات الرصاص $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ في وعاء من
- ت- يمكن حفظ محلول نترات الرصاص $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ في وعاء من

6- أمامك جزء من سلسلة جهود الاختزال القياسية والمطلوب الإجابة عن الأسئلة التالية:



$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Mg}$	1. أقوى العوامل المؤكسدة من هذه الأنواع هو
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}$	2. أقوى العوامل المختزلة من هذه الأنواع هو
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	3. النوع الذي يختزل H^+ ولا يختزل Mg^{2+} هو
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$	4. النوع الذي يؤكسد H_2 ولا يؤكسد Ag هو
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$	5. التفاعل الكلي في الخلية الجلفانية التي لها أكبر جهد من هذه الأنواع ، هو:

7- الشكل المقابل يمثل جهود الاختزال الافتراضية لعدة فلزات والمطلوب اجب عن الأسئلة التالية:



1. أقوى العوامل المختزلة الموضحة بالشكل هي
2. أقوى العوامل المؤكسدة الموضحة بالشكل هي
3. يمكن الحصول علي أكبر جهد لخليه جلفانية عند استخدام أقطاب من العنصر والعنصر

8- إذا علمت أن التفاعلات التالية لعناصر فلزية افتراضية وتحدث بصفة تلقائية مستمرة:



ومنها اجب عن الأسئلة التالية:

أ- رتب الفلزات الافتراضية السابقة تنازلياً حسب نشاطها الكيميائي بالنسبة إلى بعضها البعض.

ب- اكتب الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية التي لها أكبر جهد من العناصر الافتراضية السابقة.





ج- أي الفلزات السابقة أقوى كعامل مختزل؟



9 - الفلزات الافتراضية (M, L, Z, Y, X) لكل منها قيمة ما من قيم جهود الاختزال القياسية التالية

(+0.58 V, -2.38 V, -0.58 V, +0.15 V, -1.03 V) أضيفت هذه الفلزات إلى محاليل مركبات

بعضها البعض وكانت النتائج كما هي ممثلة في المعادلات التالية :



والمطلوب إكمال الفراغات التالية :

1 - ترتيب أقطاب هذه العناصر بالنسبة لبعضها البعض حسب قيم جهود اختزالها القياسية في السلسلة الكهروكيميائية كالتالي : (أكتب قيمة جهد الاختزال أمام كل قطب)

الترتيب في السلسلة	قيم جهود الاختزال القياسية
$Z^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Z$	
$M^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons M$	
$X^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons X$	
$Y^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Y$	
$L^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons L$	

2 - العنصر (X) قادر على أن يختزل مركبات العناصر

3 - الكاتيون (Y^{2+}) قادر على أن يؤكسد العناصر

4 - أصعب المركبات اختزالاً هو مركب العنصر بينما أسهلها اختزالاً هو مركب العنصر

5 - العناصر التي تحل محل هيدروجين الأحماض المخففة هي أما العناصر التي لا تحل محله هي

6 - كاتيون الهيدروجين (H^+) يعتبر أصعب اختزالاً من كاتيونات العناصر وأسهل اختزالاً من كاتيونات العناصر

7- العناصر التي يمكن وجودها في الطبيعة على الحالة العنصرية هي
أما العناصر التي لا يمكن وجودها في الطبيعة على الحالة العنصرية هي

8 - لا يمكن حفظ محلول يحتوي على الكاتيون (M^{2+}) في إناء مصنوع من العنصر

9- عند عمل خلايا جلفانية من هذه الأقطاب ، فإن القطب الذي لا يمكن أن يكون كاثوداً في أي خلية منها هو قطب العنصر ، بينما القطب الذي لا يمكن أن يكون أنوداً في أي خلية منها هو قطب العنصر

10 - عند عمل خلية جلفانية من قطبي العنصرين M , Y فإن القطب الموجب في هذه الخلية هو قطب العنصر بينما القطب السالب فيها يكون هو قطب العنصر


11 - الخلية الجلفانية التي يمكن عملها من الأقطاب السابقة بحيث يكون لها أكبر قوة محركة كهربائية ، يمكن عملها من قطبي العنصرين
المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

12 - احسب القوة المحركة الكهربائية للخلية السابقة (في بند 12)

13 - لعمل خلية جلفانية جهداً القياسي يساوي ($+1.18 V$) بحيث كان قطب العنصر (Y) هو قطب الكاثود فيها ، فإن قطب الأنود يكون هو قطب العنصر


14 - عند عمل خلية جلفانية أحد أقطابها هو قطب الهيدروجين القياسي ، فإن الأقطاب التي تسلك أنوداً في هذه الخلايا هي أقطاب العناصر أما الأقطاب التي تسلك كاثوداً في هذه الخلايا هي أقطاب العناصر

15 - بين بالحساب هل يمكن حدوث التفاعل التالي تلقائياً ؟ ولماذا ؟




السؤال الثامن: استخدم المفاهيم الموضحة في الجدول لتنظيم خريطة مفاهيم تحتوي على الأفكار الرئيسية الواردة فيها

ذات جهود اختزال موجبة - لا توجد في الطبيعة في الحالة العنصرية - ذات جهود اختزال سالبة - يمكن أن توجد في الطبيعة في الحالة العنصرية



السؤال التاسع حل الأسئلة التالية



قام سالم بإجراء التجربة في الشكل المقابل في المختبر
وطلب منه معلم الكيمياء الإجابة على الأسئلة التالية
بكتابة الملاحظة والتفسير:

1- ماذا يحدث عند تقريب شظية مشتعلة من فوهة الأنبوب (1) والأنبوب (3) مع التفسير؟

في الأنبوب (1)

التفسير :

في الأنبوب (3)

التفسير :

.....

.....

2- هل يحدث تفاعل في الأنبوب (2) وما هي معادلة التفاعل الحادث إن وجد ؟ مع التفسير

.....

التفسير:

السؤال العاشر:

1. عند توصيل خلية جلفانية (نحاس - فضة) بفولتميتر كانت قراءته (+0.46 V) وعند استبدال قطب الفضة

بفلز X أصبحت قراءة الفولتميتر (+0.074 V) ، احسب جهد الاختزال القياسي لكاتيونات العنصر X^{2+}

علماً بأن جهد الاختزال القياسي لكل من الفضة والنحاس هي (+0.8 V , +0.34 V) على الترتيب .

الحل.....

السؤال الحادي عشر أسئلة متنوعة خاصة بالخلية الجلفانية (الفوليتية)

1- خلية جلفانية يحدث فيها التفاعل الكلي التالي $Al + Cr^{3+} \rightarrow Cr + Al^{3+}$ ، والمطلوب:


أ- قطب الكاثود في هذه الخلية هو قطب

ب- القطب السالب في هذه الخلية هو قطب

ت- القطب الذي تقل كتلته في هذه الخلية بمرور الوقت هو قطب

ث- باستمرار عمل الخلية يقل تركيز كاتيون في قطب ويزيد تركيز كاتيون في قطب الأنود.

2- إذا علمت ان التفاعلات التالية تتم بصفة تلقائية مستمرة



تم توصيل نصف خلية قياسية للعنصر (X) مع نصف خلية الفضة القياسية لعمل خلية جلفانية والمطلوب :

- أ- حدد مادة كل من الانود والكاثود في هذه الخلية؟
الأنود هو..... والكاثود هو
- ب- اكتب معادلات التفاعل الحادث في هذه الخلية عند كل من:

الانود:

الكاثود:


ج- معادلة التفاعل الكلي في هذه الخلية :

د - الرمز الاصطلاحي لهذه الخلية؟

موقع
المنهج الكويتية
almanhaj.com.kw

3- خلية جلفانية يحدث فيها التفاعل الكلي التالي: $\text{Fe} + \text{Ni}^{2+} \rightarrow \text{Ni} + \text{Fe}^{2+}$

والمطلوب: $(E^0_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}, E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0.25 \text{ V})$



- أ- ارسم شكلا تخطيطيا للخلية موضحا عليه كل من الانود والكاثود واتجاه حركة الالكترونات في السلك.

ب- اكتب أنصاف التفاعلات الحادثة في نصفي الخلية؟

نصف تفاعل الأنود:

نصف تفاعل الكاثود:

ت- اكتب الرمز الاصطلاحي لهذه الخلية:

ث- أي الاقطاب تقل كتلته؟ ولماذا ؟

ج- احسب جهد الخلية القياسي: $E^0_{\text{cell}} = \dots\dots\dots$

ح- اذكر وظائف الجسر الملحي في هذه الخلية؟

.....


.....

.....

.....

4- خلية جلفانية رمزها الاصطلاحي $\text{Sn} / [\text{Sn}^{2+}] // [\text{Pb}^{2+}] / \text{Pb}$

إذا علمت أن $(E^0_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0.13 \text{ V})$ ، $(E^0_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}} = -0.14 \text{ V})$ ، المطلوب:



1. ارسم شكل تخطيطي للخلية موضعاً عليه كلا من الأنود - الكاثود - اتجاه

حركة الإلكترونات في السلك

2. اكتب التفاعلات الكيميائية الحادثة عند كل من

الأنود:


الكاثود:

3. التفاعل الكلي في هذه الخلية:

4. احسب جهد الخلية القياسي: $E^0_{\text{cell}} = \dots\dots\dots$

5- خلية جلفانية موضحة بالرسم الذي أمامك ، فإذا علمت أن $(E^0_{\text{cell}} = +1.67 \text{ V})$ اجب عما يلي:

أ- احسب جهد الاختزال القياسي للألومنيوم .



ب- اكتب معادلات التفاعل الحادث في كل من نصفي الخلية والتفاعل الكلي.

عند الأنود:

عند الكاثود:

التفاعل الكلي:


ت- اكتب الرمز الاصطلاحي للخلية.

ث- حدد العامل المختزل في هذه الخلية مع ذكر السبب.

6- إذا علمت أن $(E^0_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}} = -1.67 \text{ V})$ ، $(E^0_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0.34 \text{ V})$ ، المطلوب :

أ- ارسم شكل تخطيطي للخلية الجلفانية المكونة منهما موضعاً كل من الأنود والكاثود واتجاه حركة الإلكترونات في الدائرة الخارجية.

ب- اكتب معادلات التفاعل التي تحدث عند كل من نصفي الخلية والتفاعل الكلي .



عند الأنود:

عند الكاثود:

التفاعل الكلي الحادث في الخلية:

ج- اكتب الرمز الاصطلاحي لهذه الخلية.

ح- احسب جهد الخلية القياسي:

خ- عندما تستمر هذه الخلية في إعطاء تياراً كهربائياً ، ماذا يحدث لكتل الأقطاب وتركيز المحلول؟

..... -


..... -

7- التفاعل التالي يمثل التفاعل الكلي لخليه جلفانية: $2Al_{(s)} + 3Pb^{2+}_{(aq)} \rightarrow 3Pb_{(s)} + 2Al^{3+}_{(aq)}$

فإذا علمت ان جهود الاختزال القياسية هي $[Al^{3+}/Al = -1.67V, Pb^{2+}/Pb = -0.126V]$ وتركيز المحلول

في كل من نصفي الخلية يساوي 1M عند $25^{\circ}C$

والمطلوب:



أ- الرمز الاصطلاحي للخلية:

ب- اكتب التفاعلات الحادثة عند كل من:

الانود:

الكاثود:

ت- ماذا يحدث في نصف خلية الكاثود لكل من القطب وتركيز المحلول؟

..... -

ث- حساب القوة المحركة الكهربائية للخلية E°_{cell}

$E^{\circ}_{cell} =$

8- ثلاث أنصاف خلايا كالتالي: $(Cu^{2+}/Cu), (H^+/H_2(1atm),Pt), (Mg^{2+}/Mg)$ تركيز كل منها 1M عند $25^{\circ}C$

وجهد الاختزال القياسية لها على الترتيب $(+0.34V, 0V, -2.3V)$ والمطلوب:

أ- الرمز الاصطلاحي للخلية الجلفانية المكونة من الأقطاب السابقة ويكون لها أكبر جهد خلية:

.....


ب- التفاعل الكلي للخلية الجلفانية المكونة من الأقطاب السابقة والتي لها أقل جهد خلية:

.....

ت- القطب الذي لا يمكن أن يكون أنوداً عند استخدام الأقطاب السابقة في تكوين خلايا جلفانية.

.....

9- خلية جلفانية مكونة من نصفي خلية تفاعلهما كالتالي:



والمطلوب:

أ- اكتب المعادلات الكيميائية للتفاعلات الحادثة عند كل من الأنود ، الكاثود ، التفاعل الكلي للخلية

تفاعل الأنود	
تفاعل الكاثود	
التفاعل الكلي	

موقع
المنهج الكويتية
almandj.com/kw

ب- احسب جهد الخلية القياسي:

10- احسب جهد الاختزال كما هو موضح في الجدول التالي: $E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = - 0.25 \text{ V}$

جهد الاختزال	قراءه الفولتميتر E_{cell}	التفاعل
$E^0_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}} = \dots\dots\dots \text{V}$	+1.41 V	$2\text{Al} + 3\text{Ni}^{2+} \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{Ni}$
$E^0_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = \dots\dots\dots \text{V}$	+0.49 V	$2\text{Cr} + 3\text{Ni}^{2+} \rightarrow 3\text{Ni} + 2\text{Cr}^{3+}$
$E^0_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = \dots\dots\dots \text{V}$	+1.02 V	$3\text{Ni} + 2\text{Fe}^{3+} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 3\text{Ni}^{2+}$

الوحدة الرابعة: الكيمياء الكهربائية

الفصل الثاني : الخلايا الإلكتروليتية أنصافها وجهودها

الدرس (2-2) الخلايا الإلكتروليتية

السؤال الأول: اكتب الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :

1. خلايا تحتاج إلى طاقة كهربائية وينتج منها تفاعل كيميائي من نوع الأكسدة والاختزال. ()
2. العمليات التي تستخدم فيها الطاقة الكهربائية لأحداث تغير كيميائي. ()
3. خلية الكتروليتية تستخدم لإحداث تغير كيميائي باستخدام طاقة كهربائية. ()
4. الخلية الإلكتروليتية التي تجري فيها عملية التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم. ()



السؤال الثاني اكمل الفراغات في الجمل والمعادلات التالية بما يناسبها علميا :

1. عند تواجد أكثر من نوع عند كاثود خلية تحليل كهربائي فإن النوع الذي يختزل أولا هو الذي يكون له قيمه جهد اختزال.
2. عند تواجد أكثر من نوع عند أنود خلية تحليل كهربائي فإن النوع الذي يتأكسد أولا هو الذي يكون له قيمه جهد اختزال.
3. إحدى خلايا التحليل الكهربائي نتج من عمليات التحليل أنيونات OH^- وتساعد غاز H_2 عند أحد قطبيها فإن ذلك يدل على أن المادة التي تم اختزالها هي
4. إحدى خلايا التحليل الكهربائي نتج من عمليات التحليل كاتيونات الهيدروجين H^+ وتساعد غاز O_2 عند أحد قطبيها فإن ذلك يدل على أن المادة التي تم أكسبتها هي
5. عندما يتأكسد الماء في عمليات التحليل الكهربائي يتصاعد غاز الأكسجين عند الخلية.
6. عندما يختزل الماء في عمليات التحليل الكهربائي يتصاعد غاز الهيدروجين عند الخلية.
7. تحدث عملية في الخلايا الإلكتروليتية عند قطب الكاثود.
8. تحدث عملية في الخلايا الإلكتروليتية عند قطب الأنود.
9. الخلية الإلكتروليتية التي تستخدم في التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم، تسمى خلية
10. عند التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم، ينتج في الخلية عند الكاثود عنصر
11. عند التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم ينتج في الخلية عند الأنود غاز
12. عند التحليل الكهربائي للماء المحمض بحمض الكبريتيك، فإن عدد مولات الحمض
13. عند التحليل الكهربائي للماء المحمض بحمض الكبريتيك، يتصاعد غاز عند الكاثود
كما يتصاعد غاز عند الأنود.
14. أثناء التحليل الكهربائي للماء المحمض بحمض الكبريتيك، عندما يتصاعد (4L) من غاز الهيدروجين عند الكاثود، فإن حجم غاز الأكسجين المتصاعد عند الأنود يساوي L .

15. عند التحليل الكهربائي لمحلول مركز من NaCl ، يتصاعد غاز عند الأنود كما يتصاعد غاز عند الكاثود ويصبح الوسط ذو تأثير عند الكاثود.

السؤال الثالث : ضع علامة ✓ امام العبارة الصحيحة وعلامة × امام العبارة غير الصحيحة :

1. تحدث عملية الاختزال في الخلية الالكتروليزية عند قطب الأنود. ()
2. أثناء التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز ، تحدث عملية الاختزال للماء عند الكاثود. ()
3. عند وضع بضع قطرات من كاشف أزرق البروموثيمول حول كاثود خلية التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز يتغير لونه إلى اللون الأزرق ()
4. عند حدوث التحليل الكهربائي للماء في وجود حمض الكبريتيك يتصاعد غاز O_2 عند الأنود. ()
5. يتكون الصوديوم عند كاثود الخلية الالكتروليزية عند التحلل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم ()
6. عند التحليل الكهربائي للماء المحمض بـ حمض الكبريتيك ، فإن حجم غاز الهيدروجين الناتج ضعف حجم غاز الأكسجين. ()
7. عندما يتأكسد الماء في عمليات التحليل الكهربائي يتصاعد غاز الأكسجين عند الأنود. ()
8. تحدث عملية الأكسدة دائماً عند الأنود سواء كانت الخلية جلفانية أو كتروليكية. ()
9. عند التحليل الكهربائي لمحلول مركز من كلوريد الصوديوم يصبح الوسط حمضي عند الكاثود. ()
10. تحدث عملية الاختزال في الخلية الالكتروليزية عند قطب الأنود. ()

السؤال الرابع : اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي بوضع علامة (✓) في المربع المقابل لها :

1. جميع ما يلي صحيح الخلايا الالكتروليزية، عدا واحد :
 - ☐ يتصل الكاثود بالطرف السالب للمصدر الكهربائي الخارجي.
 - ☐ تسير الالكترونات في الدائرة الخارجية من الأنود إلى الكاثود
 - ☐ تحدث عملية الأكسدة عند قطب الكاثود
 - ☐ تتجه الأنيونات نحو قطب الأنود.
2. إحدى العبارات التالية صحيحة عن الخلايا الفولتية الالكتروليزية :
 - ☐ التفاعل غير تلقائي في الخلية الفولتية وتلقائي في الخلية الإلكتروليتية
 - ☐ سريان الإلكترونات في كليهما ناتج من تفاعل أكسدة واختزال تلقائي
 - ☐ تسير الالكترونات في الدائرة الخارجية من الأنود إلى الكاثود في كليهما
 - ☐ يتفقدان من حيث نوع شحنات الانود والكاثود

3. أثناء التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم باستخدام خلية داون يحدث أحد ما يلي :

- ☐ يتصاعد غاز الكلور عند القطب الموجب للخلية. ☐ يترسب الصوديوم عند القطب الموجب للخلية.
- ☐ تتأكسد كاتيونات الصوديوم عند الأنود. ☐ تختزل أنيونات الكلوريد عند الكاثود.

4. عند التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم باستخدام خلية داون فإن:

- ☐ يتكون الصوديوم عند الأنود.
- ☐ يختزل كاتيون الصوديوم عند القطب السالب.
- ☐ يتصاعد غاز الكلور عند الكاثود
- ☐ التفاعل الحادث عند الأنود هو $2Na^+ + 2e \rightarrow 2Na$

5. جميع ما يلي يحدث عند التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم عدا واحد:

- ☐ يتكون الصوديوم عند الكاثود ☐ يتصاعد غاز الكلور عن الأنود
- ☐ تستخدم خلية داون الكهربائية ☐ التفاعل الكلي هو $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$

6. جميع ما يلي يحدث عند التحليل الكهربائي للماء المحمض بحمض الكبريتيك المخفف ماعدا واحداً:

- ☐ يتأكسد الماء عند الأنود ويتصاعد غاز الأكسجين ☐ يختزل الماء عند الكاثود
- ☐ تختزل كاتيونات الهيدروجين من الوسط الحمضي ☐ يظل عدد مولات حمض الكبريتيك ثابتاً

7. عند التحليل الكهربائي للماء المحمض بحمض الكبريتيك فإن أحد ما يلي صحيح:

- ☐ يتصاعد غاز الأكسجين عند الكاثود ☐ يتصاعد غاز الهيدروجين عن الأنود
- ☐ عدد مولات حمض الكبريتيك يظل ثابتاً ☐ فإن حجم غاز H_2 الناتج نصف حجم غاز O_2 .

8. أثناء التحليل الكهربائي لمحلول مركز من كلوريد الصوديوم يحدث أحد ما يلي :

- ☐ الوسط عند الكاثود يصبح حمضي
- ☐ غاز الكلور يتصاعد عند الكاثود
- ☐ غاز الهيدروجين يتصاعد عند الأنود
- ☐ لون كاشف البرموثيمول يتحول الى اللون الأزرق عند الكاثود

9. جميع ما يلي يحدث عند التحليل الكهربائي لمحلول مركز من كلوريد الصوديوم ، عدا واحد :

- ☐ يتصاعد غاز الكلور عند الأنود. ☐ يتصاعد غاز الهيدروجين عند القطب السالب للخلية
- ☐ يترسب الصوديوم عند الكاثود. ☐ يصبح الوسط عند الكاثود قاعدياً.

10. جميع المواد التالية من نواتج التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز باستخدام أقطاب من الجرافيت عدا واحدة :

- ☐ الصوديوم ☐ الكلور
- ☐ الهيدروجين ☐ هيدروكسيد الصوديوم

السؤال الخامس : علل لما يلي تعليلاً علمياً صحيحاً:

1. عند التحليل الكهربائي للماء المحمض بحمض الكبريتيك يتصاعد غاز الأكسجين عند الأنود .

2. لا يتغير عدد مولات حمض الكبريتيك المستخدم في عملية التحليل الكهربائي للماء.

3. يعتبر حمض الكبريتيك مادة محفزة عند إضافة قطرات منه عند التحليل الكهربائي للماء المقطر

4. عند التحليل الكهربائي للماء المحمض بحمض الكبريتيك يكون حجم غاز الهيدروجين الناتج ضعف حجم غاز الأكسجين.

5. يصبح المحلول قاعدياً عند الكاثود خلال عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم

(جهد اختزال الماء = $0.41V$ - جهد اختزال كاتيونات الصوديوم = $-2.7V$)

6. نحصل عملياً على غاز الكلور عند الأنود أثناء التحليل الكهربائي لمحلول مركز من كلوريد الصوديوم

السؤال السادس : قارن بين كلاً مما يلي:

(1) وجه المقارنة		الخلية الجلفانية	الخلية الإلكتروليتية
الاتجاه	القطب الذي تحدث عنده عملية الأكسدة		
	القطب الذي تحدث عنده عملية الاختزال		
	اتجاه سريان الإلكترونات		
الاختلاف	تفاعل الأكسدة والاختزال (تلقائي - غير تلقائي)		
	إشارة قطب الكاثود		
	إشارة قطب الأنود		
	الإلكتروليت المستخدم (محلول-مصهور-كلاهما)		
أحد الاستخدامات			

السؤال السابع أجب عما يلي

1 - خلية الكتروليتية اقطابها من الجرافيت تحتوي على مصهور كلوريد الصوديوم ، والمطلوب :

	التفاعل عند الأنود
	التفاعل عند الكاثود
	التفاعل الكلي

2 - خلية الكتروليتية تحتوي على ماء مقطر مضاف إليه قطرات من حمض الكبريتيك بتركيزات منخفضة أمر فيه تيار كهربائي وكانت الاقطاب من الجرافيت والمطلوب:

	التفاعل عند الأنود
	التفاعل عند الكاثود
	التفاعل الكلي

3 - خليتا تحليل كهربائي، إحداهما تحتوي على مصهور كلوريد الصوديوم NaCl والأخرى على ماء H_2O حمض بحمض كبريتيك مخفف، والمطلوب اكمال الجدول التالي:

وجه المقارنة	مصهور كلوريد الصوديوم	الماء المحمض بحمض الكبريتيك
النوع الذي حدث له عملية أكسدة		
النوع الذي حدث له عملية اختزال		

4 - خلية الكتروليتية تحتوي على محلول كلوريد الصوديوم (NaCl) المركز واقطابها من الجرافيت ، أمر فيها تيار كهربائي والمطلوب كتابة التفاعلات التي تحدث في نهاية عملية التحليل الكهربائي حسب المطلوب بالجدول التالي :

	التفاعل عند الأنود
	التفاعل عند الكاثود
	التفاعل الكلي
	تأثير المحلول الناتج على لون كاشف أزرق بروموثيمول

السؤال الثامن: ماذا يحدث في الحالات التالية مع تفسير السبب

1. عند أنود خلية تحليل كهربائي تحتوي على ماء مضاف إليه قطرات من حمض الكبريتيك المخفف.

الحدث :

السبب :

2. عند كاثود خلية تحليل كهربائي تحتوي على ماء مضاف إليه قطرات من حمض الكبريتيك المخفف.

الحدث :

السبب :

3. عند أنود خلية التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم (NaCl) المركز واقطابها من الجرافيت.

الحدث :

السبب :


4. عند الكاثود في نهاية عمل خلية التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز (NaCl) واقطابها من الجرافيت.

الحدث :

السبب :


السؤال التاسع: استخدم المفاهيم الموضحة في الشكل لرسم خريطة تنظيم الأفكار الرئيسية الواردة فيها

الخلايا الكهروكيميائية - خلايا الكتروليتية - خلايا جلفانية - الأنود سالب الشحنة - الأنود موجب الشحنة - الكاثود موجب الشحنة - الكاثود سالب الشحنة - تفاعلات الأكسدة والاختزال تلقائية - تفاعلات الأكسدة والاختزال غير تلقائية



الوحدة الخامسة

المركبات الهيدروكربونية



الوحدة الخامسة : المركبات الهيدروكربونية

الفصل الأول: الهيدروكربونات الإليفاتية

الدرس 1-1 (المركبات العضوية)

السؤال الأول : اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :-

1. المركبات التي تحتوي على عنصر الكربون ماعدا بعض الاستثناءات مثل غازي اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون. ()
2. علم الكيمياء الذي يهتم بدراسة المركبات التي تحتوي على عنصر الكربون. ()
3. مركبات عضوية تحتوي على الكربون والهيدروجين فقط. ()
4. مركبات تحتوي على الكربون و الهيدروجين و عناصر أخرى مثل الهالوجينات ، الأكسجين ، النيتروجين. ()
5. مركبات جميع الروابط بين ذرات الكربون فيها روابط تساهمية أحادية . ()
6. مركبات تحتوي على الأقل على رابطة تساهمية ثنائية واحدة أو رابطة تساهمية ثلاثية واحدة بين ذرتي كربون . ()

السؤال الثاني: اكمل الفراغات التالية بما يناسبها علميا

1. يعتبر و المصدرين الرئيسيين للمواد العضوية .
2. تم تصنيف المركبات العضوية اعتمادا على البناء الجزيئي لها وعلى نوع فيها.
3. المركبات العضوية هي المركبات التي تحتوي على عنصر..... ، ماعدا بعض المركبات غير العضوية مثل غاز اول أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد الكربون .
4. المركبات المشبعة هي مركبات يكون جميع الروابط بين ذرات الكربون فيها روابط تساهمية


السؤال الثالث: ضع علامة (√) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة غير الصحيحة في كل

مما يلي

1. اكاسيد الكربون واملاح الكربونات تعتبر مركبات غير عضوية رغم احتوائها على الكربون ()
2. المركبات العضوية المشبعة تكون فيها جميع الروابط تساهمية أحادية بين ذرات الكربون. ()
3. المركبات العضوية غير المشبعة تحتوي على روابط تساهمية ثنائية أو ثلاثية بين ذرات الكربون. ()

السؤال الرابع : اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي بوضع علامة (✓) في المربع المقابل لها :

1. أحد المركبات التالية يعتبر من الهيدروكربونات:



السؤال الخامس : علل لما يلي تعليلا علميا صحيحاً



1. صنف المركبات العضوية إلى فئات تجمعها قواسم مشتركة.





2. يعتبر مركب الإيثاين $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ من المركبات العضوية غير المشبعة.

السؤال السادس : أكمل خريطة المفاهيم التالية

1) أكمل خريطة المفاهيم التالية مستخدماً ما يلي :



2) أكمل خريطة المفاهيم التالية مستخدماً:



الوحدة الخامسة : المركبات الهيدروكربونية

الفصل الأول: الهيدروكربونات الأليفاتية

درس (2-1) الهيدروكربونات المشبعة

السؤال الأول : اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :-

1. مركبات عضوية يكون فيها جميع الروابط بين ذرات الكربون تساهمية أحادية . ()
2. أبسط أنواع الهيدروكربونات وتحتوي على روابط تساهمية أحادية فقط بين ذرات الكربون وصيغتها العامة C_nH_{2n+2} . ()
3. مركب يعتبر أبسط المركبات العضوية وأبسط الكان ويعتبر من أهم مصادره الغاز الطبيعي والمواد البترولية. ()
4. مجموعة قادرة على تكوين روابط تساهمية أحادية فقط وصيغتها العامة C_nH_{2n+1} . ()
5. مجموعة من المركبات حيث إن كل مركب مختلف عن الذي يسبقه بزيادة مجموعة ميثيلين " CH_2 " واحدة فقط. ()
6. الذرة أو المجموعة التي يمكن أن تحل محل ذرة الهيدروجين في جزئ الهيدروكربون الأساسي. ()
7. الألكانات تتكون عند إضافة مجموعة الألكيل البديلة إلى الألكان مستقيم السلسلة. ()

السؤال الثاني: اكمل الفراغات التالية بما يناسبها علميا

1. المركبات المشبعة هي مركبات يكون جميع الروابط بين ذرات الكربون فيها روابط تساهمية
2. الصيغة الجزيئية العامة للألكانات هي حيث يمثل حرف n عدد ذرات الكربون في الجزيء الواحد .
3. الصيغة العامة لمجموعة الألكيل القادرة على تكوين رابطة تساهمية أحادية واحدة هي
4. درجة غليان الألكانات مستقيمة السلسلة ترتفع كلما عدد ذرات الكربون فيها .
5. إذا كان عدد ذرات الهيدروجين في جزيء أحد الألكانات (8) فإن عدد ذرات الكربون في هذا الجزيء يساوي
6. عدد الروابط التساهمية الأحادية في جزيء الإيثان C_2H_6 يساوي
7. عدد الروابط التساهمية الأحادية في جزئ البروبان يساوي
8. عدد الروابط التساهمية الأحادية بين ذرات الكربون في جزئ البروبان يساوي
9. مجموعة الألكيل التي تحتوي على ذرتين كربون تسمى
10. تتألف مجموعة الألكيل من الألكان المقابل بعد نزع ذرة منه .

السؤال الثالث:

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي

1. تزداد درجه غليان الألكانات مستقيمه السلسلة بزيادة عدد ذرات الكربون. ()
2. يعتبر المركب ذو الصيغة الجزيئية C_6H_{10} من المركبات الهيدروكربونية المشبعة. ()
3. تعتبر الألكانات مستقيمه السلسلة مثالا على المتتالية المتجانسة حيث ان كل مركب يختلف عن الذي يسبقه بزيادة مجموعه ميثيلين واحده $-CH_2-$ ()

السؤال الرابع : اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي بوضع علامة (√) في المربع المقابل لها :



1. أحد الصيغ التالية تعبر عن ترتيب وارتباط ذرات العناصر الداخلة في تركيب المركب الكيميائي:

- | | |
|---|--|
| ☐ الجزيئية | ☐ الجزيئية العامة |
| ☐ التركيبية والتركيبية المكثفة | ☐ الأولية |

2. أحد المركبات التالية يعتبر من الهيدروكربونات المشبعة:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ C_6H_6 | ☐ C_6H_{14} |
| ☐ C_3H_6 | ☐ C_6H_{10} |

3. أحد المركبات التالية ينتمي للألكانات:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ C_6H_6 | ☐ C_6H_{14} |
| ☐ C_3H_6 | ☐ C_6H_{10} |

4. إذا كان عدد ذرات الهيدروجين في جزيء أحد الألكانات يساوي (12) فإن عدد ذرات الكربون في هذا الجزيء تساوي أحد ما يلي:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ☐ 4 | ☐ 3 |
| ☐ 6 | ☐ 5 |

5. إحدى ما يلي هي الصيغة الجزيئية العامة للألكانات:

- | | |
|--|--|
| ☐ C_nH_{2n+2} | ☐ C_nH_{2n-2} |
| ☐ C_2H_{n+2} | ☐ C_nH_{2n} |

6. إحدى الصيغ الكيميائية التالية لمركب هيدروكربوني يحتوي على ثلاث ذرات كربون وينتمي إلى عائله الألكانات:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ☐ C_3H_4 | ☐ C_3H_6 |
| ☐ CH_3CH_2COOH | ☐ C_3H_8 |

7. أحد المركبات التالية ينتمي إلى عائلة الألكانات:

- C_3H_4 ☐ C_2H_4 ☐
 C_6H_{14} ☐ C_6H_6 ☐

8. جميع المجموعات التالية تعتبر مثالا على السلاسل متشابه التركيب حيث كل مركب فيها يزيد عن الذي يسبقه بمجموعه ميثيلين عدا واحدة :

- ☐ ميثان , ايثان , بروبان ☐ بروبان , بنتان , هكسان
☐ ايثين , بروبين , بيوتين ☐ بيوتان , بنتان , هكسان

9. أحد ما يلي هو اسم مجموعة الالكيل ذات الصيغة التالية $(CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 -)$:



- ☐ ميثيل ☐ ايثيل
☐ بروبيل ☐ بنتيل

10. تعتبر الألكانات مستقيمة السلسلة مثالا على السلاسل المتشابهة التركيب حيث إن كل مركب يختلف عن الذي يسبقه بزيادة أحد المجموعات التالية :

- $CH_3 -$ ☐ $-CH_2 -$ ☐
 $C_2H_5 -$ ☐ $C_3H_7 -$ ☐

11. أحد ما يلي هو اسم مجموعة الالكيل التالية $C_3H_7 -$:

- ☐ ايثيل ☐ بروبيل
☐ بيوتيل ☐ بروبان

12. الصيغة التركيبية الكاملة للألكان مستقيم السلسلة الذي يحتوي على أربع ذرات كربون، هي أحد ما يلي :

- $\begin{array}{c} H & H & H & H \\ | & | & | & | \\ H - C & - C & - C & - C - H \\ | & | & | & | \\ H & H & H & H \end{array}$ ☐ $CH_3CH_2CH_2CH_3$ ☐
 C_4H_{10} ☐ $CH_3(CH_2)_2CH_3$ ☐

13. أحد ما يلي هو اسم المركب الذي له الصيغة الكيميائية: $CH_3 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH} - CH_2 - CH_2 - CH_3$ حسب نظام الأيوباك :

- ☐ 4 - ميثيل بيوتان ☐ 4 - ميثيل بنتان
☐ 2 - ميثيل بيوتان ☐ 2 - ميثيل بنتان

14. عدد الروابط الأحادية في المركب C_2H_6 هي أحد ما يلي:

- ☐ 6 ☐ 7
☐ 8 ☐ 10

15. المركب الذي له اعلي درجة غليان من بين المركبات التالية، هو أحد ما يلي:

- ☐ البيوتان ☐ البروبان
☐ الميثان ☐ الهكسان

السؤال الخامس : علل لما يلي تعليلا علميا صحيحاً

1. وفرة المركبات العضوية .

2. تعتبر الألكانات مستقيمة السلسلة مثلاً على السلاسل المتشابهة التركيب .

3. الصيغة العامة للألكانات C_nH_{2n+2} تدل على الهيدروكربونات في السلاسل المتشابهة التركيب بشكل صحيح .

4. تميل الهيدروكربونات ذات الكتل المولية المنخفضة إلى أن تكون غازات أو سوائل ذات درجة غليان منخفضة .

5. درجات غليان الألكانات مستقيمة السلسلة منخفضة.

6. درجة غليان الاوكتان أكبر من درجة غليان البنتان ذي السلسلة المستقيمة لكل منهما .

7. لا تذوب الألكانات في الماء .

8. الصيغة التالية $CH_3CH_2CH_2CH_3$ تُعرف بالصيغة التركيبية المكثفة للبيوتان .

9. يُعد 3 - ايثيل هكسان من الألكانات متفرعة السلسلة.

10. نضطر احيانا إلى كتابة الصيغة التركيبية للمركب العضوي بدلا من كتابة الصيغة الجزيئية له .

السؤال السادس : قارن بين كل من يلي

$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \end{array}$	وجه المقارنة
		نوع السلسلة الرئيسية (مستقيمة – متفرعة)
		عدد ذرات الكربون في السلسلة الأطول

موقع
المنهج الكويتي
almanahj.com/kw

السؤال السابع :

أكمل الجدول التالي مستعينا بدرجات الغليان الموضحة للألكانات الإليفاتية التالية

($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ / $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ / CH_3CH_3 / $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$)

درجة الغليان (°C)	الصيغة التركيبية	المركب
-88.5		A
-42.0		B
-0.5		C
36.0		D

السؤال الثامن : ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع تفسير السبب

(1) عند إضافة الماء إلى أحد الألكانات البسيطة من حيث الذوبان.

الحدث:

التفسير:

(2) للألكانات البسيطة من حيث الحالة الفيزيائية.

الحدث:

التفسير:

(3) للألكانات البسيطة من حيث درجات الغليان.

الحدث:

التفسير:

الوحدة الخامسة : المركبات الهيدروكربونية

الفصل الأول: الهيدروكربونات الأليفاتية

الدرس 1-3 (الهيدروكربونات غير المشبعة)




السؤال الأول : اكتب بين القوسين الاسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :-

1. المركبات العضوية التي تحتوي على روابط كربون - كربون تساهمية ثنائية أو ثلاثية. ()
2. الهيدروكربونات التي تحتوي على روابط كربون - كربون تساهمية ثنائية وصيغتها العامة C_nH_{2n} ()
3. الهيدروكربونات التي تحتوي على روابط كربون - كربون تساهمية ثلاثية وصيغتها العامة C_nH_{2n-2} . ()
4. تفاعلات تشارك فيها الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة على حد سواء وتتم بوجود كمية وافرة من الأكسجين وينتج منها ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. ()
5. تفاعلات تمتاز بها الهيدروكربونات المشبعة والحلقية، وتستبدل فيها ذرة هيدروجين أو أكثر بذرات أخرى مع الحفاظ على سلسلة المركب الكربونية. ()
6. تفاعلات تمتاز بها الهيدروكربونات غير المشبعة و تتم عادة بوجود مادة محفزة، وينتج منها تكوين مركبات مشبعة. ()
7. عند إضافة حمض HX علي ألكين يضاف الهيدروجين علي ذرة الكربون غير المشبعة المرتبط بالعدد الأكبر من ذرات الهيدروجين والهاليد X إلى ذرة الكربون غير المشبعة المرتبط بالعدد الأقل من ذرات الهيدروجين . ()

السؤال الثاني: اكمل الفراغات التالية بما يناسبها علميا

1. الصيغة الجزيئية العامة للألكينات هي حيث يمثل حرف n عدد ذرات الكربون في الجزيء الواحد .
2. الصيغة الجزيئية العامة للألكينات هي حيث يمثل حرف n عدد ذرات الكربون في الجزيء الواحد .
3. مركب ينتمي إلى الألكينات وبه خمس ذرات كربون تكون صيغته الجزيئية هي
4. مركب ينتمي إلى الألكينات وبه (10) هيدروجين فإن عدد ذرات الكربون فيه يساوي
5. الألكينات هي الهيدروكربونات التي تحتوي على روابط كربون - كربون تساهمية.....
6. الهيدروكربونات غير المشبعة هي المركبات العضوية التي تحتوي على روابط كربون - كربون تساهمية أو روابط كربون - كربون تساهمية
7. يعتبر الإيثين أبسط أنواع التي تحتوي روابط كربون - كربون تساهمية ثنائية .
8. الألكينات هي الهيدروكربونات التي تحتوي على روابط كربون - كربون تساهمية

9. الألكاين الذي يستخدم كوقود في عمليات لحام الفولاذ هو الذي صيغته البنائية هي
10. يعتبر الإيثاين أبسط أنواع ----- التي تحتوي روابط كربون - كربون تساهمية ثلاثية .
11. قوي التجاذب التي تحدث بين جزيئات الألكانات أو الألكينات أو الألكاينات هي قوىالضعيفة .
12. مركب الإيثاين لا تدور ذراته حول الرابطة الثلاثية فيه لأن الرابطة
13. جميع الهيدروكربونات تقريبا كثافة من الماء
14. الهيدروكربونات الغازية..... كثافة من الهواء باستثناء الميثان و الإيثاين .
15. ترتفع درجات حرارة غليان الهيدروكربونات مع عدد ذرات الكربون بشكل عام .
16. تشكل الهيدروكربونات مع الهواء مخاليط..... الاشتعال و هيللامتزاج مع الماء
17. تفاعلات الاستبدال هي تفاعلات تمتاز بها الهيدروكربونات المشبعة والحلقية، وتستبدل فيها ذرة
أو أكثر بذرات أخرى مع الحفاظ على سلسلة المركب الكربونية .
18. تفاعلات الإضافة هي تفاعلات تمتاز بها الهيدروكربوناتوتتم عادة بوجود مادة محفزة وينتج منها تكوين مركبات مشبعة غالبا .
19. يتميز المركب الذي له الصيغة C_2H_2 بتفاعلات
20. الصيغة التركيبية المكثفة للبروباين هي
21. الصيغة التركيبية المكثفة للمركب 1 هكسين هي
22. الصيغة التركيبية المكثفة لمركب 2- بنتاين هي
23. درجة غليان المركب $C_{12}H_{24}$ من درجة غليان المركب C_8H_{16}
24. درجة غليان 1 - هكساين من درجة غليان 1 - بيوتاين .
25. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow \text{طاقة} + 2H_2O + \text{-----}$
26. $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + \text{طاقة} + \text{-----}$
27. $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{u.v} \text{-----} + HCl$
28. $CH_4 + 2Cl_2 \xrightarrow{u.v} \text{-----} + 2HCl$
29. $CH_4 + 3Cl_2 \xrightarrow{u.v} \text{-----} + 3HCl$
30. $CH_4 + 4Cl_2 \xrightarrow{u.v} \text{-----} + 4HCl$
31. $C_nH_{2n} + H_2 \xrightarrow{Ni / 200^\circ C} \text{-----}$
32. $C_nH_{2n-2} + H_2 \xrightarrow{Ni / 200^\circ C} \text{-----}$
33. $C_nH_{2n-2} + 2H_2 \xrightarrow{Ni / 200^\circ C} \text{-----}$



السؤال الثالث: ضع علامة (√) امام العبارة الصحيحة وعلامة (×) امام العبارة الخطأ في كل مما يلي

1. يعتبر المركب ذو الصيغة الجزيئية C_6H_{14} من المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة ()
2. الألكينات هي المركبات الهيدروكربونية التي تحتوي على روابط كربون - كربون تساهمية ثنائية ()
3. الصيغة العامة للألكينات هي C_nH_{2n} . ()
4. الصيغة العامة للألكينات هي $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. ()
5. الهيدروكربونات قابلة للامتزاج مع الماء. ()
6. عند الاحتراق التام لمول واحد من غاز الايثان في كمية وفيرة من غاز الاكسجين ينتج مولان من غاز ثاني أكسيد الكربون ومولان من الماء وكمية من الطاقة. ()
7. تفاعلات الإحتراق تشارك فيها الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة على حدا سواء. ()
8. تفاعلات الهيدروكربونات بالاستبدال تشارك فيها الهيدروكربونات المشبعة والحلقية فقط. ()
9. تفاعلات الإضافة تمتاز بها الهيدروكربونات المشبعة. ()
10. عند إضافة كمية وفيرة من الهيدروجين الي الألكاين بوجود البالاديوم غير المنشط كمادة محفزة يتكون الألكان. ()
11. عند إضافة كلوريد الهيدروجين الي البروبين يتكون 2-كلوروبروبان. ()

السؤال الرابع : اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي بوضع علامة (√) في المربع المقابل لها :

1. احدى الصيغ الجزيئية التالية لمركب هيدروكربوني يحتوي على ثلاث ذرات كربون وينتمي إلى عائلة الألكينات :

C_3H_8 ☐ C_3H_4 ☐

C_3H_6 ☐ C_3H_7 ☐

2. المركب الذي له الصيغة الكيميائية C_5H_{10} ، ينتمي إلى أحد العائلات التالية :

الألكانات ☐ الألكينات ☐

الألكينات ☐ الهيدروكربونات العطرية ☐

3. أحد المركبات التالية ينتمي إلى عائلة الألكينات:

C_2H_4 ☐ CH_4 ☐

C_4H_{10} ☐ C_6H_6 ☐

4. أحد المركبات التالية ينتمي إلى عائلة الألكينات:

- | | | | |
|-------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| C_5H_{10} | ☐ | CH_4 | ☐ |
| C_4H_6 | ☐ | C_6H_6 | ☐ |

5. أحد المركبات التالية من المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة:

- | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| C_3H_6 | ☐ | C_6H_{14} | ☐ |
| C_4H_{10} | ☐ | C_5H_{12} | ☐ |

6. المركب التالي C_4H_8 تنطبق عليه إحدى الصيغ العامة التالية :

- | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| C_nH_{2n+2} | ☐ | C_nH_{2n-2} | ☐ |
| C_2H_{n+2} | ☐ | C_nH_{2n} | ☐ |

7. إحدى الصيغ الكيميائية التالية لمركب هيدروكربوني يحتوي على أربع ذرات كربون وينتمي إلى عائلة الألكينات :

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| C_4H_{10} | ☐ | C_4H_8 | ☐ |
| $CH_3(CH_2)_2CH_3$ | ☐ | C_4H_6 | ☐ |

8. أحد المركبات التالية ينتمي إلى فئة الألكينات :

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| $CH_2 = CH-CH_3$ | ☐ | CH_3-CH_3 | ☐ |
| CH_3-CCl_3 | ☐ | $CH_3-CH_2-CH_2Cl$ | ☐ |

9. الصيغة التركيبية المكثفة التي تمثل (2- بنتين) هي أحد ما يلي :

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| $CH_3 - C \equiv C-CH_2-CH_3$ | ☐ | $CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3$ | ☐ |
| $CH \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3$ | ☐ | $CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - CH_3$ | ☐ |

10. مركب هيدروكربوني مستقيم السلسلة يحتوي على ثلاث ذرات كربون ، عند احتراق مول منه احتراق تام ينتج

ثلاث مولات من (CO_2) وثلاث مولات من (H_2O) فيكون هذا المركب من إحدى العائلات التالية :

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| الهيدروكربونات المشبعة | ☐ | الألكينات | ☐ |
| الألكينات | ☐ | الألكانات | ☐ |

11. مركب هيدروكربوني يحتوي على ذرتين كربون ، عند احتراق مول منه احتراق تام ينتج مولين من (CO_2)

وثلاث مولات من (H_2O) فيكون هذا المركب من إحدى العائلات التالية :

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| المركبات الأروماتية | ☐ | الألكينات | ☐ |
| الألكينات | ☐ | الألكانات | ☐ |

12. أحد المركبات التالية يتفاعل مع الكلور بالاستبدال:

- | | | | |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| C_2H_4 | ☐ | CH_4 | ☐ |
| C_2H_2 | ☐ | C_3H_4 | ☐ |

13. عند تفاعل غاز الميثان مع مولين من غاز الكلور ينتج أحد ما يلي :

- | | | | |
|----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| $CHCl_3$ | ☐ | CH_3Cl | ☐ |
| CCl_4 | ☐ | CH_2Cl_2 | ☐ |

14. عند تفاعل غاز الميثان مع ثلاث مولات من غاز الكلور:

- | | | | |
|----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| $CHCl_3$ | ☐ | CH_3Cl | ☐ |
| CCl_4 | ☐ | CH_2Cl_2 | ☐ |



15. الصيغة الجزيئية للهيدروكربون مستقيم السلسلة الذي يمكن أن يتفاعل بالإضافة على مرحلتين هي أحد ما يلي :

- | | | | |
|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| C_4H_8 | ☐ | C_4H_{10} | ☐ |
| C_3H_8 | ☐ | C_4H_6 | ☐ |

16. أحد المركبات التالية يتفاعل بالاستبدال فقط :

- | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| C_4H_{10} | ☐ | C_6H_{12} | ☐ |
| C_4H_6 | ☐ | C_4H_8 | ☐ |

17. عند إضافة الهيدروجين إلى الألكينات في وجود النيكل المسخن عند $200^\circ C$ ينتج أحد المركبات التالية :

- | | | | |
|------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| الألكينات | ☐ | الألكانات | ☐ |
| المركبات العطرية | ☐ | الألكاينات | ☐ |

18. عند إضافة الهيدروجين إلى غاز الإيثين في وجود النيكل المسخن عند $200^\circ C$ ينتج أحد المركبات التالية :

- | | | | |
|----------|--------------------------|---------|--------------------------|
| الإيثان | ☐ | الإيثان | ☐ |
| البروبان | ☐ | الميثان | ☐ |

19. الألكان الذي لا يمكن الحصول عليه من خلال إضافة الهيدروجين إلى الألكين المقابل هو أحد ما يلي :

- | | | | |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| الايثان | ☐ | الميثان | ☐ |
| البيوتان | ☐ | البروبان | ☐ |

20. عند تفاعل الهيدروجين مع البروبين في وجود النيكل المسخن عند $200^\circ C$ ينتج أحد ما يلي :

- | | | | |
|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| C_3H_8 | ☐ | C_3H_4 | ☐ |
| C_3H_6 | ☐ | C_2H_4 | ☐ |

21. المركب الذي له الصيغة الكيميائية C_3H_8 يتفاعل بوساطة أحد أنواع التفاعلات الكيميائية التالية:

- ☐ الاستبدال والاحتراق ☐ الاستبدال والإضافة
☐ الإضافة فقط ☐ الاحتراق فقط

22. يرجع نشاط الألكينات إلى وجود أحد ما يلي :

- ☐ رابطة تساهمية أحادية ☐ رابطة تساهمية ثنائية
☐ رابطة تساهمية ثلاثية ☐ شق الفينيل

23. عند مقارنه الألكينات بالألكانات فان العبارة الصحيحة هي أحد ما يلي:

- ☐ الألكينات هيدروكربونات اما الألكانات مشتقات هيدروكربونية
☐ لا يمكن تحويل الألكينات إلى الألكانات
☐ الألكينات مشبعة اما الألكانات غير مشبعة
☐ نسبة الكربون إلى الهيدروجين في الألكينات اكبر منها في الألكانات



السؤال الخامس : علل لما يلي تعليلا علميا صحيحاً

1. تسمية المركبات العضوية التي تحتوي على روابط كربون - كربون تساهمية ثنائية او روابط كربون - كربون ثلاثية بالهيدروكربونات غير المشبعة

2. مركب الإيثان لا تدور ذراته حول الرابطة الثلاثية ؟

3. لا يحدث وجود الرابطة التساهمية الثنائية والرابطة التساهمية الثلاثية في الهيدروكربون تغيرا جذريا في خواصه الفيزيائية كدرجة الغليان

4. لا تدور ذرات الإيثين حول الرابطة المزدوجة؟

5. المركب (1 - بيوتين) يمكن أن يتفاعل بالإضافة

6. يعتبر المركب العضوي الذي له الصيغة C_3H_4 من الهيدروكربونات غير المشبعة

7. الألكينات انشط من الألكانات

8. الألكينات تتفاعل بالإضافة بينما الألكانات تتفاعل بالاستبدال

السؤال السادس : وضح بالمعادلات الكيميائية الرمزية فقط ماذا يحدث في الحالات التالية :

(1) احتراق غاز الميثان في كمية كافية من الأكسجين



(2) الاحتراق الكامل للإيثان في كمية كافية من الأكسجين

(3) الاحتراق الكامل للإيثان في كمية وفيرة من الأكسجين

(4) الاحتراق الكامل للإيثان في كمية وفيرة من الأكسجين

(5) احتراق غاز البروبان احتراق تام في كمية وفيرة من الأكسجين

(6) تفاعل مول من الميثان مع مول واحد من غاز الكلور

(7) تفاعل مول الميثان مع مولين من غاز الكلور

(8) تفاعل مول من الميثان مع 3 مول من غاز الكلور

(9) تفاعل مول من الميثان مع 4 مول من غاز الكلور

(10) تفاعل غاز الإيثين مع الهيدروجين عند 200°C في وجود النيكل كماده محفز

(11) تفاعل 1 - بيوتين مع الهيدروجين عند درجة حرارة 200°C في وجود النيكل كماده محفز

(12) اضافته مول من الهيدروجين إلى الإيثانين في وجود البلاديوم

(13) اضافته 2 مول من الهيدروجين إلى الإيثانين عند درجة حرارة 200°C في وجود النيكل كماده محفزه

(14) اضافته مول من الهيدروجين إلى البروبانين عند درجة حرارة 200°C في وجود النيكل كماده محفزه

(15) اضافته مولين من الهيدروجين إلى 2 - بيوتانين عند درجة حرارة 200°C في وجود النيكل كماده محفزه

(16) الحصول على الإيثان من الإيثين

(17) الحصول على رابع كلوريد الكربون (CCl_4) من الميثان

(18) الحصول على الإيثين من الإيثانين

(19) الحصول على الإيثان من الإيثانين

(20) اضافته مول من الكلور إلى الإيثين

(21) اضافته مول من الكلور إلى الإيثانين في وجود خامس كلوريد الفوسفور

(22) اضافته مولين من الكلور إلى الإيثانين في وجود خامس كلوريد الفوسفور

(23) اضافته مول من كلوريد الهيدروجين إلى الإيثين

(24) اضافته مول من كلوريد الهيدروجين إلى الإيثانين.


(25) اضافة مولين من كلوريد الهيدروجين إلى الإيثانين.

(26) اضافة مول من كلوريد الهيدروجين إلى البروبين.

السؤال السابع : أكمل خرائط المفاهيم التالية


(1) أكمل خريطة المفاهيم التالية مستخدما مايلي :

(بنتين - مشبعة - بنزين - بنتان - غير مشبعة - بنتاين)




(2) أكمل خريطة المفاهيم التالية مستعينا ببعض المفاهيم الموضحة

(C_nH_{2n-2} - C_nH_{2n} - C_5H_8 - C_6H_{14} - C_nH_{2n+2} - C_4H_8)




(3) أكمل خريطة المفاهيم التالية مستعينا بالمفاهيم الموضحة

(الكينات - C_nH_{2n+2} - الكينات - إيثان - C_nH_{2n} - C_nH_{2n-2} - إيثين - الكانات - إيثاين)



(4) أكمل خريطة المفاهيم التالية مستخدما :

(بيوتين - مشبعة - بيوتانين - بيوتان - غير مشبعة - هكسين)



السؤال الثامن: ماذا تتوقع أن يحدث في الحالات التالية مع تفسير السبب مستعينا بالمعادلات الرمزية كلما أمكن ؟

1- عند تفاعل الإيثين مع الهيدروجين عند درجة حرارة $200^{\circ}C$ في وجود النيكل كمادة محفزة.

الحدث:

التفسير:

2- عند تفاعل مولين من الهيدروجين مع الإيثاين بوجود النيكل الساخن عند $200^{\circ}C$ كمادة محفزة.

الحدث:

التفسير:

3- للهيدروكربونات غير المشبعة عند إضافة كمية كبيرة من غاز الهيدروجين (H_2) والتسخين بوجود مادة محفزة.

الحدث:

التفسير:

السؤال التاسع : اجب عن الأسئلة التالية:

(1) مركبان من المركبات الهيدروكربونية مستقيمه السلسلة لهما الصيغة الجزيئية C_4H_8 ، والمطلوب:

(أ) كتابة الصيغة التركيبية المكثفة لكل منهما

..... ،

(ب) اكتب المعادلات التي تدل على تفاعل كل منهما مع الهيدروجين

.....
.....

(2) مركبان من المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة مستقيمه السلسلة تحتوي على (10) ذرات هيدروجين وينتميان إلى الألكينات والمطلوب:

1. اكتب الصيغة الجزيئية للمركبين

2. اكتب الصيغة التركيبية المكثفة للمركبين

..... ،

3. اكتب المعادلة التي تدل على تفاعل كل منهما مع كميته كافيه من الهيدروجين في وجود عامل حفاز

.....
.....

(3) مركب هيدروكربوني غير مشبع ذو سلسلة مستقيمة عند احتراق مول واحد منه احتراقا تاما نحصل على 3 مول من ثاني أكسيد الكربون و (2) مول ماء والمطلوب:

1 الصيغة الجزيئية للمركب هي

2 اكتب المعادلة الكيميائية التي توضح تفاعل المركب مع مول من الهيدروجين

.....
.....

(4) مركب هيدروكربوني غير مشبع متماثل يحتوي على أربع ذرات كربون عند تفاعله مع مول واحد من الهيدروجين بوجود النيكل الساخن عند $200^\circ C$ ينتج الألكان المقابل والمطلوب:

1 يسمى المركب حسب نظام الأيوباك

2 ينتمي المركب الى عائلة

3 الصيغة الجزيئية للمركب هي

4 الصيغة التركيبية المكثفة للمركب هي

(5) مركب هيدروكربوني غير مشبع (A) عند تفاعله مع مول من الهيدروجين في وجود النيكل عند 200°C ، يتكون المركب العضوي غير المشبع (B) والذي تفاعل مع مول من الهيدروجين فتكون المركب $(\text{CH}_3 - \text{CH}_3)$ والمطلوب:

- (1) اسم المركب (A) حسب نظام الايوباك
- (2) العائلة التي ينتمي لها المركب (A)
- (3) الصيغة الجزيئية للمركب (B)
- (4) الصيغة التركيبية المكثفة للمركب (B)
- (5) اكتب المعادلات الكيميائية التي توضح تفاعل المركبات (A) و (B) في التفاعلات السابقة



(6) مركب عضوي A يحتوي على ذرتي كربون وصيغته الجزيئية العامة $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ عند تفاعل مول واحد منه مع مول واحد من الهيدروجين في وجود النيكل الساخن عند درجة تقارب 200°C تكون مركب عضوي B والذي عند تفاعله مع الهيدروجين يتكون المركب C بينما عند تفاعل مول واحد من المركب A مع مولين من غاز الهيدروجين يتكون المركب C والمطلوب:

- أ- كتابة اسم المركب A والصيغة الكيميائية التركيبية المكثفة له هي
- ب- كتابة اسم المركب B والصيغة الكيميائية التركيبية المكثفة له هي
- ت- كتابة اسم المركب C والصيغة الكيميائية التركيبية المكثفة له هي
- ث- اكتب المعادلات الكيميائية التي توضح التفاعلات التالية:

1. تحول المركب A إلى المركب B

2. تحول المركب B إلى المركب C

3. تحول المركب A إلى المركب C

السؤال العاشر :

(أ) اختر من القائمة (B) (كمواد ناتجة) ما يناسب القائمة (A) (كمواد متفاعلة) بوضع الرقم المناسب بين القوسين:

الرقم المناسب	(B)	الرقم	(A)
	$\text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$	1	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2$
	$\text{CH}_3 - \text{CH}_3$	2	$\text{CH} \equiv \text{CH} + \text{H}_2$
	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	3	$\text{CH}_4 + \text{Cl}_2$
	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2\text{Cl}$		

(ب) أكمل الجدول التالي :

نوع الرابطة بين ذرتي الكربون (احادية - ثنائية - ثلاثية)	المركب	
	CH_3CH_3	1
	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$	2
	CH_2CH_2	3
	CHCH	4

السؤال الحادي عشر : اكتب الاسم او الصيغة البنائية لكل مركب من المركبات التالية

م	الاسم	الصيغة البنائية المكثفة
1	2 - ميثيل بيوتان	
2		$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
3	1 - بيوتانين	
4		$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ \quad \quad \\ \text{CH}_3 \quad \quad \text{CH}_3 \end{array}$
5		$\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_6 - \text{CH}_3$
6	4,3 - ثنائي ميثيل هكسان	
7		$\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
8	ايتين	
9		$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2 \text{ CHCH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$
10	4,4,2,2 رباعي ميثيل بنتان	
11		$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
12	البروبانين	
13	3 - ايثيل , 2 - ميثيل بنتان	
14		$\text{CH} \equiv \text{CH}$
15	4,2 - ثنائي ميثيل هكسان	
16		$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCH}_3 \end{array}$

السؤال الثاني عشر

أ - ادرس الجدول التالي وضع خطأ تحت الجمل أو العبارات التي لها صلة بالعبارة الرئيسية

الهيدروكربونات الأليفاتية غير المشبعة			العبارة الرئيسية
2 - بيوتانين	1 - بيوتين	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	الجمل والعبارات
C_6H_6	$\text{CH} \equiv \text{CH}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	
تتفاعل بالإضافة	CH_3CH_3	CH_4	

ب - ادرس الجدول التالي وضع خطأ تحت الجمل أو العبارات التي ليس لها صلة بالعبارة الرئيسية

الهيدروكربونات الأليفاتية غير المشبعة			العبارة الرئيسية
2 - بيوتانين	1 - بيوتين	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	الجمل والعبارات
C_6H_6	$\text{CH} \equiv \text{CH}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	
تتفاعل بالإضافة	CH_3CH_3	CH_4	

انتهت الاسئلة ونرجو لكم التفوق والنجاح