تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية



الملف جدول مقارنة شامل للجهاز العصبي والمناعي والهرموني والتناسلي

موقع المناهج ← ملفات الكويت التعليمية ← الصف الثاني عشر العلمي ← علوم ← الفصل الأول

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر العلمي









روابط مواد الصف الثاني عشر العلمي على تلغرام

<u>الرياضيات</u>

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر العلمي والمادة علوم في الفصل الأول		
نموذج اجابة اختبار الاحياء لمنطقة مبارك الكبير التعليمية	1	
اجابة بنك اسئلة ممتاز في مادة الاحياء	2	
اجابة بنك اسئلة للكورس الاول في مادة الاحياء	3	
نموذج اجابة اختبارلنهاية الفترة الدراسية الاولى في مادة الاحياء	4	
نموذج اجابة اختبارلنهاية الفترة الدراسية الاولى في مادة الاحياء(نموذج2)	5	

مقارنات دروس أحياء 12 الفصل الأول

مقارنة بين الأجهزة العصبيه في الحيوانات:

الثدييات	الحشرات	الديدان	اللاسعات	الاسفنجيات	وجه المقارنة
يوجد	يوجد	يوجد	يوجد	لا يوجد	وجود الجهاز العصبي
1- دماغ 2-حبل شوكي 3-أعصاب 4-مستقبلات حسية	1-مخ يتكون من عدة عقد عصبية مندمجة. 2-حبل عصبي بطني. 3-عقد عصبية. 4-أعضاء حس مثل قرون استشعار و عيون.	1-مخ يتكون من عقدتين عصبيتين. 2-حبل عصبي بطني. بطني. 3-عقدة عصبية.	شبكة عصبية متصلة بمستقبلات و لايوجد مناطق معالجة مركزية		شكل الجهاز العصبي
الانسان	الجراد	دودة العلق الطبية	الهيدرا	الاسفنج	مثال
Italy change to be a few of the control of the cont	المحتى ا	الحتى العصور العصور الحتى العصور الحتى العصور الحتى العصور الحتى العصور الحتى العصور الحتى العصور الع			صورة الجهاز العصبي

مقارنه بین جهاز عصبی مرکزی و جهاز عصبی طرفی

		<u>.</u>
الجهاز العصبي الطرفي	الجهاز العصبي المركزي	وجه المقارنة
يجمع المعلومات من داخل الجسم و من خارجه و يوصلها إلى الجهاز العصبي	يعالج المعلومات التي يستقبلها و يرسل	
المركزي ثم ينقل التعليمات الصادره منه	تعليمات إلى الأجزاء الأخرى من الجسم	الوظيفة
إلى أجزاء الجسم الأعصاب-أعضاء الحس-المستقبلات		
الاعطاب-اعطاء الحس-المستعبدت	الدماغ و الحبل الشوكي	المكونات

مقارنة بين أنواع الخلايا العصبية على حسب شكلها و عدد الاستطالات:

خلايا متعددة القطب	خلايا ثنائية القطب	خلايا وحيدة القطب	وجه المقارنة
عدة استطالات قصيرة من جسم الخلية و التي تشكل الزوائد الشجيرية و استطالة طويلة واحدة تشكل المحور	استطالتين من قطبين متضادين لجسم الخلية أحدهما تشكل الزوائد الشجيرية و الأخرى المحور	استطالة واحدة من جسم الخلية تتفرع على شكل T أحد هذين الفرعين يشكل المحور الطرفي بينما الآخر المحور المركزي	شكلها
العضلات و الغدد	أعضاء الحس (الأنف و العين)	الجلد	أماكن
3 -	(0,2, 3, 2, 1, 6, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,		وجودها
روائد جسم جسم الخاتية الخاتية نهايات	روائد شحریة جسم الحلیة الحایت نهایات محوریة	نهایات محوریهٔ اختیهٔ محور محور محوری طرفی زواند مرکزی طرفی شجریهٔ	الرسىم

مقارنة بين أنواع الأعصاب على حسب وظيفتها و أنواع الألياف العصبية الموجودة فيها:

أعصاب مختلطة	أعصاب صادرة	أعصاب واردة	وجه المقارنة
تنقل السيالة بالاتجاهين	تنقل السيالة العصبية الحركية من المراكز العصبية إلى الأعضاء المنفذة	تنقل السيالة العصبية الحسية من أعضاء الحس إلى المراكز العصبية	الوظيفة
ألياف حسية و حركية	ألياف حركية	ألياف حسية	نوع الألياف فيها
الأعصاب الشوكية	العصب الحركي للعين	العصب البصري و السمعي و الشمي	أمثلة

مقارنة بين خلايا الغراء العصبي الكبيرة

خلايا شوان	خلايا الغراء النجمية	خلايا الغراء قليلة التفرعات	وجه المقارنة
الجهاز العصبي الطرفي	الجهاز العصبي المركزي	الجهاز العصبي المركزي	أماكن التواجد
1-تكون غلاف الميلين حول محور الخلايا العصبية في الجهاز العصبي الطرفي. 2-تشكل غلاف الليف العصبي.	1-تمد الخلايا العصبية بال O2 + العناصر الغذائية O2 - العناصر الغذائية 2-تساعد على حفظ ثبات الوسط الكيميائي للخلايا العصبية. 3-نقل اشارات الجهاز العصبي.	مسؤوله عن تكون غلاف الميلين حول محور الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي	الوظيفة

مقارنة بين نواع المشتبكات العصبية علي حسب طبيعة المواد الناقلة للسيال العصبي:

المشتبكات الكهربائية	المشتبكات الكيميائية	وجه المقارنة
تيار كهربائي	مواد الكيميانية	طبيعة المواد الناقلة
بين النهايات المحورية لخلية عصبية وخلية عضلية (موصل العضلي العصبي)	1-بين النهايات المحورية و الزوائد الشجيرية و الشجيرية 2-بين النهايات المحورية و جسم الخلية 3-بين النهايات المحورية و محور خلية عصبية أخرى	أماكن التواجد
أقل	أكثر	نسبة التواجد في الجسم

مقارنة بين أنواع النواقل العصبية:

ناقل عصبي مثبط	ناقل عصبي منبه	وجه المقارنة
جابا	الأستيل كولين	مثال
أيون الكلور	أيون الصوديوم	الأيون المؤثر عليه
فتح قناة Cl لتسمح بدخوله ويؤدي إلى فرط الاستقطاب ويستحيل فيه تولد جهد العمل	فتح قناة Na لتسمح بدخوله ويؤدي إلى زوال الاستقطاب حتى يصل إلى عتبة الجهد و يولد جهد العمل	التأثير

مقارنة بين جهد العمل و جهد الراحة:

جهد العمل	جهد الراحة	وجه المقارنة
انعكاس الشحنة الكهربائية لغشاء الخلية العصبية ثم استعادة الخلية لوضعها السابق	الجهد الكهربائي لغشاء الخلية العصبية في حالة الراحة	المفهوم أو التعريف
1-منبه فعال شدته أكثر من 50mv- 2-فتح قناة Na ودخول Na إلى داخل الخلية	1-فروقات تركيز الأيونات على جانبي الغشاء و اختلاف نفاذية الغشاء للايونات 2-مضخة Na-K	السبب
+30 mv	-70 mv	جهد الغشاء
زوال الاستقطاب	استقطاب الغشاء	حالة الغشاء

مقارنة بين أنواع التنبيه أو الاستثارة:

تنبيه غير فعال	تنبيه فعال	وجه المقارنة
تنبیه غیر قادر علی تولید جهد عمل لان	تنبیه قادر علی تولید جهد عمل لان شدة	المفهوم
شدة التنبيه تحت عتبوية	التنبيه فوق عتبوية	
أقل من 50mv-	أكثر م <i>ن</i> 50mv-	شدة التنبيه

مقارنة بين المادة البيضاء و المادة الرمادية في الحبل الشوكي و الدماغ:

المادة الرمادية	المادة البيضاء	وجه المقارنة
منطقة وسطية	منطقة محيطية	موقعها في الحبل الشوكي
منطقة محيطية	منطقة وسطية	موقعها في الدماغ
زوائد شجيرية- محور غير ميليني-خلايا غراء-اجسام خلايا عصبية	زوائد شجيرية و محور ميليني	تركيبها

مقارنة بين الحهاز العصبي الطرفي و الجهاز العصبي الذاتي:

جهاز عصبي طرفي ذاتي	جهاز عصبي طرفي جسمي	وجه المقارنة
يضبط الاستجابات اللاارادية	يضبط الأفعال الارادية و الأفعال اللاارادية	الوظيفة
أعضاء تستجيب بشكل غير ارادي	أعضاء تستجيب بشكل ارادي	نوع الاعضاء التي تسيطر عليها
اثنتان	واحدة	عدد الخلايا الحركية التي تربط بالجهاز المركزي

مقارنة بين طبقات انسجة السحايا

الأم الحنون	الأم العنكبوتية	الأم الجافية	وجه المقارنة
غشاء داخلي	غشاء وسطي	غشاء خارجي	الموقع
غشاء ليفي رفيع و قوي	عشاء رخو كالاسفنج	غشاء متين و كثيف	الوصف
ألياف و شبكة من الشعيرات	ألياف الكولاجين و سائل	نسيج ضام يتكون من	المكونات
الدموية	دماغي شوكي	طبقتين:	
		1-خارجية "السمحاقية"	
		2-داخلية "السحائية"	
مغذي للمراكز العصبية	1- يمتص الصدمات	حماية الجهاز العصبي	الوظيفة
	2-يزود بالمغذيات	المركزي	
	3-يحمي من ضغط القوى		
	الميكانيكية		

الفص الصدغي	الفص القفوي	الفص الجداري	الفص الجبهي	وجه المقارنة
سمعية	بصرية	حسية	حركية	منطقة الترابط العصبية
السمع ـ الشم	الإبصار	الكلام ـ التذوق	الكلام	مسئول عن ضبط الوظائف التالية

مقارنة بين الجهاز السمبثاوي و نظير السمبثاوي:

الجهاز نظير السمبثاوي	الجهاز السمبثاوي	وجه المقارنة
يضبط الأنشطة الروتينية الت يقوم بها الجسم في أوقات الراحة	يتحكم بأعضاء الجسم في حالات الطوارئ و مواجه الاخطار لتحضير الجسم لتنفيذ أي نشاط يتطلب طاقة كبيرة و اجهاد مضاعف	الوظيفة
1-ينشط القناة الهضمية 2-تتباطأ نبضات القلب و يتقلص بؤبؤ العين 3-تضيق الممرات الهوائية في الرئتين	1-يخفض نشاط القناة الهضمية و يحول الدم إلى عضلات الرجلين و الذراعين 2-تتسارع نبضات القلب و يتسع بؤبؤ العين 3-تمدد الممرات التنفسية في الرئتين	أمثلة على انشطة يتحكم بها
العقد الخارجية هي عقد طرفية بمحاذاة الأعضاء المنفذة	1-تمتد سلسلتين متوازيتين على جانبي العمود الفقاري من الأعلى إلى الأسفل(عقد سمبثاوية مجاورة للحبل العصبي) 2-العقد الخارجية تكون أقرب من الأعضاء المنفذة	طريقة انتشار العقد الخارجية
الخلية ما قبل و بعد العقد تفرز الأسيتيل كولين	1-الخلية ما قبل العقد تفرز الأسيتيل كولين 2-الخلية بعد العقد تفرز نورابنيفرين	النواقل العصبية التي تفرزها خلايا ما قبل و بعد العقد

مقارنة يبن التنظيم العصبي و التنظيم الهرموني

الجهاز الهرموني	الجهاز العصبي	وجه المقارنة
سيالات هرمونية	سيالات عصبية	طريقة الارسال
بطيئة	سريعة	سرعة الاستجابة
طويلة الأمد	قصيرة الأمد	مدة التأثير
التغيرات في مرحلة البلوغ	التغيرات في حالة الهلع و الهروب	مثال على نشاط تسيطر عليه

العقاقير و الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي:

المخدرات	المهلوسات	المهبطات أو المسكنات	المنبهات أو المنشطات	وجه المقارنة
عقاقير التي تسكن أو تخفف الألم أو تسبب النعاس	افير تــؤثر فــي الادراك الحســـي الجهتــز العصـــبي المركزي	التي تبطئ نشاط الع المر	عقاقير التي تزيد ، نشاط الجهاز العصبي و تزيد من معدل ضربات القلب و تسربات القلب و تسرع انتقال السيالات العصبية و ترفع ضغط الدم.	التعريف
مشتقات الأفيون الكوكايين الماريجوانا الستيرويدات	میسکالین PC لی الهیرویین	الباربيتورات المسكنات	النيكو تين-الكحوا الكافيين-الكو كايي	أمثلة
1-تبديل احسساس الفرد للواقع. 2-ارتباك العقل. 3-فقدان للذاكرة.	1-يتخيـل منـاظر وأصوات. 2-تفاعل بصورة غير متوقعة مع الأشياء.	1-تخفف الأرق أو القلق. القلق. 2-الجرعة المفرطة تسبب الدخول في غيبوية أو الموت.	1-تسرع انتقال السيالات العصبية. 2-اجهاد للجهاز العصبي. 3-تودي إلى سكتة دماغية.	تأثيرها على الجهاز العصبي

مقارنة بين الأجهزة الهرمونية في الحيوانات:

الثييات	البرمائيات	المفصليات	الرخويات	اللاسعات	وجه المقارنة
1-يثبت الحمل.	تحفز مراحل تحول	1-تنظیم عملیات	1-يحــث علـــى	تحدد نوع التكاثر	
2-تحديد موعد	أبوذنيبة إلى ضفدع	النمو و التكاثر.	وضع البيض.	(جنســــي أو	
الولادة.	يافع	2-تــنظم التــوازن	2-يتبط سلوكيات	لاجنسي)	
3-تحفىز افسراز		الداخلي و الأيض.	أخرى مثل التغذية		التأثير
الحليب.		3-تنظم التلون مع	و الحركة.		التاثير
		البيئة.			
		4-نمو جسم الحشرة			
		وانسلاخها.			
		السلطعون			
القط	الضفدع	الكركند	أرنب البحر	الهيدرا	مثال
		الحشرة			

مقارنة بين الأنواع المختلفة من الغدد:

الغدد المختلطة	الغدد اللاقنوية	الغدد القنوية	وجه المقارنة
غدد تجمع ذات قنوات و في نفس الوقت تصب افرازاتها في الدم مباشرة	غدد ليس لها قنوات خاصة بل تصب افرازاتها مباشرة في الدورة الدموية	غدد تحتوي على قنوات تصب بواسطتها الافرازات إما إلى خارج الجسم أو داخله	المفهوم
البنكرياس	الغدة النخامية-الغدة الدرقية تحت المهاد-غدة جاردرقية الغدتان الكظريتان-الغدة الصنوبرية العدة الزعترية	الغدد العرقية-الغدد الدمعية الغدد اللعابية-الغدد الثديية	أمثلة

مقارنة بين الفص الأمامي و الفص الخلفي للغدة النخامية:

القص الأمامي	الفص الخلفي	وجه المقارنة
کبیر	صغير	الحجم
انتاج عدد من الهرمونات الافرازية	تخزين هرمونين ينتجهما تحت المهاد	الوظيفة
خلايا غدد الصماء	خلايا عصبية افرازية	التركيب
هرمون النمو (GH) هرمون الحليب (Prolactin) الهرمون المنبه للحويصلة (FSH) الهرمون المنبه للغدد الدرقية (TSH) الهرمون الموجه لإفراز الميلانين(MSH) الهرمون الموجه لإفراز الميلانين(ACTH)	الهرمون المضاد لادرار البول(ADH) أو الفازوبريسين هرمون الأوكسيتوسين	الهرمونات المنتجه

مقارنة النخاع الكظري و القشرة الكظرية:

القشرة الكظرية	النخاع الكظري	وجه المقارنة
المنطقة الخارجية	المنطقة الداخلية	الموقع
%80	%20	نسبة المساحة
خلایا غدد صماء	خلايا عصبية	الأنسجة المكونة
24 كورتيكوستيرودات	الأدرينالين و النور أدرينالين	الهرمونات المفرزة
1-الألدوستيرون ينظم اعادة امتصاص المهاوطرد + K من الكلية 2-الكورتيزول تنظيم معدلات الأيض للدهون و الكربوهيدرات و البروتينات بحيث ينشط الجسم في حالات الاجهاد المزمن	يضبط استجابات الدفاع و الهروب	تأثير الهرمونات

مقارنة بين خلايا بيتا و خلايا ألفا في جزر لانجرهانس

خلايا ألفا	خلايا بيتا	وجه المقارنة
الجلوكاجون	الأنسولين	الهرمون المنتج
يحفز الكبد على تكسير الجليكوجين و طرح الجلوكوز في الدم	1-يحفز خلايا الكبد و العضلات لسحب السكر من الدم و تخزينه في صورة جليكوجين 2-يحفز أنسجة الجسم على امتصاص السكر و استخدامه. 3-يزيد امتصاص الخلايا الشحمية للسكر	تأثير الهرمون
الكند	الكبد-العضلات-الخلايا الشحمية	الخلايا المستهدفة

مقارنة بين أنواع مرك البول السكري

مرض البول السكري النوع الثاني	م البول السكري النوع الأول	وجه المقارنة
عدم استجابة الجسم كما ينبغي لهرمون	عد راز خلايا بيتا في جزر لانجرهانس	سبب الاصابة
الانسولين الذي تفرزه خلايا بيتا	هرمون الأنسولين	
التمارين الرياضية و ضبط النظام الغذائي	صر النظام الغذائي و الحقن المنتظم	العلاج
	بالانسولين	

مقارنة بين القماءة (التقزم) و التورم الدرقي

التورم الدرقي	القماءة	وجه المقارنة
نقص الثايروكسين في <i>مرحلة البلوغ</i>	نقص اليود مما يؤدي إلى نقص الثايروكسين في مرحلة الطفوله	التأثير
	في <i>مرحلة الطفوله</i>	
انخفاض معدلات الإستفلاب الخلوي ودرجة	التقزم و التخلف العقلي	الأعراض
حرارة الجسم و زيادة الوزن و تضخم العدة		
الدرقية		
أخذ جرعات منتظمة من الثايروكسين	اضافة اليود في الطعام و أخذ جرعات	العلاج
	منتظمة من الثايروكسين	-

مقارنة بين الاجهاد لفترة قصيرة و طويلة

الاجهاد لفترة قصيرة	الاجهاد لفترة تحيرة	وجه المقارنة
تفرز الغدتان الكظريتان الستيرويدات	ا هرموني ابينه و نورابينفرين	التأثير
ارتفاع ضغط الدم و اضعاف جهاز المناعة	زياده الله و المستوى الدم و مستوى	الأعراض
	السكر	

مقارنة بين تأثير الستيرويدات في الم

الذكور	ועט.	وجه المقارنة
تسبب أمراض في الكبد و القلب ضمور	رقف الدورة الشهرية لدر الناث و نمو	التأثير
الخصيتين و الموت المبكر	خصائص ذكرية ثانوية لديهم مثل زيادة شعر	
	الجسم و غلظة الصوت	

مقارنة بين البربخ و الحويصلة المنوية و نييبات المني و غدة كوبر

غدة كوبر	نييبات المني	الحويصلة المنوية	البربخ	وجه المقارنة
تفرز السائل المنوي	. •	مكان لتخزين	مكان لنضوج	الوظيفة
	الحيوانات المنوية	الحيوانات المنوية	الحيوانات المنوية	
		الناضجة		

مقارنة بين خلايا ليدج و خلايا سترولي

خلايا سترولي	خلایا لیدج	وجه المقارنة
داخل نبيبات المني	بين فصوص الخصية	أماكن التواجد
توفر الحماية و التغذية و نقل الهرمونات	تفرز هرمونات الأندروجين (التستوستيرون)	الوظيفة

مقارنة بين الطبقات الجرثومية للجاسترولا

الطبقة الداخلية	الطبقة الوسطية	الطبقة الخارجية	وجه المقارنة
الرئتين و الكبد و بطانة	الجهاز التناسلي و الكليتين و	الجهاز العصبي و الجلد و	الأعضاء
أعضاء الجهاز الهضمي و	العضلات و العظّام و القلب و	الغدد العرقية	الناتجه
بعض الغدد الصماء	الدم و الأوعية الدموية		

مقارنة بين غشاء الكوريون و غشاء الامنيون

غشاء الأمنيون	غشاء الكوريون	وجه المقارنة
يكون هذا الغشاء مع بعض خلايا بطانة	ينمو إلى كيس الأمنيوني الذي يحتوي على	الوظيفة
رحم الأم المشيمة و هي عضو يتم من	سائل أمنيوني يؤدي دور وسادة واقية حول	
خلاله تبادل المغذيات و الأكسجين و	الجنين النامي	
الفضلات بين الأم و الجنين النامي		

مقارنة بين أسباب العقم لدى الذكور و الانات

عقم الإناث	ء الذكور	وجه المقارنة
اختلال التوازن الهرموني	اج على من الحيوانات المنوية	الاسباب
ظهور ندبات في قناتي فالوب	اند يوانات منوية ناقصة النمو أو	
الحمل خارج الرحم	تشور عير و تعجز عن الحركة داخل قناة	
سرطان الرحم و المبيض	فالوب	
	تضخم في البروستاتا	
	سرطان عدة البروستاتا	

المواد الكيميائية المفرزه في الاستجابة المناعية

التأثير	الخلايا المفرزة	المادة	م
1-تمدد الشعيرات الدموية في موضع الجرح. 2-تزيد من انسياب الدم → احمرار الجرح. 3-تزيد من ترشح بلازما الدم من الشعيرات الدموية إلى السائل بين الخلايا → تورم الجرح. 4-ترشح الخلايا البعمية → تلتهم الجرح. 5-ترشح عوامل التخثر و الصفائح الدموية → تسد الجرح.	الخلايا البدينة	الهستامين	1
تحث الدماغ على رفع حرارة الجسم لكي: 1-تنشط الخلايا البلعمية. 2-تمنع تكاثر الكائنات الممرضة.	الخلايا البلعمية	البروجينات	2
وقاية الخلايا السليمة	الخلايا المصابة	الانترفيرونات	3

مقارنة بين مراحل دورة الحيض:

	T			Γ
الحيض أو الطمث	طور الجسم الأصفر	طور الاباضة	الطور الحويصلي	وجه المقارنة
أحدد أطدوار دورة الحيض حيث تبدأ بطانة الرحم بالانفصال عن جدار الرحم و يطرد معها الدم و البويضة غير المخصبة من خلال المهبل.	أحد أطوار دورة الحيض حيث تتحول الحويصلة إلى جسم أصفر ويستمر افراز الأستروجين و يبدأ افراز البروجيستسرون.	أقصر أطوار دورة الحيض فيها تنخفض درجة حرارة الجسم إلى 36.2°س وتتمزق فيها الحويصلة و تقذف البويضة في الحدى قناتي فالوب	أحد أطور دورة الحيض فيها تنمو الحويصلة الأولية لتصبح حويصلة جراف و تبدأ بانتصاح الأستروجين.	المقهوم
7-3 أيام	14 يوم	3-4 أيام	13-10 يوم	المدة الزمنية
°37	37.2°س	36.2°س	37°س	درجة الحرارة
الأستروجين و البروجستيرون	م الأستروجين و البروجستيرون	†LH - أالأستروجين	الأستروجين و البروجستيرون ↑ FSH	مستوى الهرمونات
غيرسميك	سميك جداً	سميك	غير سميك	سماكة بطانة الرحم
1-اذا لم يتم تخصيب البويضة بيدأ الجسم الأصفر بالتفتت و يقل البروجستيرون. 2-الانخفاض الكبير في مستوى الأستروجين في الدم يودي إلى انفصال بطائة الرحم عن الجدار و يطرد الدم و البويضة خارج الجسم	بطانـة الـرحم و تتكـون	1-زيسادة افسراز الأستروجين يحفر الأستروجين يحفر تحت المهاد لانتاج هرمون محرر GnRH النخامية لافسراز النخامية لافسراز المات أكثر من FSH ياثر في الحويصلة اذ تتمزق وتقذف البويضة الناضجة إلى احدى قناتي فالوب. 36.2 تسنخفض درجة حوالى 36.2°س	1-انخفاض الأستروجين يحفز تحت المهاد لانتاج هرمون محرر GnRH الخامية لافراز هرمون FSH بكمية أكبر من LH. ونضيض المحيض المناسو الحويصية ونضيجها لتصيح ويصلة غراف. ويصلة غراف تفرز هرمون الأستروجين	أهم الأحداث

مقارنة بين جهاز المناعي الفطري و التكيفي:

الجهاز المناعي التكيفي	الجهاز المناعي الفطري	وجه المقارنة
متخصص	غير متخصص	التخصص
1- المناعة الافرازية و تعتمد على	1-خط الدفاع الأول: الجلد-العرق-المخاط-	
الخلايا اللمفاوية البائية و الخلايا	الحمض المعوي-الدموع.	
البلعمية.	2- خط الدفاع الثاني: الاستجابة	المكونات
2-المناعة الخلوية و تعتمد على الخلايا	بالالتهاب و الخلايا البلعمية و	
اللمفاوية التائية.	الانترفيرونات.	

مقارنة بين الخلايا اللمفاوية التائية و البائية:

خلايا لمفاوية تائية	خلايا لمفاوية بائية	وجه المقارنة
وجود مستقبلات أنتيجينات تسمى	وجود مستقبلات على سطح الخلية تسمى	المستقبلات
مستقبلات الخلايا التائية(TCR)	أجسام مضادة	
تتنوع إلى: مقاتلة أوسامة-مساعدة-كابحة	تتحول خلال الاستجابة المناعية لخلايا	التنوع
أو مثبطة	بلازمية تفرز أجسام مضادة	

مقارنة بين الأنواع المختلفة للخلايا اللمفاوية التائية:

الخلايا الكابحة	الخلايا المساعدة	الخلايا المقاتلة	وجه المقارنة
تسمى بالخلايا المثبطة أو المنظمة T _s أو Tr	تسمى T ₄ بسبب وجود بروتينات متخصصة على سطحها CD ₄	تسمى T ₈ بسبب وجود بروتينات متخصصة على سطحها CD ₈	الاسم الآخر وسبب التسمية
تثبط الخلايا التائية الأخرى عندما لا تكون الحاجة إليها ملحة في الجسم	1-تؤدي دور مهم لدى المصابين بمرض الأيدز. 2-تحفز الخلايا التائية المقاتلة على الانقسام مكونة جيش كبير من الخلايا التائية المقاتلة و الخلايا الذاكرة التائية. 3-تحفر الخلايا البائية على انتاج الأجسام المضادة. 4-تفرز نوعاً من السيتوكينات ويسمى الانترلوكين و هي مواد كيميائية تعمل على نقل الإشارات و التواصل ما بين خلايا المناعية خلال المناعية خلال المناعية المناعية.	تقوم هذه الخلايا بمهاجمة الخلايا الضارة في الجسم عن طريق انتاج بروتين يمزق غشائها الخلوي	الأهمية

مقارنة بين الاجسام المضادة و مستقبلات الخلايا التائية:

مستقبلات الخلايا التائية	الاجسام المضادة	وجه المقارنة
على سطح الخلايا التائية	على سطح الخلايا البائية أو حرة في الدم	أماكن التواجد
2 سلسة من الببتيدات العديدة	4 سلاسل من الببتيدات العديدة	التركيب
التعرف على الانتجين بطريقة التعرف	التعرف على الانتجين السائل و الخلوي	
المزدوج	محدد على طريقة القفل و المفتاح	الوظيفة
(التعرف غير المباشر على الانتجين)	(التعرف المباشر على الانتجين)	

مقارنة بين البرفورين و الجرانزايم

الجرانزيم	البرفورين	وجه المقارنة
يحدث تفاعل انزيمي يؤدي إلى تحلل DNA للخلية المستهدفة و بالتالى تموت	يشكل قناة جوفاء علة سطح الخلية المستهدفة أو المصابة	تأثيره على الخلايا المستهدفة
يفرز من الخلايا Tc بعد تكون القناة الجوفاء على سطح الخلية المستهدفة.	يفرز من خلايا Tc بعد أن ارتبطت بالخلية المستهدفة (ارتباط مستقبل TCR للخلية Tc المستهدفة)	كيفية الفرز

مقارنة بين انترلوكين 2 و4

انترلوكين4	انترلوكين2	وجه المقارنة
دخول السموم بأنواعها	دخول الفيروسات أو البكتريا أو وجود خلايا سرطانية	أسباب الفرز
المناعة الافرازية	المناعة الخلوية	الوظيفة
خلايا بائية	خلايا تائية قاتلة	التأثير

مقارنة بين المناعة الخلوية و المناعة الافرازية:

المناعة الافرازية	المناعة الخلوية	وجه المقارنة
افراز انترلوكين-4 (IL-4)	افراز انترلوكين-2 (IL-2)	تأثير ارتباط T _h
() . 6. 99	(12 2) 2 33 33 33	بالانتجين
		نوع الخلايا التي
خلايا بائية	خلايا تائية قاتلة	يتأثر بها
		الانترلوكين
خلايا بائية	خلايا تائية	نوع خلايا الذاكرة
سم الثعبان-الفطر السام-سموم ميكروبية	عُلامًا مِن طَالِيهُ مُنْ أَمْ مُنْ الْمُعِيدُ مِنْ الْمُعِيدُ الْ	نوع العامل
في الدم و اللمف	خلايا سرطانية أو خلايا الجسم المصابة	الممرض
أجسام مضادة تنتجها الخلايا البائية	سموم تفرزها خلايا تائية	آلية العمل

تأثير FSH و LH على المبيض يختلف عن الخصيتين وذلك من خلال عرض الجدول التالي:

هرمون LH	هرمون FSH	وجه المقارنة
- انتاج البروجسترون و الأستروجين - تحول الجسم الأصفر إلى الأبيض - الاباضة	انتاج الأستروجين و نضوج الحويصلات	التأثير على المبيض
انتاج التستستيرون	انتاج الحيوانات المنوية	التأثير على الخصيتين

أهمية خلايا ليدج و خلايا سترولي في الجهاز التناسلي الذكري:

خلايا سترولي	خلايا ليدج	وجه المقارنة
داخل نبيبات المني	بين فصوص الخصيتين	الموقع
توفر الحماية و التغذية و نقل الهرمونات	تفرز هرمون التستستيرون	الأهمية

أهمية بعض التراكيب في الحيوان المنوي:

الذيل (السوط)	الميتوكوندريا	محور مركزي	الثواة	جسيم الطرفي	وجه المقارنة
الذيل	القطعة الوسطية	قطعة وسطية	الرأس	الرأس	الموقع
مسؤول عن حركة الحيوان المنوي	مصدر الطاقة لحركة الحيوان المنوي	ينشأ منه الذيل	تحتوي على المادة الوراثية	يحتوي على أنزيمات تساعد على عملية اختراق جدار البويضة	الأهمية

المناعة المكتسبة الطبيعية و المناعة المكتسبة الغير طبيعية

المناعة المكتسبة الغير طبيعية	المناعة المكتسبة الطبيعية	وجه المقارنة
اللقاح أو التطعيم	طبيعي	طريقة دخول الكائن الممرض
لا تظهر	تظهر	ظهور الأعراض

المناعة الأولية و الثانوية

المناعة الثانوية	المناعة الأولية	وجه المقارنة
قوية و سريعة	بطيئة و ضعيفة	سرعة و قوة الاستجابة
لا تظهر	تظهر	ظهور الأعراض
لا تتكون	تتكون	تكون خلايا الذاكرة

عملية تكون البويضات و الحيوانات المنوية

عملية تكون الحيوانات المنوية	عملية تكون البويضات	وجه المقارنة
مرحلة البلوغ	الطور الجنيني	المرحلة العمرية
التستستيرون	الاستروجين و البروجستيرون	الهرمونات المؤثرة
متواصل	دوري	النوع
72 يوم	28 يوم	المدة
غیر محدد و کثیر	محدد و قليل	العدد المنتج