

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج الكويتية




الخريطة روعة

الملف اختبار المسائل لتطبيق المهارات الحسابية على قوانين الغازات والاتزان والأحماض والقواعد

موقع المناهج ← ملفات الكويت التعليمية ← الصف الثاني عشر العلمي ← كيمياء ← الفصل الأول

روابط مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني عشر العلمي



روابط مواد الصف الثاني عشر العلمي على تلغرام

[الرياضيات](#)

[اللغة الانجليزية](#)

[اللغة العربية](#)

[التربية الاسلامية](#)

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني عشر العلمي والمادة كيمياء في الفصل الأول

بنك اسئلة التوجيه لعام 2018	1
خرائط مفاهيم ع العصماء 2018	2
بنك اسئلة حل باب الاحماض والقواعد	3
بنك اسئلة الوحدة الأولى الغازات	4
درس قوة الاحماض والقواعد في مادة الكيمياء	5



جميع مسائل كيمياء من بنك
الاسئلة الفصل الدراسي الأول 2025 .

كلهم ثاني اكسيد الكربون الا انت
اكسجين الدفعة 🎓 .

<https://t.me/Kuwaitstudents2025>

السؤال السابع : حل المسائل التالية :

1- عينة من غاز النيون تشغل حجماً قدره (10 L) عند درجة حرارة (40 °C) و تحت ضغط (101.3 kPa) فما هو الضغط اللازم ليصبح حجم هذه العينة من الغاز (4 L) مع ثبات الحرارة ؟

2- عينة من غاز النتروجين كتلتها (10 g) تشغل حجماً قدره (12 L) عند درجة (30 °C) ، احسب درجة الحرارة السيلييزية اللازمة ليصبح حجم هذه العينة من الغاز (15 L) مع ثبات الضغط .

موقع
المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

3- عينة من غاز ثاني اكسيد الكربون تشغل حجماً قدره (20 L) عندما تكون درجة حرارتها (37 °C) ، احسب حجم هذه العينة من الغاز عندما تصبح درجة حرارتها (57 °C) عند ثبات الضغط .

4- كمية معينة من غاز الهيليوم موضوعة في إناء عند درجة (30 °C) و تحت ضغط (121.26 kPa) فما هو ضغطها إذا سخنت إلى درجة (60 °C) مع ثبات حجمها ؟

5- بالون حجمه (3 L) مملوء بغاز الهيليوم عند درجة حرارة (27 °C) و تحت ضغط (121.56 kPa) ترك ليرتفع في السماء حيث وصل إلى نقطة قل فيها ضغطه حتى أصبح (60.78 kPa) فتمدد حجمه إلى (5 L) فما هي درجة الحرارة السيلييزية التي يتعرض لها هذا البالون عند هذا الارتفاع ؟



6- عينة من غاز الكلور تشغل حجماً قدره (18 L) عند درجة (18 °C) وتحت ضغط (101.3 kPa) احسب حجم هذه العينة من الغاز عند درجة (237 K) و تحت ضغط (50.65 kPa) .
almanahj.com/kw

7- عينة من غاز الأكسجين تشغل حجماً قدره (6 L) عند درجة (47 °C) وتحت ضغط (126.6 kPa) احسب حجم هذه العينة من الغاز في الظروف القياسية

1- احسب الحجم الذي تشغله كمية قدرها (0.5 mol) من غاز النيتروجين ، موضوعة في إناء عند درجة (27 °C) وتحت ضغط (202.6 kPa) علماً بأن (R = 8. 31)



2- احسب الضغط الذي يحدثه (0.9 mol) من غاز النيتروجين الموجود في إناء حجمه (2.7 L) عند درجة (35 °C) (R = 8. 31).



3- عينة من غاز الأكسجين حجمها (1500 mL) عند درجة (20°C) و تحت ضغط (60.78 kPa) احسب :

أ - حجم العينة باللتر عندما يصبح ضغطها (50.65 kPa) عند ثبوت درجة الحرارة .

ب - ضغط العينة عند درجة (0 °C) عند ثبوت الحجم .



ج - درجة حرارة العينة عندما يصبح حجمها (1.75 L) و ضغطها (80 kPa).

د - عدد مولات الأكسجين في هذه العينة ($R = 8.31$).

4- عينة من غاز تشغل حجماً قدره (2L) عند درجة (27 °C) و تحت ضغط (101.3 kPa) فإذا علمت أن كتلة هذه العينة تساوي (2.6 g) و أن ($R = 8.31$) فاحسب الكتلة الجزيئية لهذا الغاز.

5- عينة من غاز الأكسجين O_2 كتلتها (8 g) احسب الضغط اللازم ليصبح حجمها (6.15 L) عند درجة (27 °C) ، علماً أن ($R = 8.31$) ، ($16 = O$)



6- ما كتلة غاز النيتروجين الموجودة في إناء حجمه (1500 mL) و تحت ضغط (96.25 kPa) و عند درجة (0 °C) , (N = 14) (R = 8.31) .

.....

.....

.....

.....



موقع
almanahj.com/kw

2- يحتوي خليط غازي على أكسجين ونيروجين وثاني أكسيد الكربون ، ويساوى ضغطه الكلي 32.9kPa . إذا علمت أن الضغوط الجزئية للغازات كالتالي $P_{\text{N}_2} = 23\text{ kPa}$, $P_{\text{O}_2} = 6.6\text{ kPa}$ ، احسب الضغط الجزئي لغاز ثاني أكسيد الكربون P_{CO_2}

.....

.....

.....

3- إناء حجمه (10 L) عند درجة حرارة (300 K) و يحتوي على (0.6 mol) من غاز النيتروجين و (0.4 mol) من غاز الهيدروجين ، فاحسب الضغط الكلي داخل هذا الإناء ($R = 8.31$).

.....

.....

.....

.....

1- مخلوط من غازات النيون و الهيليوم والأرجون موضوع في إناء حجمه (4 L) عند درجة حرارة معينة ، فإذا علمت أن الضغوط الجزئية لهذه الغازات في هذا الإناء على الترتيب هي (60.78 kPa) ، (40.52 kPa) ، (20.26 kPa) فما هو الضغط الكلي للغازات في هذا الإناء .

.....

.....


.....

1- يتفاعل الكلور مع أكسيد النيتريك طبقاً للتفاعل المتزن التالي: $\text{Cl}_{2(g)} + 2\text{NO}_{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NOCl}_{(g)}$

فإذا وجد عند الاتزان أن تركيز كل من $(\text{Cl}_2, \text{NO}, \text{NOCl})$ هو $(0.32\text{M}, 0.2\text{M}, 0.1\text{M})$ على الترتيب .
فاحسب قيمة ثابت الاتزان K_{eq} لهذا التفاعل.


موقع
المنهج الكويتية
almanahi.com/kw

2- أدخل مزيج من (NO, H_2) في وعاء سعته 2L وعند درجة حرارة معينة حدث الاتزان التالي:



وعند الاتزان وجد أن المخلوط يحتوي على (0.02mol) من غازي (NO, H_2) و (0.15mol) من غاز (N_2) و (0.3mol) من بخار الماء . احسب قيمة ثابت الاتزان K_{eq}

3- يحضر الميثانول (CH_3OH) في الصناعة بتفاعل غازي (CO, H_2) عند درجة (500K) حسب التفاعل المتزن



التالي:


فإذا وجد عند الاتزان أن المخلوط يحتوي على (0.0406mol) ميثانول و (0.302mol) هيدروجين و (0.170mol) أول أكسيد الكربون أن حجم الإناء يساوي 2L . احسب قيمة ثابت الاتزان K_{eq}



4- في النظام المتزن التالي: $2\text{NOBr}_{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(g)} + \text{Br}_{2(g)}$

قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) تساوي (0.416) عند درجة (373K) فإذا كان تركيز غاز (NOBr) عند الاتزان يساوي تركيز غاز (NO) فاحسب تركيز بخار البروم (Br_2) عند الاتزان

5- أذيبت كمية من غاز الأمونيا في الماء وترك المحلول حتى حدث الاتزان التالي:




وعند الاتزان وجد أن تركيز كل من أنيون الهيدروكسيد والأمونيا في المحلول يساوي (0.016M , 0.002M) على الترتيب احسب قيمة ثابت الاتزان (K_{eq})

موقع
المنهج الكويتية
almanahi.com/kw

6- في التفاعل التالي: $\text{CaSO}_{4(s)} \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}_{(aq)} + \text{SO}_4^{2-}_{(aq)}$

إذا كانت قيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) تساوي (2.4×10^{-5}) فاحسب تركيز كل أيون في المحلول عند الاتزان.

7- ترك محلول لحمض الفورميك في الماء حتى حدث الاتزان التالي:



فإذا وجد أن تركيز كاتيون الهيدرونيوم في المحلول عند الاتزان يساوي ($4.2 \times 10^{-3}\text{M}$) وقيمة ثابت الاتزان (K_{eq}) تساوي (1.764×10^{-4}) فاحسب تركيز حمض الفورميك عند الاتزان.

السؤال السادس: حل المسائل التالية:

- 1- خمسة محاليل مائية تركيز أحد أيوناتها بالمول / لتر (M) عند (25 °C) كما في الجدول الموضح :
* صنف هذه المحاليل حسب طبيعتها إلى (حمضية ، قاعدية ، متعادلة)

موقع
المنهج الكويتية
almanahj.com/kw

المحلول	A	B	C	D	E
[H ₃ O ⁺]	1 × 10 ⁻³		1 × 10 ⁻¹⁰		
[OH ⁻]		1 × 10 ⁻³		1 × 10 ⁻¹²	1 × 10 ⁻⁷
نوع المحلول					

* رتب هذه المحاليل ترتيبا تصاعديا حسب حمضيته (من الأقل حمضية إلى الأكثر حمضية).

.....

* رتب هذه المحاليل ترتيبا تنازليا حسب قاعديتها (من الأكثر قاعدية إلى الأقل قاعدية) .

.....

2- محلول مائي تركيز $[H_3O^+]$ فيه يساوي (0.2 M) عند (25 °C) احسب تركيز $[OH^-]$ في المحلول.

3- محلول مائي تركيز $[OH^-]$ فيه يساوي (0.004M) عند (25 °C) احسب تركيز $[H_3O^+]$ في المحلول.

4- إذا كان تركيز $[OH^-]$ في الماء النقي عند درجة حرارة معينة يساوي ($5.3 \times 10^{-7} M$) ، فاحسب قيمة ثابت التأيّن للماء (K_w) عند هذه الدرجة.

موقع
المنهج الكويتية
almanahj.com

5- إذا كان الأس الهيدروكسيدي pOH لحمض ضعيف HA يساوي (11) والمطلوب :
(أ) حساب تركيز $[OH^-]$ في المحلول
(ب) حساب تركيز $[H_3O^+]$ في المحلول

6- حضر طالب محلولاً لحمض الأسيتيك تركيزه (0.1 M) ثم قام بقياس قيمة الأس الهيدروجيني pH له فوجدها (2.88) والمطلوب: حساب تركيز كاتيون الهيدرونيوم في المحلول $[H_3O^+]$.

7- إذا كان تركيز كاتيون الفلز الافتراضي M^{2+} في محلول هيدروكسيد هذا الفلز $M(OH)_2$ تام التأيّن يساوي ($5 \times 10^{-3} M$) عند 25 °C . احسب قيمة الأس الهيدروجيني (pH) لهذا المحلول.



8- عينة من عصير الليمون قيمة الأس الهيدروجيني (pH) لها تساوي (4.3) عند 25°C . احسب كل من تركيز كاتيون الهيدرونيوم ، أنيون الهيدروكسيد في العينة.

.....

.....

9- محلول لحمض ضعيف أحادي البروتون HA تركيزه (0.2 M) وتركيز كاتيون الهيدرونيوم في هذا المحلول يساوي ($9.869 \times 10^{-4}\text{M}$) والمطلوب حساب قيمة الأس الهيدروجيني لهذا المحلول؟

.....

.....



الحمد لله على السلامة . . . صار لازم ترتاح
وتطلع لنا بشي اقوى .

اتمنالك التوفيق 🎓💜 .