

ملخص الوحدة الأولى دورية الخصائص الفيزيائية لعناصر الدورة الثالثة



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

موقع فايلاتي ← المناهج العمانية ← الصف الحادي عشر ← فيزياء ← الفصل الثاني ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 12:38:10 2026-02-13

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل
منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي ا للمدرس

المزيد من مادة
فيزياء:

إعداد: محمد المشايخي

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر



صفحة المناهج
العمانية على
فيسبوك

المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر والمادة فيزياء في الفصل الثاني

مذكرة فيزياء مهمة 2 كمية التحرك ومجالات الجاذبية

1

ملخص الوحدة الخامسة كمية التحرك

2

دفتر الفيزياء ف2 عام 2023


3

نموذج إجابة الامتحان النهائي الرسمي الدور الأول الفترة الصباحية

4

نموذج إجابة الامتحان النهائي الرسمي الدور الثاني

5




عنصر الدورة الثالثة	نصف القطر الذري (nm)
Na	0.157
Mg	0.136
Al	0.125
Si	0.117
P	0.110
S	0.104
Cl	0.099
Ar	--

الجدول ١-٦ قيم أنصاف الأقطار الذرية


لعناصر الدورة الثالثة (1 nm = 10⁻⁹ m)

الشكل ٣-٦ تمثيل بياني لأنصاف الأقطار الذرية لعناصر الدورة الثالثة.

حتى نفس تدرج نصف القطر الذري يجب معرفة تركيبات الذرات للعناصر



عند الانتقال من اليسار إلى اليمين عبر دورة ما يزداد عدد البروتونات (العدد الذري) وبالتالي تزداد الشحنة النووية الموجبة ، ويزداد عدد إلكترونات التكافؤ بمقدار واحد في نفس مستوى الطاقة ويبقى تأثير الحجب ثابتاً تقريباً بالتالي تزداد قوة جذب النواة للإلكترونات الخارجية و يقل نصف القطر الذري.




الشكل ٤-٦ تمثيل بياني لأنصاف الأقطار الأيونية لعناصر الدورة الثالثة.

أيونات عناصر الدورة الثالثة	نصف القطر الأيوني (nm)
Na ⁺	0.095
Mg ²⁺	0.065
Al ³⁺	0.050
Si ⁴⁺	0.041
P ³⁻	0.212
S ²⁻	0.184
Cl ⁻	0.181

الجدول ٢-٦ قيم أنصاف الأقطار الأيونية لعناصر الدورة الثالثة.

لتفسير انماط التغير في انصاف الاقطار الايونية يجب رسم التركيب الذري للذرات و ايوناتها



يقول نصف القطر الأيوني للأيونات الموجبة (الكاتيونات) لأنه ذرات العناصر الفلزية تفقد إلكترونات من المدار الأخير بالتالي تتفقد مستوى طاقتها الإلكتروني الخارجي و يقل الحجب للإلكترونات الخارجية في هذه الكاتيونات مقارنة بذراتها الأصلية و يقل نصف القطر الأيوني.

كلما زادت شحنة الايون الموجب قلت نصف القطر الايوني بسبب زيادة الشحنة النووية الموجبة مثلا نصف القطر الايوني Mg^{2+} أصغر من النصف القطر الايوني Na^{+} لأنه الشحنة النووية في Mg^{2+} أكبر Na^{+} من مع ثبات الحجب تقريبا

يزداد حجم الأيونات السالبة عن حجم ذراتها الأصلية . وذلك لأن كل ذرة ستكون قد اكتسبت إلكترونًا واحدًا أو أكثر يُضاف إلى مستوى الطاقة الرئيسي الثالث لهذه الذرة. الأمر الذي يزيد من التنافر بين إلكتروناتها، في حين تبقى الشحنة النووية ثابتة. وهذا يؤدي إلى زيادة حجم الأيون مقارنة بذرته الأصلية

كلما زادت الشحنة النووية للأيونات السالبة قل نصف القطر الايوني مثلا نصف القطر الايوني S^{2-} أقل من نصف القطر الايوني P^{3-} لأنه الشحنة النووية لايون الكبريت أكبر و التنافر بين الالكترونات أقل لأنه اكتسب $2e^{-}$

سؤال

١) انظر إلى العناصر الموجودة في الدورة الثانية في الجدول الدوري الموضح في الشكل (٦-١). باستخدام معلوماتك عن عناصر الدورة الثالثة، قارن كل زوج من الجسيمات الآتية و اشرح إجابتك.

- نصف القطر الذري لكل من الليثيوم (Li) والفلور (F).
- حجم كل من ذرة الليثيوم (Li) وأيونها الموجب (Li^{+}).
- حجم كل من ذرة الأكسجين (O) وأيونها السالب (O^{2-}).
- حجم كل من أيون النيتريد (N^{3-}) وأيون الفلوريد (F^{-}).

حتى تجيب على الأسئلة أرسم تركيب الذرات و الايونات في السؤال


الأنماط الدورية لدرجات الانصهار والتوصيل الكهربائي

عناصر الدورة الثالثة	الصوديوم (Na)	الماغنيسيوم (Mg)	الألومنيوم (Al)	السيليكون (Si)	الفوسفور (P)	الكبريت (S)	الكلور (Cl)	الأرغون (Ar)
درجة الانصهار (K)	371	923	932	1683	317	392	172	84


نلاحظ أن هناك ارتفاعًا في درجة الانصهار وصولاً إلى السيليكون، وبعدها يحدث انخفاض كبير عند الفوسفور والعناصر اللافلزية الأخرى.

ما سبب الارتفاع في درجة الانصهار العناصر الفلزية عند الانتقال من الصوديوم إلى الألومنيوم؟


حتى نفهم السبب يجب معرفة نوع الترابط في الفلزات



- الرابطة الفلزية هي قوى الجذب الكهروستاتيكية بين أيونات الفلز الموجبة و بحر من الإلكترونات الحرة السالبة .
- الرابطة الفلزية في الألومنيوم أقوى، حيث إن كل ذرة ألومنيوم تمنح ٣ إلكترونات لبحر الإلكترونات الحرة (الغير متركزة) أكثر من الصوديوم و الماغنسيوم بالتالي هناك قوة جذب أكبر بين الايونات التي تحمل الشحنة +3 والعدد الكبير من الإلكترونات غير المتمركزة التي تحمل شحنة سالبة والمرتبطة بالبنية الضخمة بالتالي درجة انصهاره أعلى.




- يمتلك السيليكون تركيباً جزيئياً ضخماً مع شبكة ضخمة من ذرات السيليكون المترابطة فيما بينها بروابط تساهمية قوية عبر التركيب كامل لذا تكون درجات انصهاره مرتفعة جداً





تركيب الفوسفور P₄

يمتلك الفوسفور تركيباً جزيئياً بسيطاً P₄ ترتبط فيما بينها بقوى فان ديرفال



تركيب الكبريت S₈


يمتلك الكبريت تركيباً جزيئياً بسيطاً S₈ ترتبط فيما بينها بقوى فان ديرفال



تركيب Cl₂

يمتلك الكلور تركيباً جزيئياً بسيطاً Cl₂ ترتبط فيما بينها بقوى فان ديرفال ضعيفة نسبياً

ترتيب قوى فان ديرفال بين الجزيئات التساهمية البسيطة



لأنه كلما زاد عدد الإلكترونات في الجزيء التساهمي البسيط زاد قوى فان ديرفال

عناصر الدورة الثالثة	الصوديوم (Na)	الماغنيسيوم (Mg)	الألومنيوم (Al)	السيليكون (Si)	الفوسفور (P)	الكبريت (S)	الكلور (Cl)	الأرغون (Ar)
نوع الروابط	فلزية	فلزية	فلزية	تساهمية	تساهمية	تساهمية	تساهمية	—
التركيب	فلزي ضخمة	فلزي ضخمة	فلزي ضخمة	جزيئي ضخمة	جزيئي بسيط	جزيئي بسيط	جزيئي بسيط	ذرات منفردة

عناصر الدورة الثالثة	الصوديوم (Na)	الماغنيسيوم (Mg)	الألومنيوم (Al)	السيليكون (Si)	الفوسفور (P)	الكبريت (S)	الكلور (Cl)	الأرغون (Ar)
التوصيل الكهربائي (S/m)	0.218	0.224	0.382	2×10^{-10}	10^{-17}	10^{-23}	---	---

يعتمد التوصيل الكهربائي على وجود الإلكترونات الحرة و كلما زاد عددها زادت قدرة العنصر على التوصيل لذلك الألومنيوم لديه أعلى قدرة على التوصيل بسبب أنه كل ذرة ألومنيوم تمنح ٣ إلكترونات لبحر الإلكترونات الحرة مقارنة بالإلكترونين في الماغنسيوم و إلكترون في الصوديوم

لا توجد إلكترونات حرة في بقية العناصر في الدورة الثالثة بسبب أنه طاقة تأينها عالية جدا بالتالي لا تفقد إلكتروناتها لتكوين بحر من الإلكترونات الحرة.

سؤال

٢) فسر ما يلي:

- يملك الكبريت درجة انصهار أقل من السيليكون.
- يملك الكبريت درجة انصهار أكبر من الكلور.
- يُعدّ الماغنيسيوم موصلًا كهربائيًا أفضل من الفوسفور والصوديوم.

للإجابة على هذه الاسئلة يجب معرفة تراكيب الجزيئات و الذرات

تفاعلات عناصر الدورة الثالثة مع الأكسجين

قبل البدء في تفاعلات عناصر الدورة الثالثة يجب معرفة كيفية كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات الأيونية و التساهمية أولاً المركبات الأيونية

1	2	3	4	5	6	7	8
H•							•He•
Li•	•Be•	•B•	•C•	•N•	•O•	•F•	•Ne•
Na•	•Mg•	•Al•	•Si•	•P•	•S•	•Cl•	•Ar•
K•	•Ca•	•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	•Br•	•Kr•
Rb•	•Sr•	•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	•I•	•Xe•
Cs•	•Ba•						

تفاعلات الأكسجين مع عناصر الدورة الثالثة

تكون شحنة الأكسجين (عدد تأكسده) 2- في كل مركباته مع عناصر المجموعة الثالثة لأنه أعلى في السالبية الكهربائية منها

السالبية الكهربائية هي قدرة الذرة على جذب الإلكترونات المشتركة

- يتفاعل بشدة عند تسخينه في وعاء مع كمية محدودة من الأكسجين مكوناً مادة صلبة بيضاء




- يتفاعل الماغنسيوم بشدة عند تسخينه في وجود الأكسجين مكوناً لهباً أبيضاً ساطعاً و مادة صلبة بيضاء أكسيد الماغنسيوم



- فلز الألمونيوم كونه محمياً بطبقة من أكسيد الألمونيوم التي تمنع تفاعله المباشر مع الأكسجين. ولكن مسحوق الألمونيوم يتفاعل بشكل جيد مع الأكسجين، ويحترق منتجاً لهباً أبيضاً ساطعاً، ومكوناً مادة صلبة بيضاء من أكسيد الألمونيوم



- يتفاعل السيليكون ببطء مع الأكسجين لتكوين أكسيد السيليكون $SiO_2 (V)$



- يتفاعل الفوسفور بشدة مع الأكسجين. وينتج من ذلك لهب أصفر وسحب بيضاء من أكسيد الفوسفور (P_4O_{10})



- بمجرد إشعال مسحوق الكبريت فإنه يحترق ، بلطف مع لهب أزرق عند وضعه في وعاء يحتوي على غاز الأكسجين. وينتج من ذلك أبخرة سامة من غاز ثنائي أكسيد الكبريت



تفاعلات عناصر الدورة الثالثة مع الكلور

تكون شحنة الكلور (عدد تأكسده) - 1 في كل مركباته مع عناصر المجموعة الثالثة لأنه أعلى في السالبية الكهربائية منها

يتفاعل غاز الكلور Cl_2 بشدة مع فلزات الدورة الثالثة لأنها نشطة وتميل لفقد الإلكترونات و الكلور يميل إلى كسب الإلكترونات لتكوين مركبات أيونية صلبة





ويتفاعل السيليكون ببطء مع غاز الكلور، فينتج من ذلك كلوريد السيليكون (IV) $SiCl_4$



كما يتفاعل الفوسفور ببطء أيضاً مع فائض من غاز الكلور



ويكون الكبريت كلوريدات مثل ، (S_2Cl_2) و (SCl_2) أما غاز الأرجون فلا يتفاعل مع غاز الكلور.



غاز الأرجون لا يتفاعل مع غاز الكلور

تفاعلات عناصر الدورة الثالثة مع الماء

- يتفاعل الصوديوم بشدة مع الماء البارد، فينصهر ويتحول إلى كرة من الفلز المصهور ويتحرك عبر سطح الماء مطلقاً غاز الهيدروجين مكوناً محلولاً قلويّاً قوياً من هيدروكسيد الصوديوم $NaOH$ (pH= 12-14)



- يتفاعل الماغنيسيوم ببطء شديد مع الماء البارد ويستغرق عدة أيام لإنتاج كمية بسيطة من غاز الهيدروجين. ويكون المحلول المتكون قلويّاً ضعيفاً (pH= 10) وسبب ذلك أن هيدروكسيد الماغنيسيوم المتكون يمتلك ذوبانية منخفضة جداً في الماء



- الألومنيوم لا يتفاعل مع الماء لانه مغطى بطبقة من أكسيد الألومنيوم التي لا يتفاعل مع الماء ولا يذوب فيه، ولهذا السبب تعمل طبقة الأكسيد على حماية فلز الألومنيوم من التآكل.

سؤال

- ٣ أ. يتفاعل الليثيوم (Li) الموجود في المجموعة (I) بالطريقة نفسها التي يتفاعل بها عنصر الصوديوم، اكتب المعادلات الكيميائية الرمزية الموزونة للتفاعلين الآتيين:
١. تفاعل الليثيوم (Li) مع الأكسجين (O_2)
 ٢. تفاعل الليثيوم (Li) مع الكلور (Cl_2)
- ب. ١. يتفاعل فلز الكالسيوم الموجود في المجموعة 2 (II) مع الماء البارد بشدة أكثر من تفاعل الماغنيسيوم، مكوّنًا محلولًا قلويًا. اكتب المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة لهذا التفاعل، متضمنة رموز الحالة الفيزيائية.
٢. تفاعلت كميات متساوية من الكالسيوم والماغنيسيوم مع الماء، وقيس الرقم الهيدروجيني pH للمحلولين الناتجين. بالنسبة إلى التفاعل مع الكالسيوم، كانت قيمة pH للمحلول تساوي 13، أمّا بالنسبة إلى التفاعل مع الماغنيسيوم، فكانت قيمة pH للمحلول تساوي 11. فسر سبب اختلاف الرقم الهيدروجيني بين المحلولين.

٦-٣- أكاسيد عناصر الدورة الثالثة

أعداد التأكسد

عدد التأكسد هو مقدار الشحنة التي تحملها الذرة في مركباتها

عدد تأكسد عناصر المجموعة الأولى = ١

عدد تأكسد عناصر المجموعة الثانية = ٢

عدد تأكسد عناصر المجموعة الثالثة = ٣

و هو يساوي عدد الالكترونات في المدار الأخير

عدد تأكسد الاكسجين 2- في كل مركباته مع عناصر المجموعة الثالثة لانه أعلى في السالبية الكهربائية منها و هو يساوي عدد الالكترونات التي تكتسبها من الفلزات أو المشتركة مع اللافلزات (المكمل لستة إلكترونات في المدار الأخير)

عدد تأكسد السيلكون = ٤+ و هي عدد الالكترونات (في المدار الأخير) التي يساهم بها عند تفاعله مع ذرات الاكسجين حيث أنه السيلكون أقل سالبية من الاكسجين

عدد تأكسد الفوسفور = ٥+ و هي عدد الالكترونات (في المدار الأخير) التي يساهم بها عند تفاعله مع ذرات الاكسجين حيث أنه السيلكون أقل سالبية من الاكسجين

عدد تأكسد الكبريت = ٦+ و هي عدد الالكترونات (في المدار الأخير) التي يساهم بها عند تفاعله مع ذرات الاكسجين حيث أنه السيلكون أقل سالبية من الاكسجين

عدد تأكسد الكلور = ٧+ و هي عدد الالكترونات (في المدار الأخير) التي يساهم بها عندما يكون متحدا مع ذرات الاكسجين حيث أنه الكلور أقل سالبية من الاكسجين

عند الانتقال عبر الدورة الواحدة من اليسار إلى اليمين، يزداد الحد الأقصى لعدد التأكسد الممكن لكل عنصر

Ar	*Cl	S		P	Si	Al	Mg	Na	عناصر الدورة الثالثة
---	Cl ₂ O ₇	SO ₃	SO ₂	P ₄ O ₁₀	SiO ₂	Al ₂ O ₃	MgO	Na ₂ O	الصيغة الكيميائية للأكسيد
---	+7	+6	+4	+5	+4	+3	+2	+1	عدد التأكسد

تأثير الماء على أكاسيد وهيدروكسيدات عناصر الدورة الثالثة

تتفاعل أكاسيد الصوديوم والمغنيسيوم مع الماء لتكوين أيونات الهيدروكسيد -OH وتحدد كمية هذه الأيونات الناتجة درجة قلوية المحاليل





محلول قلوي قوي، رقمه الهيدروجيني يساوي نحو ١٢ إلى ١٤




محلول قلوي ضعيف، رقمه الهيدروجيني يساوي نحو ١٠ إلى ١١

هيدروكسيد الصوديوم محلول قاعدي أقوى من محلول هيدروكسيد المغنيسيوم بالتالي يمتلك pH أكبر لانه هيدروكسيد الصوديوم يذوب بصورة أكبر من هيدروكسيد المغنيسيوم بالتالي ينتج اويونات -OH أكثر

يسلك أكسيد الصوديوم كقاعدة قوية




ويستخدم كل من أكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد المغنيسيوم في أدوية علاج عسر الهضم وتعمل هذه المركبات القاعدية الصلبة على معادلة الحمض الفائض في المعدة، وبالتالي على تخفيف الألم الناتج من حموضة المعدة، ويتم ذلك وفق المعادلتين الآتيتين:



أكسيد الألومنيوم فلا يتفاعل مع الماء ولا يذوب فيه، ولهذا السبب تعمل طبقة الأكسيد على حماية فلز الألومنيوم من التآكل لذلك يستخدم الألومنيوم في صنع النوافذ.

يتفاعل أكسيد الألومنيوم مع الأحماض




تفاعل أكسيد الألومنيوم مع مادة قلوية ساخنة ومركزة



- أكاسيد الفلزات تسلك سلوك القواعد ما عدا أكاسيد الألومنيوم (مادة متذبذبة)
- لا يذوب ثنائي أكسيد السيليكون في الماء. فلا يستطيع الماء تكسير بنيته الجزيئية الضخمة. ومع ذلك، فإنه يتفاعل مع مادة قلوية ساخنة ومركزة، ويذوب فيها وفق المعادلة الآتية:
- $\text{SiO}_2(\text{s}) + 2\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Na}_2\text{SiO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- ويسلك ثنائي أكسيد السيليكون كحمض عندما يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، مكوناً ملحاً (سيليكات الصوديوم) وماء. ولكنه لا يتفاعل مع الأحماض
- يتفاعل أكسيد الفوسفور (V) P_4O_{10} بشدة مع الماء، ويذوب فيه مكوناً محلولاً حمضياً من حمض الفوسفوريك قيمة pH تساوي تقريباً 2



وكذلك يسلك كحمض حيث إنه يقوم بمعادلة القواعد




- يتفاعل أكسيدا الكبريت (SO_2) و (SO_3) مع الماء ويذوبان فيه، فينتج من ذلك محاليل حمضية قيمة pH تقريباً ١
- حمض الكبريتيك (IV) $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq})$
- حمض الكبريتيك (VI) $\text{SO}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$

وتسلك أكاسيد الكبريت كأحماض



أكاسيد عناصر الدورة الثالثة	Na_2O	MgO	Al_2O_3	SiO_2	P_4O_{10}	SO_2 و SO_3
السلوك (الحمضي/القاعدي)	قاعدي	قاعدي	متعدد	حمضي	حمضي	حمضي

الجدول ٦-٨ السلوك الحمضي أو القاعدي لبعض أكاسيد عناصر الدورة الثالثة.



الشكل ٦-٧ ملخص تأثير الماء على أكاسيد وهيدروكسيدات عناصر الدورة الثالثة

تأثير السالبية الكهربائية على الترابط والسلوك الحمضي أو القاعدي لأكاسيد عناصر الدورة الثالثة
تبلغ السالبية الكهربائية للاكسجين 3.5

عناصر الدورة الثالثة	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
السالبية الكهربائية	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	--

- بسبب الفرق في السالبية الكهربائية بين الأكسجين و (الصوديوم و الماغنسيوم) عالي تتكون مركبات أيونية فتنتقل الإلكترونات من ذرات الصوديوم و الماغنسيوم مكونة أيونات تحمل شحنة موجبة إلى ذرات الأكسجين مكونة أيونات O^{2-}

وتسلك أيونات الأكسيد كقواعد عن طريق استقبال أيونات H^+ من جزيئات الماء



- بينما الفرق في السالبية الكهربائية بين (الفوسفور و الكبريت) و الأكسجين منخفض فإن هذه اللافلزات ترتبط مع الأكسجين تساهمياً

تذوب أكاسيد الكبريت اللافلزية المرتبطة تساهمياً في الماء وتتفاعل معه لتكوين محاليل حمضية حيث تمنح جزيئات الحمض المتكونة أيونات H^+ لجزيئات الماء، وتسلك كأحماض.




يذوب أكسيد الفوسفور (V) اللافلزي المرتبطة تساهميًا في الماء ويتفاعل معه لتكوين محاليل حمضية حيث تمنح جزيئات الحمض المتكونة أيونات H^+ لجزيئات الماء، وتسلّك كأحماض.



- الرابطة الكيميائية الموجودة في أكسيد الألومنيوم ليست أيونية نقية، ولا تساهمية نقية. أي أنه يكون متذبذبًا أي يظهر سلوكًا حمضيًا وقاعديًا لكنه لا يذوب في الماء

يتفاعل أكسيد الألومنيوم مع الأحماض




تفاعل أكسيد الألومنيوم مع مادة قلوية ساخنة ومركزة



- حسب الفرق في السالبية بين الأكسجين و السيلكون فإن أكسيد السيلكون مركب تساهمي لكنه ضخم بالتالي لا يذوب في الماء و يظهر طبيعته الحمضية بتفاعله مع القواعد



أكاسيد عناصر الدورة الثالثة	Na_2O	MgO	Al_2O_3	SiO_2	P_4O_{10}	SO_2 و SO_3
السلوك (الحمضي/القاعدي)	قاعدي	قاعدي	متعدد	حمضي	حمضي	حمضي



سؤال



- ٤ أ. يقع عنصر الجيرمانيوم (Ge) في المجموعة 14 (IV)، والدورة الرابعة. ويُصنّف كشبه فلز، كالسيليكون الموجود في الدورة الثالثة.
١. تتبأ بنوع الرابطة الكيميائية في عنصر الجيرمانيوم (Ge) وبنيته.
 ٢. يمتلك أكسيد الجيرمانيوم (IV) خصائص مشابهة لثنائي أكسيد السيليكون (SiO_2). فهو أكسيد حمضي. اكتب المعادلة الكيميائية الرمزية، متضمنة رموز الحالة الفيزيائية، لتوضيح تفاعل أكسيد الجيرمانيوم (GeO_2) مع محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) الساخن والمركز.
 ٣. ماذا تتوقع أن يحدث إذا أُضيف أكسيد الجيرمانيوم (IV) إلى حمض الهيدروكلوريك تركيزه 2.0 mol/L ؟
- ب. يُعدّ أكسيد البوتاسيوم (K_2O) أكسيداً قاعدياً. فهو يتفاعل مع الماء ويزوب فيه، مكوناً محلولاً قلويّاً.
١. اكتب المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة، متضمنة رموز الحالة الفيزيائية، لتوضيح تفاعل أكسيد البوتاسيوم مع الماء.
 ٢. اكتب المعادلة الكيميائية الرمزية الموزونة، متضمنة رموز الحالة الفيزيائية، لتوضيح تفاعل أكسيد البوتاسيوم مع حمض النيتريك المخفف.
 ٣. تتبأ بنوع الرابطة الكيميائية في أكسيد البوتاسيوم وبنيته.

٦-٤. كلوريدات عناصر الدورة الثالثة


عناصر الدورة الثالثة	Na	Mg	Al	Si	*P	*S	Cl	Ar
الصيغة الكيميائية للكلوريد	NaCl	MgCl_2	Al_2Cl_6	SiCl_4	PCl_5	SCl_6	---	---
عدد التأكسد لعنصر الدورة الثالثة	+1	+2	+3	+4	+5	+6	---	---

تأثير الماء على كلوريدات عناصر الدورة الثالثة

لا تتفاعل كلوريدات الايونية للصوديوم NaCl و الماغنسيوم MgCl_2 مع الماء بل تنجذب جزيئات الماء القطبية إلى الايونات الامر الذي يؤدي لإذابة الكلوريدات وعن طريق كسر التركيب الايوني الضخم و ينتج ايونات الفلز الموجبة و أيونات الكلور السالبة محاطة بجزيئات الماء



تنتج محاليل متعادلة



- صيغة كلوريد الألومنيوم AlCl_3 ولكن، في غياب الماء تكون صيغة كلوريد الألومنيوم هي Al_2Cl_6 الذي يمكن اعتباره كجزي ثنائي هو جزيء مرتبط تساهمياً


بمجرد إضافة الماء، تنحل الجزيئات الثنائية لكوريد الألومنيوم مائياً وتنتشر أيونات الألومنيوم وأيونات الكلوريد على النحو الآتي



يتكوّن الأيون المائي المميّه (المحاط بجزيئات الماء) في شكل أيون معقد $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ حيث تكون جزيئات الماء روابط تساهمية تناسقية مع الأيون Al^{3+} فيتميه كل أيون Al^{3+} صغير الحجم نسبياً وذو شحنة كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان H^{+} من أحد جزيئات الماء المرتبطة بأيون الألومنيوم، ما يجعل المحلول حمضياً




وهذا ما يفسر أن محاليل كلوريد الألومنيوم حمضية



- ولأن أيون الماغنيسيوم أكبر حجماً وأقل شحنة مقارنة بالأيون Al^{3+} لذا تتفكك أيونات الهيدرات جزئياً مطلقة كمية محدودة من أيونات H^{+}



وهذا ما يفسر أن محاليل كلوريد الماغنيسيوم قليلة الحمضية



و تتحلل كلوريدات SiCl_4 و PCl_5 في الماء مطلقة أبخرة بيضاء من HCl



يظهر (SiO_2) على هيئة راسب أبيض مصفر. ويذوب جزء من غاز كلوريد الهيدروجين الناتج في الماء، مكوّناً محلولاً حمضياً (حمض الهيدروكلوريك).

و يتحلل كلوريد الفوسفور أيضاً عند إضافته إلى الماء



وتذوب كلا المادتين الناتجتين (حمض الهيدروكلوريك وحمض الفوسفوريك) في الماء، فيتكوّن محلول حمضي

الصيغة الكيميائية للكلوريد	NaCl	MgCl ₂	Al ₂ Cl ₆	SiCl ₄	PCl ₅	SCl ₂
نوع الرابطة الكيميائية	أيونية	أيونية	تساهمية	تساهمية	تساهمية	تساهمية
التركيب	أيوني ضخم	أيوني ضخم	جزيئي بسيط	جزيئي بسيط	جزيئي بسيط	جزيئي بسيط
ملاحظات عند إضافتها إلى الماء	تذوب المواد الصلبة البيضاء مكوّنة محاليل عديمة اللون		تتفاعل الكلوريدات مع الماء، مطلقة أبخرة بيضاء من غاز كلوريد الهيدروجين			
pH للمحلول المتكوّن مع الماء	7.0	6.5	3.0	2.0	2.0	2.0

سؤال

٥ أي من العبارات الآتية صحيحة تماماً؟

- أ. يتفاعل أكسيد الألومنيوم (Al_2O_3) مع الماء لتكوين محلول قيمة pH له تساوي 13 إلى 14.
- ب. يذوب كلوريد الصوديوم (NaCl) في الماء لتكوين محلول قيمة pH له تساوي 2.
- ج. يتفاعل خماسي كلوريد الفوسفور (PCl_5) مع الماء لتكوين محلول قيمة pH له تساوي 1 إلى 2.
- د. يتفاعل الماغنيسيوم مع الماء البارد لتكوين محلول قيمة pH له تساوي 13 إلى 14.

نوع العنصر	فلز	شبه فلز	لافلز
المجموعات	المجموعتان (I) و 2 (II)	المجموعة (IV) (14)	المجموعات (V) (15)، (VI) (16)، و (VII) (17)
الروابط الكيميائية للعناصر	فلزية	غالبًا تساهمية	تساهمية
التركييب في العناصر	فلزية ضخمة	تساهمية ضخمة	جزيئية بسيطة
الخصائص الفيزيائية النموذجية للعناصر	• موصلة جيدة للكهرباء	• غير موصلة للكهرباء (إلا أن بعضها موصّل كالجرافيت والسيليكون)	• غير موصلة للكهرباء
	• تمتلك غالبًا درجات انصهار مرتفعة (تكون منخفضة في المجموعة 1)	• درجات انصهار مرتفعة	• درجات انصهار منخفضة (وكذلك درجات الغليان)
	• لا تذوب في الماء ولكنها تتفاعل معه	• لا تذوب في الماء	• في غالب الأحيان لا تذوب في الماء، يمكن أن تكون شحيحة الذوبان في الماء
الروابط الكيميائية النموذجية في المركبات	عمومًا أيونية	ما بين التساهمية والأيونية	غالبًا تساهمية
التركييب النموذجية في المركبات	أيونية ضخمة	غالبًا ما تكون تراكييب ضخمة ولكن تراكييب بعضها تكون جزيئية بسيطة (على سبيل المثال CO_2)	جزيئية بسيطة
الخصائص النموذجية للأكاسيد	• تمتلك درجات انصهار مرتفعة	• تمتلك درجات انصهار مرتفعة، بعضها لا يمتلك هذه الدرجات (على سبيل المثال CO_2)	• تمتلك درجات انصهار منخفضة (وكذلك أيضًا درجات الغليان)
	• تذوب في الماء وتتفاعل معه	• لا تذوب في الماء (بعضها يذوب، CO_2 مثلاً)	• تذوب في الماء وتتفاعل معه
	• تكون محاليل قلوية، تمتلك خصائص قاعدية	• تكون إما متعادلة، أو حمضية ضعيفة/قلوية ضعيفة، أو متذبذبة (متذبذبة)	• تكون محاليل حمضية، تمتلك خصائص حمضية
الخصائص النموذجية للكلووريدات	• تمتلك درجات انصهار مرتفعة	• تمتلك بشكل عام درجات انصهار منخفضة	• تمتلك درجات انصهار وغليان منخفضة
	• تذوب في الماء	• تتفاعل مع الماء	• تتفاعل مع الماء (غالبًا بشدة)
	• تكون محاليل متعادلة (أو شبه متعادلة)	• تكون محاليل حمضية	• تكون محاليل حمضية قوية

سؤال

- ٦ أ. يكون كلوريد العنصر الافتراضي X، سائلاً عند درجة الحرارة 20°C ويتفاعل هذا الكلوريد مع الماء، مطلقاً أبخرة بيضاء، ومكوّناً محلولاً حمضياً.
١. هل ينتمي العنصر X إلى المجموعة 1 أم المجموعة 2 أم المجموعة 15 (V) في الجدول الدوري؟
٢. سم نوع الأبخرة البيضاء الناتجة من تفاعل العنصر X مع الماء.
- ب. يكون كلوريد العنصر الافتراضي Y، صلباً عند درجة الحرارة 20°C . لا يتفاعل هذا الكلوريد مع الماء، ولكنه يذوب فيه ليكون محلولاً متعادلاً. هل ينتمي العنصر Y إلى المجموعة 1 أم المجموعة 14 (IV) أم المجموعة 16 (VI) في الجدول الدوري؟