الاختبار القصير الثاني مع نموذج الإجابة





تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

موقع فايلاتي ⇦ المناهج العمانية ⇦ ⇦ كيمياء ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة ⇦ الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 2026-11-03 19:31:16

المزيد من مادة كيمياء:	ملفات ا كتب للمعلم ا كتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي ا للمدرس
	إعداد: مدرسة مسيرة الخير للتعليم الأساسي

التواصل الاجتماعي بحسب

صفحة المناهج العمانية على فيسبوك					

المزيد من الملفات بحسب والمادة كيمياء في الفصل الثاني

تحميل تطبيق المناهج للهواتف الذكية


تطبيق المناهج على Store App (آبل)	تطبيق المناهج على Play Google (أندرويد)

سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى مدرسة مسيرة الخير للتعليم الأساسي (١-١٢)	الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ م المـادة: كيمياء الصف: التاسع الـزمـن: ٢٠ دقيقة التاريخ: ..... اسم الطالب:	مدرسة مسيرة الخير للتعليم الأساسي الدرجة: ـــــ / ١٠


الاختبار القصير الثاني

١- ترتيب التفاعلات (ل، ص ، ع، ك) من حيث معدل سرعة التفاعل اعتماداً على العوامل الموجودة بالتجربة هو: (١)


ل




ص



ع




ك



(ظلل الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة)

○ ل > ص > ك > ع ○ ك > ل > ع > ص ○ ص > ل > ع > ك ○ ك > ص > ل > ع

٢- ادرس الشكل المقابل ثم أجب عن المفردات أسفله: (١)



(أ)- (أكمل): العوامل التي يمكن تغييرها في الشكل المقابل للتأثير في زيادة معدل سرعة تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع الماغنيسيوم هي:

١- زيادة تركيز حمض الهيدروكلوريك.


٢- .....

(ب)- ضع علامة (√) أمام العبارة حسب ما يناسبها بالجدول التالي: (٢)

العبارة	صح	خطأ
١- في الشكل السابق تزداد كتلة الماغنيسيوم عند زيادة تركيز حمض الهيدروكلوريك المخفف.		
٢- في الشكل السابق يزداد تصاعد غاز الهيدروجين في زمن قصير بإضافة الماغنيسيوم على هيئة بودرة أو مسحوق بدلاً من إضافته على هيئة برادة.		
٣- في الشكل السابق تزداد كمية الهيدروجين في نهاية التفاعل عن الطبيعي عند زيادة درجة الحرارة عن ٢٥° سليزيوس.		

٣- قام أحمد بإجراء تجربة تفكك المادة (B) إلى ماء وأكسجين، فوضع (١٠ جم) من المادة (A) كعامل حفاز فزاد معدل تصاعد الغاز في المحقن، وبالتالي فإن كل التالي صحيح عدا:

١



(ظلل الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة)

- توفر المادة (A) مساحة سطحية تتفاعل عليها جُزيئات المادة (B).
- تزيد المادة (A) من تركيز المتفاعلات وبالتالي من سرعة التفاعل.
- كتلة المادة (A) في نهاية التفاعل (١٠ جم).
- المادة (A) لا تتحول إلى نواتج في نهاية التفاعل.

٤- في التفاعل بين الحمض المخفف والخارصين تم التأثير على التفاعل بواسطة العوامل التالية، ادرسها جيداً ثم أجب:

العامل (س)	العامل (ص)	العامل (ع)
عامل يعني وجوده المزيد من جسيمات المادة المتفاعلة في حجم معين فتصبح التصادمات أكثر تكرارا وبالتالي حدوث التفاعل.	عامل يعني وجوده المزيد من جسيمات المادة المعرضة للتفاعل على السطح، فتحدث التصادمات بينها بوتيرة أكبر، وبالتالي سرعة حدوث التفاعل.	عامل يعني وجوده امتلاك المزيد من الطاقة، وبالتالي ينتج عنه تفكيك للروابط الموجودة في جسيمات المتفاعلات وتشكيل روابط جديدة وبالتالي سرعة حدوث التفاعل

(أ)- صل بين الرمز من العمود (A) وما يناسبه من العوامل المؤثرة في معدل سرعة التفاعل في العمود (B):

العمود (A)	العمود (B)
العامل (س)	مساحة السطح المعرض للتفاعل
	العامل الحفاز
العامل (ع)	درجة حرارة التفاعل
	طبيعة المتفاعلات
العامل (ص)	تركيز المتفاعلات

٢

(ب)- يوضح الرسم البياني المقابل العلاقة الصحيحة بين العامل (ع) وزمن حدوث التفاعل:


١

(ظلل الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة مع ذكر السبب)

- **صح**
- **خطأ**

السبب: .....

.....



(ج)- أذكر رمز العامل الذي يسبب التالي:

٢

١- زيادة اشتعال الحرائق وزيادة الانفجارات المصاحبة لها عند زيادة غبار الدقيق في مصانع الدقيق (.....)

٢- سرعة ذوبان مسحوق فوار كتلته (١٠ جم) في كوب الماء الدافيء عن كوب الماء البارد (.....)

*** نهاية الاختبار القصير الثاني***



المديرية العامة للتربية والتعليم بالوسطى

مدرسة مسيرة الخير للتعليم الأساسى

نموذج إجابة الاختبار القصير الثاني

العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م

مادة: الكيمياء

الصف: التاسع

رقم المفردة	رقم الجزئية	الإجابة الصحيحة	الدرجة	رمز الهدف	مستوى التعلم
١	—	**ك > ل > ع > ص**	درجة واحدة	٣-١١	**استدلال**
٢	أ	٢- زيادة درجة الحرارة عن ٢٥°م . ٣- أو وضع الماغنيسيوم على هيئة بودرة (مسحوق). ٢- أو إضافة عامل حفاز.	درجة واحدة	٣-١١	**معرفة**
	ب	١- خطأ ٢- صح ٣- خطأ	- درجتان في حالة صحة إجابة الثلاث. - درجة واحدة في حالة صحة الإجابة علي اثنين. - صفر في حالة صحة إجابة واحده أو خطأ الثلاثة.	٣-١١	**تطبيق**
٣	—	تزيد المادة (A) من تركيز المتفاعلات وبالتالي من سرعة التفاعل.	درجة واحدة	٣-١١	**معرفة**
٤	أ	العامل (س) تركيز المتفاعلات العامل (ع) درجة الحرارة العامل (ص) مساحة السطح المعرض للتفاعل	- درجتان في حالة صحة إجابة الثلاث. - درجة واحدة في حالة صحة الإجابة علي اثنين. - صفر في حالة صحة إجابة واحده أو خطأ الثلاث.	٥-١١	**تطبيق**
	ب	- خطأ - لأن العامل (ع) هو درجة الحرارة وكلما زادت درجة حرارة التفاعل قل الزمن اللازم لحدوث التفاعل فالعلاقة بينهما عكسية وليست طردية	درجة واحدة	٥-١١	**استدلال**
	ج	١- (ص) ٢- (ع)	- (درجتان) لكل نقطة منهما درجة منفصلة عن الأخرى	٤-١١	**معرفة**
المجموع			**١٠ درجات**		