

## أوراق عمل مدرسة عمرو بن العاص نهاية الفصل غير مجابة



### تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

موقع المناهج ← المناهج القطرية ← الصف الحادي عشر العلمي ← رياضيات ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 22:30:06 2025-12-13

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات | حلول | عروض بوربوينت | أوراق عمل  
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة  
رياضيات:

إعداد: مدرسة عمرو بن العاص

### التواصل الاجتماعي بحسب الصف الحادي عشر العلمي



صفحة المناهج  
القطرية على  
فيسبوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية

التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

### المزيد من الملفات بحسب الصف الحادي عشر العلمي والمادة رياضيات في الفصل الأول

أوراق عمل نهاية الفصل غير مجابة للاستاذ رجب

1

أوراق عمل اثرائية نهاية الفصل مع الإجابة النموذجية

2

أوراق عمل الوحدة الثالثة مع الإجابة النموذجية

3

أوراق عمل مؤمن نهاية الفصل مع الإجابة النموذجية

4


أوراق عمل الفرقان نهاية الفصل غير مجابة

5

# تدريبات إثرائية

## نهاية الفصل الدراسي الأول - منهاج الجزء الثاني

اسم الطالب: .....



ملحوظة مهمة: هذه الأسئلة إثرائية ولا تغني عن الكتاب المدرسي وهو المصدر الرئيس للتعلم

(1) حدد ما إذا كانت الدوال التالية كثيرات حدود أم لا. وإذا كانت كثيرة حدود فاكتب درجتها والمعامل الرئيس.

المعامل الرئيس	درجة كثيرة الحدود	
		$h(x) = x^4 - 2x^3 + 5x - 1$
		$f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 3$
		$p(x) = 6x^2 + 7x^5 + 2$
		$k(x) = x^2 - 2x^4 + 5x - 1$
		$g(x) = 2x^4 - 3x^{-2}$

(2) أوجد

$f(x) - g(x)$	$f(x) + g(x)$	
		$f(x) = 6x^3 + 7x^2 + 7$ $g(x) = 2x^3 + 5x^2 + 3$
		$f(x) = 7x^2 + 7x + 5$ $g(x) = 4x^2 - 5x + 3$

(3) أوجد الناتج وحدد درجته

$f(x) \times g(x)$	
	$f(x) = 2x^2 + 1$ $g(x) = x^3 + 5x^2 - 2$
	$f(x) = 2x^5 - 1$ $g(x) = x^3 + 4x^2 - 3$

$$f(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x)$$

$$\frac{f(x)}{d(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{d(x)}$$

(4) أوجد ناتج القسمة باستعمال القسمة المطولة واكتب الناتج في صورة كثيرات الحدود.

$$\frac{f(x)}{d(x)}$$

$$f(x) = x^2 - 7x - 11$$

$$d(x) = x + 2$$

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$$

$$d(x) = x - 1$$

(5) حدد ناتج القسمة والباقي واكتب الناتج في صورة كثيرات الحدود أو الصورة الكسرية.

$$\begin{array}{r}
 x^3 + x^2 - 6x - 3 \\
 x - 1 \overline{) x^4 + 0x^3 - 7x^2 + 3x + 3} \\
 \underline{-} \phantom{x^4} \\
 x^4 - x^3 \\
 \hline
 x^3 - 7x^2 + 3x + 3 \\
 \underline{-} \phantom{x^4} \\
 x^3 - x^2 \\
 \hline
 -6x^2 + 3x + 3 \\
 \underline{-} \phantom{x^4} \\
 -6x^2 + 6x \\
 \hline
 3 - 3x \\
 \underline{-} \phantom{x^4} \\
 3 - 3x \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 2x + 3 \\
 x - 5 \overline{) x^3 - 3x^2 - 7x - 5} \\
 \underline{-} \phantom{x^3} \\
 x^3 - 5x^2 \\
 \hline
 2x^2 - 7x - 5 \\
 \underline{-} \phantom{x^3} \\
 2x^2 - 10x \\
 \hline
 3x - 5 \\
 \underline{-} \phantom{x^3} \\
 3x - 15 \\
 \hline
 10
 \end{array}$$

(6) اقسام مستخدما القسمة التركيبية واكتب الناتج في الصورة الكسرية.

$$\frac{x^3 + 2x^2 - x - 2}{x + 1}$$

$$\frac{6x^3 - 19x^2 - 73x + 90}{x - 5}$$

$$\frac{x^3 + 2x^2 - 9x + 2}{x - 2}$$

$$\frac{2x^3 - x^2 - 4x + 3}{x - 1}$$

قسمة

$$f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$$

على

$$d(x) = x - 1$$

(1) صف التحويل الذي يحول التمثيل البياني للدالة ذات الحد الواحد  $f(x) = a_n x^n$  إلى التمثيل البياني للدالة  $g(x)$  كثيرة الحدود المعطاة.

التحويل	$g(x)$	$f(x) = a_n x^n$
	$g(x) = 4x^3 + 5$	$f(x) = 4x^3$
	$g(x) = 2(x - 1)^5$	$f(x) = 2x^5$
	$g(x) = 8(x + 3)^7 - 6$	$f(x) = 8x^7$





(2) صف السلوك الطرفي للدالة كثيرة الحدود  $f(x)$ .

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$	$f(x) = 6x^4 - 19x^2 - 73x + 90$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$	$f(x) = x^2 - 7x - 11$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$	$f(x) = x^3 + x^2 - 5x - 6$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$	$f(x) = -5x^3 + x^2 - 5x - 6$


(3) حدد أصفار الدالة كثيرة الحدود وتعدديتهم وحدد ما إذا كان التمثيل البياني يقطع المحور  $x$  أم يمسه عند صفر الدالة.

يمس/يقطع	التعددية	أصفار الدالة	
			$f(x) = (x - 1)^2(x + 3)^2$
			$f(x) = (x - 4)^3(x + 3)^4$
			$f(x) = (x - 5)(x + 2)^6$
			$f(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 4)$

(4) ارسم تمثيلا بيانيا للحوال التالية باستعمال أصفارها.

	$f(x) = (x - 1)^2(x + 3)^2$ <table border="1" data-bbox="884 450 1474 568"> <tr> <td><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =</math></td><td><math>\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =</math></td></tr> </table>	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$		
	$f(x) = (x - 4)^3(x + 3)^4$ <table border="1" data-bbox="892 952 1482 1070"> <tr> <td><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =</math></td><td><math>\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =</math></td></tr> </table>	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$		
	$f(x) = (x - 5)(x + 2)^6$ <table border="1" data-bbox="884 1417 1474 1536"> <tr> <td><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =</math></td><td><math>\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =</math></td></tr> </table>	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$		
	$f(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 4)$ <table border="1" data-bbox="874 1836 1465 1955"> <tr> <td><math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =</math></td><td><math>\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =</math></td></tr> </table>	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =$	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$		


(5) أوجد المقطع  $y$  ارسم منحنى الدالة مستعينا بأصفار الدالة وتعدديتها والمعلومات المصاحبة.



$$f(x) = (x - 1)^2(x + 3)$$

= المقطع  $y$

للدالة قيمة عظمى عند  $(-1.667, 9.48)$



$$f(x) = (x - 4)(x - 1)^4$$


= المقطع  $y$

للدالة قيمة صغرى عند  $(3.4, -19.9)$



(6) ارسم منحنى الدالة مستعينا بالوصف المصاحب.

- الدالة  $f(x)$  ذات قيم موجبة في الفترة  $]-\infty, -4[$  وفي  $]1, 4[$ .
- الدالة  $f(x)$  ذات قيم سالبة في الفترة  $]-4, -1[$  وفي  $]4, \infty[$ .
- الدالة  $f(x)$  متناقصة في الفترة  $]-\infty, -2.67[$  وفي  $]2, \infty[$ .
- الدالة  $f(x)$  متزايدة في الفترة  $[-2.67, 2]$ .



1- أوجد الباقي في كل ما يلي:	
	قسمة $h(x) = x^3 + x^2 - 5x - 6$ على $x - 2$
	قسمة $h(x) = x^3 + x^2 - 5x - 6$ على $x - 1$
	قسمة $h(x) = 4x^3 + 5x^2 - 10x + 1$ على $x - 1$
	قسمة $h(x) = x^4 + x^2 - 2$ على $x + 1$

2- استعمل نظرية العامل لتحديد ما إذا كانت ثنائية الحدود المعطاة عاملاً لكثيرة الحدود $P(x)$	
	$x - 2$ عامل لـ $P(x) = x^3 - x^2 - x - 2$
	$x - 1$ عامل لـ $P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$
	$x - 1$ عامل لـ $P(x) = 4x^3 + 5x^2 - 10x + 1$
	$x - 2$ عامل لـ $P(x) = x^4 + x^2 - 2$

3- أوجد المطلوب في كل ما يلي.	
	<p>قيمة <math>k</math> إذا كان باقي قسمة <math>P(x) = x^4 - 3kx^2 + kx + 2</math> على <math>(x - 1)</math> يساوي <math>-4</math></p>
	<p>قيمة <math>k</math> إذا كان باقي قسمة <math>P(x) = x^3 + kx^2 - kx + 5</math> على <math>(x - 2)</math> يساوي <math>3</math></p>
	<p>قيمة <math>k</math> إذا كان باقي قسمة <math>P(x) = x^3 + (k + 2)x - 3</math> على <math>(x - 3)</math> يساوي <math>0</math></p>

4- استعمل نظرية الأصفار النسبية لتكتب جميع الأصفار النسبية الممكنة لـ $P(x)$	
	$P(x) = x^4 - 2x^2 - 2$
	$P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$
	$P(x) = 2x^4 - 5x^2 - 9x + 6$


5- استعمل نظرية الأصفار النسبية لتحديد أصفار  $P(x)$ .

$$P(x) = x^4 - 2x^2 - 2$$

$$P(x) = x^3 - 3x^2 - x + 3$$

6- تقوم شركة بتصنيع مصابيح، الربح  $p$  بآلاف الريالات المحققة هو دالة لعدد المصابيح المباعة  $x$  بعشرات الآلاف.


ننمذج الدالة في الشكل  $p(x) = -x^3 + 9x^2 - 11x - 21$  مقدار الربح.



ما عدد المصابيح المصنعة والذي يسمح للشركة بتحقيق ربح؟


(1) مثل الدوال التالية بيانياً. أوجد المجال والمدى لكل منها:

$$f(x) = \sqrt{x}$$





$f(x) = \sqrt{x}$	
	المجال
	المدى

$$g(x) = \sqrt{x - 2}$$




$g(x) = \sqrt{x - 2}$	
	المجال
	المدى


$$g(x) = 2\sqrt{x}$$




$g(x) = 2\sqrt{x}$	
	المجال
	المدى

(2) أعد كتابة الدالة الجذرية لمعرفة التحويلات التي أجريت على الدالة الرئيسة  $f(x) = \sqrt{x}$ . ثم مثلها بيانياً.


$$f(x) = \sqrt{4x + 8}$$



التحويلات التي حوّلت التمثيل البياني للدالة  $f(x) = \sqrt{x}$  إلى التمثيل البياني للدالة  $g(x)$

..... -1

..... -2



$$g(x) = \sqrt{16x - 16}$$

التحويلات التي حوّلت التمثيل البياني للدالة  $f(x) = \sqrt{x}$  إلى التمثيل البياني للدالة  $g(x)$

..... -1

..... -2

(3)

تُحسب سرعة المركب الشراعي  $y$ ، بالعقدة البحرية، باستعمال

المعادلة  $y = 1.34 \sqrt{x}$ ، حيث  $x$  طول المركب عند مستوى

سطح الماء، بالأقدام. تؤجر شركة  
مراكب شراعية أطوالها عند مستوى  
سطح الماء من 25 إلى 64 قدماً.



. أوجد سرعتين الدنيا والقصوى  
لمراكب هذه الشركة.

	السرعة الدنيا
	السرعة القصوى

(4)

$$d(h) \approx 1.22 \sqrt{h}$$



ينظر راكب المنطاد من ارتفاع 54 قدماً فوق مستوى سطح البحر.  
أوجد المسافة التي تفصل راكب المنطاد عن خط الأفق.

	المسافة الفاصلة
--	-----------------

(5) حل كل من المعادلات التالية:

$$\sqrt{5x - 4} = 4$$


$$\sqrt{4x + 8} = 6$$

$$x = \sqrt{7x + 8}$$

$$\sqrt{x + 1} = 3$$


1- مثل الدوال التالية بيانياً. أوجد المجال والمدى لكل منها:

$$f(x) = |x|$$




$f(x) =  x $	
	المجال
	المدى

$$g(x) = |x - 2|$$



$g(x) =  x - 2 $	
	المجال
	المدى

$$g(x) = |x + 2| + 1$$




$g(x) =  x + 2  + 1$	
	المجال
	المدى



2- مثل الدوال التالية بيانياً. أوجد المجال والمدى لكل منها:

$$f(x) = |x - 4| - 1$$




$$f(x) = |x - 4| - 1$$

المجال

المدى

$$g(x) = 2|x|$$




$$g(x) = 2|x|$$

المجال

المدى

$$g(x) = 2|x - 3|$$



$$g(x) = 2|x - 3|$$

المجال

المدى

## 3- حل المعادلات التالية:

$$2|x - 8| = 20$$

$$|x + 4| = 10$$


$$|x - 5| = 20$$

$$|x - 3| = 2$$

$$2|x \mp 5| + 4 = 10$$

## 4- حل المسائل الحياتية التالية:

تبلغ سرعة قارب خالد 25 km/h، وينوي أن يجتاز بهذه السرعة المسافة المبينة في الشكل أدناه.




A. ما المعادلة التي تتمذج عدد الساعات  $x$  التي سيمضيها خالد في قاربه ليكون على بعد 10 km من نقطة الـ 80 km؟

B. ما العدد الأدنى والعدد الأقصى من الساعات التي سيمضيها خالد في قاربه؟

## 5- حل المسائل الحياتية التالية:


في كل مما يلي، اكتب وحل معادلة قيمة مطلقة تعبر عن الزمن الأطول والزمن الأقصر لجسم يتحرك بسرعة معينة لاجتياز مسافة معينة (الشكل ليس وفق مقياس).

a. 5 km/h



$$-2.5 \text{ km} + 2.5 \text{ km}$$

b. 10 ft/s




$$-3 \text{ ft} + 3 \text{ ft}$$

- 1) تقدم شركة هواتف عرضاً شهرياً للهاتف الجوال بحسب دقائق المكالمات المحلية.
- إذا كانت دقائق المكالمات 400 دقيقة كحد أقصى، يكون العرض مقابل 100 ريال.
  - إذا زادت دقائق المكالمات عن 400 دقيقة يكون العرض مقابل 130 ريال.
- اكتب دالة متعددة التعريف لتمثيل  $C(x)$  تكلفة استهلاك  $x$  دقيقة من المكالمات في الشهر.

- 2) الدالة  $f$  معرّفة بالقاعدة  $-0.5x + 1$  للمجال  $x < 1$  وبالقاعدة  $x$  للمجال  $x \geq 1$ . اكتب الدالة المتعددة التعريف  $f$  باستعمال رمز الدالة.


- 3) إذا عمل كامل أكثر من 40 h في الأسبوع الواحد، يحصل عن كل ساعة إضافية على 1.5 أجره العادي بالساعة وهو QR 40، اكتب دالة متعددة التعريف تحدد أجر كامل الأسبوعي  $P$  بدلالة عدد الساعات  $h$  التي عملها. حدّد المبلغ الذي يحصل عليه كامل إذا عمل 45 h

## (4) مثل الدوال التالية بيانياً.




$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & -4 \leq x < -2 \\ 2 & -2 \leq x < 0 \\ 2 - x & 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$f(x)$	
	المجال
	المدى



$$f(x) = \begin{cases} 2 & -4 \leq x < -2 \\ x + 4 & -2 \leq x < 0 \\ 4 - x & 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$f(x)$	
	المجال
	المدى



$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq 2 \\ -x - 2 & x > 2 \end{cases}$$

$f(x)$	
	المجال
	المدى

(5) اكتب كل دالة قيمة مطلقة في صورة دالة متعددة التعريف.

$$f(x) = |3x + 1|$$

$$f(x) = |2x - 6|$$

$$f(x) = \frac{1}{2}|x|$$

$$f(x) = |-2x + 6|$$

(1) في تناسب عكسي بين المتغيرين  $x$  و  $y$  ،  $x = -8$  عندما  $y = -\frac{1}{4}$ .

اكتب معادلة التناسب العكسي.  
الإجابة: \_\_\_\_\_

احسب قيمة  $y$  عندما  $x = 4$   
الإجابة: \_\_\_\_\_

(2) في تناسب عكسي بين المتغيرين  $x$  و  $y$  ،  $x = 1$  عندما  $y = 5$ .

اكتب معادلة التناسب العكسي.  
الإجابة: \_\_\_\_\_

احسب قيمة  $y$  عندما  $x = 0.2$   
الإجابة: \_\_\_\_\_


(3) تتناسب كمية البنزين المتبقية في خزان سيارة عكسيا مع عدد الكيلومترات التي تقطعها هذه السيارة. وتبقى هذه العلاقة المتعكسية حتى ينتهي البنزين من خزان السيارة

كم لتر يتبقى في خزان السيارة إذا قطعت 225 كيلومتر




9 لتر متبقية بعد 135  
كيلومتر

## (6) مثل الدوال التالية بيانياً.




$$f(x) = \frac{1}{x}$$

	<u>المجال</u>
	<u>المدى</u>
	<u>خط التقارب الأفقي</u>
	<u>خط التقارب الرأسي</u>



$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

	<u>المجال</u>
	<u>المدى</u>
	<u>خط التقارب الأفقي</u>
	<u>خط التقارب الرأسي</u>




$$f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$$

	<u>المجال</u>
	<u>المدى</u>
	<u>خط التقارب الأفقي</u>
	<u>خط التقارب الرأسي</u>




(4) صف كيف يمكن الحصول على التمثيل البياني للدالة:  $f(x) = \frac{2x+7}{x+3}$  عن طريق تحويل التمثيل البياني للدالة النسبية  $g(x) = \frac{1}{x}$  ثم حدد خطوط التقارب الرأسية والأفقية.



	<u>المجال</u>
	<u>المدى</u>
	<u>خط التقارب الأفقي</u>
	<u>خط التقارب الرأسية</u>

(5) صف كيف يمكن الحصول على التمثيل البياني للدالة:  $f(x) = \frac{3x-2}{x-1}$  عن طريق تحويل التمثيل البياني للدالة النسبية  $g(x) = \frac{1}{x}$  ثم حدد خطوط التقارب الرأسية والأفقية.



	<u>المجال</u>
	<u>المدى</u>
	<u>خط التقارب الأفقي</u>
	<u>خط التقارب الرأسية</u>

(6) مثل الدالة  $f(x) = \frac{2x-3}{4x+6}$  بيانياً.

	<u>المجال</u>
	<u>المدى</u>
	<u>خط التقارب الأفقى</u>
	<u>خط التقارب الرأسى</u>

