الملزمة الشاملة لدروس الفصل الأول شوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية نظام المسارات





تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

موقع المناهج ← المناهج السعودية ← الصف الثاني الثانوي ← علوم ← الفصل الأول ← أوراق عمل ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 24-99-2025 47 06:29:47

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب ا اختبارات الكترونية ا اختبارات ا حلول ا عروض بوربوينت ا أوراق عمل منهج انجليزي ا ملخصات وتقارير ا مذكرات وبنوك ا الامتحان النهائي ا للمدرس

المزيد من مادة علوم:

التواصل الاجتماعي بحسب الصف الثاني الثانوي











صفحة المناهج السعودية على فيسببوك

الرياضيات

اللغة الانجليزية

اللغة العربية


التربية الاسلامية

المواد على تلغرام

المزيد من الملفات بحسب الصف الثاني الثانوي والمادة علوم في الفصل الأول				
الملزمة الشاملة لدروس الفصل الأول شوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية نظام المسارات				
أفضل ملخص أحياء 2 جديد 1447ه	2			
أوراق عمل أحياء 2 شاملة لدروس الفصل الأول 1447ه	3			
كراسة أحياء 2 الشاملة لمقرر 1447ه مع تقارير التجارب العملية	4			
مشروع أحياء بحث البرمائيات	5			

الأحياء 1-2

السنة الثانية التعليم الثانوي – نظام المسارات



اسم الطالبــ/ـــة: _______ الشعبة: _____

ملزمة شاملة للمقرر، تحوي ملخص متكامل بالإضافة إلى مراجعات الدروس وأوراق العمل.

ثانوية: ______العام الحراسي: _____

المحتويات

l• ← ſ	شوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية Echinoderms and invertebrate chordates	الفصل الأول
	Echinodel his and invertebrate chordates	
	الأسماك والبرمائيات	
[] ← []	Fishes and Amphibians	الفصل الثاني
	الزواحف والطيور	*.II*II 1 II
[™] ← ΓΙ	Reptiles and Birds	الفصل الثالث
۳9 ← ۳۲	الثدييات 	الفصل الرابع
1 ←	Mammals	حب. المحت
	. 1-1 - 11	
£7 ← €∙	مقدمة في النباتات عددام معروبات النباتات	الفصل الخامس
	Introduction to plants	
	تركيب النبات ووظائف أجزائه	
V3 → 00	Plant Structure and Function	الفصل السادس
	التكاثر في النباتات الزهرية	الفصل السابع
70 ← 07	Reproduction in Flowering Plants	الفدس السابع
VE ← 11	تركيب الخلية ووظائفها	الفصل الثامن
VC ← II	Cell Structure & Functions	0.5.2.1
	2 .1:11 2 -11 11	
Λ ٦ ← V0	الطاقة الخلوية Collular Energy	الفصل التاسع
	Cellular Energy	

١

الفصل الأول

شوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية Echinoderms and invertebrate chordates



لشوكيات الجلد واللافقاريات الحبلية صفات تربطها مع الحبليات.

الدرس الأول: خصائص شوكيات الجلد



الكتاب صفحة 12




--- شوكيات الجلد حيوانات بحرية لها هيكل داخلي بأشواك وجهاز وعائي مائي وأقدام --- أنبوبية، ولأفرادها البالغة تناظر شعاعي.

شوكيات الجلد ثانوية الفم Echinoderms are Deuterostomes:

الرخويات والديدان الحلقية والمفصليات التي درستها في مقرر احياءا حيوانات **بدائية الفم**. بينما شوكيات الجلد حيوانات **ثانوية الفم**.

يتكون الفم في بدائية الفم من فتحة الجاسترولا، في حين يتكون الفم في ثانوية الفم من مكان آخر في الجاسترولا، كما في شوكيات الجلد والحبليات.

جميع شوكيات الجلـد **حيوانات بحرية**، وهي تضم 6000 نوع، منها نجم البحر وقنفذ البحر وخيار البحر ونجم البحر الهـش وزنابق البحر ونجم البحر الريشـي واللؤلئية البحرية.



⊕ ماذا قرأت؟

الحية السابقة.

سمّ خاصيتين توجد في شوكيات


الجلد ولا توجد في المخلوقات

تركيب الجسم Body structure

- لها **هیکل داخلی** یتکون من صفائح من کربونات الکالسیوم، وغالبا ما تتصل به أشواك.
 - يوجد على الجلد **لواقط قدمية** pedicellariae صغيرة تساعد على الإمساك بالغذاء، وعلى إزالة المواد الغريبة عن الجلد.
- جميع شوكيات الجلد لها تناظر شعاعي في مرحلة البلوغ، وتناظر جانبي في مرحلة اليرقة.

النظام الوعائى المائى

- هو نظام يتكون من أنابيب مغلقة مملوءة بسـائل، تعمل معًا لتمكّن الحيوان من الحركـة والحصول على الغذاء.
- يدخل الماء إلى الجهاز الوعائي المائي من خلال فتحة تسمى
 المصفاة madreporite، وينتقل عبر قناة حجرية إلى القناة الحلقية، ثم إلى
 قناة شعاعية قناة تتفرع إلى جميع الأذرع- لينتهي في القدم الأنبوبية.



- **الأقدام الأنبوبية** Feet tube أنابيب صغيرة وعضلية تمتلئ بالسائل، وتنتهي بممص يُستعمل في الحركة وجمع الغذاء والتنفس.
 - الحويصلات العضلية ampulla كيس عضلي ينقبض ليندفع الماء إلى القدم الأنبوبية فتتمدد.
 - يوجد في نهاية القدم الأنبوبية **ممصّ قرصيّ** يساعد على التصاق الحيوان بالسطوح.

التغذية والهضم

تستعمل شوكيات الجلد طرائق تغذ متنوعة:

- الزنابق البحرية ونجم البحر الريشى تمد أذرعها للإمساك بالغذاء.
 - تفترس نجوم البحر أنواعا كثيرة مـن الرخويات والمرجان.
- كثير من أنواع نجم البحر تستطيع قذف معدتها خارج الفم إلى الفريسة، ثـم تفرز إنزيمات لهضم الغذاء، ثم تستعمل الأهداب لجلب المواد المهضومة إلى أفواهها.
 - كثير من القنافذ البحرية تستعمل صفائح شبيهة بالأسنان، لكشط الطحالب عن السطوح.
 - يمد العديد من خيار البحر لوامسه المتفرعة والمغطاة بالمخاط للإمساك بالغذاء الطافي.

التنفس والدوران والإخراج

تستعمل شوكيات الجلد **أقدامها الأنبوبية** للتنفس؛ وفي بعضها ينتشر الأكسـجين عبر جميع **أغشية الجسـم** الرقيقة الملاصقة للماء. ولبعضها الآخر **خياشـيم** ذات جدر جلدية رقيقة (تجاويف صغيرة تمتد من الجسـم). ولخيار البحر أنابيب متفرعة تسمى **الشجرة التنفسية،** يمر خلالها الماء، ومنها ينتقل الأكسجين المذاب في الماء إلى الجسـم.

تحدث الدورة الدموية في التجويف الجسمي والجهاز الوعائي المائي، في حين يحدث إخراج الفضلات الخلوية **بالانتشـار** عبر أنسـجة الجسـم عبر أجهزة الجسم المختلفة لإخراج الفضلات في بعض شوكيات الجلد.

الاستجابة للمثيرات

- تحيط بالفم حلقة عصبية مع خلايا عصبية متفرعة تتصل بباقي أجزاء الجسم.
- تستجيب الخلايا الحسية العصبية للمس، وللمواد الكيميائية المذابة في الماء، ولتيارات المـاء، وللضوء.
 - يوجد على النهايات الطرفية لنجم البحر **بقع عينية**، وهي مجموعة من الخلايا الحساسـة للضوء.
- كثير من شـوكيات الجلد تستطيع الإحساس في اتجاه الجاذبية؛ فنجم البحر مثلا يعود إلى وضعه الطبيعي بعدما ينقلب بفعل الأمواج أو التيارات.

الحركة

تتنوع طريقة الحركة في شـوكيات الجلد بحسـب أشكال الجسم. وتمكن **الصفائح العظمية** المتحركة في الهيكل الداخلي لشـوكيات الجلد من الحركة بسهولة.

التكاثر والنمو

تتكاثر أغلب شوكيات الجلد **جنسيًا**، حيث تضع الأنثى البيض، ويقـوم الذكر بإفراز الحيوانات المنوية في الماء، ثـم يحدث الإخصاب. وتنمـو البيضة المخصبة إلى يرقة تسـبح بحرّية. وهي ذات تناظر جانبي. وبعد مـرور اليرقة بعدة مراحل من التغيرات تنمو إلى حيوان بالغ له تناظر شعاعي.



الكثير من شوكيات الجلد -ومنها نجم البحر الهش- تستطيع التخلص من أحد أخرعها عندما يهاجمها مفترس، وبعضها الآخر -ومنه خيار البحر- قادر على إخراج جزء من الأعضاء الداخلية عندما يتعرض للخطر، مما يمكنّه من الهروب مسببًا تشويشًا وإرباكًا للمفترس. ومن الممكن أن تتجدد جميع أجزاء الجسم التي فقدت.

تنوع شوكيات الجلد Echinoderm Diversity

تشتمل الطوائف الرئيسة لشوكيات الجلد على كل من:



- لما خمس أذرع غاليًا.
- لها أقدام أنبوبية تستعمل للتغذى والحركة.
- لا يشكل نجم البحر غذاءً لأي مفترس بحري، بسبب جلده الشوكى.
 - خمس أذرع غالباً.
 - تنكسر الأذرع بسهولة ويمكن تجددها.
 - تتحرك بحركة أذرعها.
 - لا تحتوى الأقدام الأنبوبية على ممص كأسى.





قنفذ البحر. دولار الرمل.



• جالسة في بعض فترات حياتها.

• يحفر دولار البحر في الرمل.

• لبعض زنابق البحر ساق طويلة.

لنجـم البحر الريشى أذرع طويلة متشعبة.

• الجسم مغطى بهيكل داخلي مع أشواك.

• يحفر قنفذ البحر في المناطق الصخرية.



٤- الزنبقيات

زنابق البحر. نجم البحر الريشى.



خيار البحر

شكله يشبه ثمرة الخيار.

• الجسم مغطى بطبقة جلدية.

تحورت الأقدام الأنبوبية إلى لوامس قرب الفم.

• خيار البحر الوحيد من شوكيات الجلد الذي له أعضاء تنفس على شكل شجرة تنفسية.

• قطره أقل من 1 cm.

اللؤلئية البحرية (أقحوان البحر)

فوائد

٦- اللؤلئيات

• لا أذرع لما.

• توجد الأقدام الأنبوبية حول قرص مركزي.

اكتشفت عام 1986 قبالة شواطئ نيوزلندا، ويصعب تصنيفها

⊕ ماذا قرأت؟

الأخرى؟

حدد ما التراكيب التنفسية التي

تميز خيار البحر عن شوكيات الجلد

ودراستها؛ لقلة ما وجد منها.

أهمية شوكيات الجلد Importance of Echinoderms

- يشـكل خيار البحر وقنفذ البحر مصدر غذاء لسـكان بعض البلدان الآسيوية.
- يشكل بعض شـوكيات الجلد علاقة تعايش مع بعض الحيوانات البحرية الأخرى.
- يعتمد النظام البيئي البحري على بعض شوكيات الجلد. ويتأثر بتناقص أعدادها.
 - قد تغير بعض شوكيات الجلد النظام البيئي البحري. مضارّ
- تتغذى قنافذ البحر على غابات عشب البحر، فيؤدى ذلك إلى تدمير بيئات الأسماك والقواقع.



اختيار من متعدد

١- أي مما يأتي يُعدّ بيئة لشوكيات الجلد؟

٢- أي مما يأتي يصف تناظر شوكيات الجلد؟

اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة في كل مما يأتي:

اه العذبة. ب) مياه البحر. ج) التربة الرطبة. د) التربة الصخرية.) المي

أ) جانبي في مرحلتي اليرقة والبلوغ. ب) جانبي في مرحلة اليرقة وشعاعي في مرحلة البلوغ.

ج) شعاعي في مرحلتي اليرقة والبلوغ. د) شعاعي في مرحلة اليرقة وجانبي في مرحلة البلوغ.

٣- أي شوكيات الجلد الآتية لها شجرة تنفسية مع العديد من التفرعات؟

٤- ما الوظائف الثلاث التي تقوم بها القدم الأنبوبية؟

أ) تكاثر، تغذّ، تنفس. ب) تغذّ، تنفس، تنظيم عصبي. ج) تغذّ، تنفس، حركة. د) نمو جنيني، تنفس، تكاثر.

استخدام المفردات

استخدم قائمة المفردات لإكمال الجمل أدناه:

الزنابق البحرية - النظام الوعائي المائي - لواقط قدمية - القنافذ البحرية - الأقدام الأنبوبية – الشجرة التنفسية.

!	_ أنابيب صغيرة وعضلية تمتلئ بالسـائل، وتنتهي بممص.
	ونجم البحر الريشي تمد أذرعها للإمساك بالغذاء.
r	تراكيب صغيرة تساعد على الإمساك بالغذاء، وعلى إزالة المواد الغريبة عن الجلد.
8	يتكون من أنابيب مغلقة مملوءة بسائل، تعمل معًا لتمكّن الحيوان من الحركة والتغذي.
۵- کثیر من	تستعمل صفائح شبيهة بالأسنان، لكشط الطحالب عن السـطوح.
يمتلك خيار البحر أ	نابيب متفرعة تسمى يمر من خلالها الماء حاملًا الأكسجين للجسم.

أكمل الجدول بوضع إشارة ✔ في العمود المناسب أمام كل عبارة فيما يأتي.

اللؤلئيات	الزنبقيات	القثائيات	القنفذيات	الثعبانيات	النجميات	الوصف
						١- لها خمسة أذرع.
						٢- لأذرعها القدرة على الانفصال
						والتجدد.
						٣- شكل ثمرة الخيار.
						٤- جالسة في فترة حياتها.
						0- الجسم مغطى بهيكل داخلي مع
						أشواك.
						٦- تتحرك باستخدام الأذرع.
						۷- الجسم مغطى بطبقة جلدية.
						٨- تختبئ في المناطق الصخرية وفي
						الرمل.
						٩- سيقان طويلة وأذرع طويلة
						متشعبة.
						١٠- توجد الأقدام الأنبوبية حول قرص
						مرکزي.
						١١- لا أذرع لها.
						١٢- أقدام أنبوبية للتغذي والحركة.

الدرس الثانى: اللافقاريات الحبلية



الكتاب صفحة 22


* الفكرة الرئيسة

اللافقاريات الحبلية لها صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.

صفات اللافقاريات الحبلية

- اللافقاریات الحبلیة -ومنها السهیم والکیسیات- ثانویة الغم.





الحبليات Chordates حيوانات تتبع شعبة الحبليات، لها أربع صفات مميزة: (حبل عصبي ظهري أنبوبي، وحبل ظهري، وجيوب بلعومية، وذيل خلف شـرجي) تظهر فـي أوقات ما خلال فترة نموها.

جميع الحبليات قد يكون لها بعض أشـكال الغدة الدرقية، ولها تجويف جسمي حقيقي، وجسمها مقسم إلى قطع.



الحبل الظهري notochord:

- مرن، وشكله يشبه الخيط، ويمتد على طول الجسم، ويوجد تحت الحبل العصبي الظهري الأنبوبي.
- - يمكّن الحيوانات من القيام بحركات جانبية للجسم والذيل، (مثل السباحة في الأسماك).

الذيل خلف الشرجى Postanal tail:

- يستعمل للحركة، ويقع خلف الجهاز الهضمي والشرج.
- في معظم الحبليات يمتد الذيل إلى ما بعد فتحة الشرج.

الحبل العصبي الظهري الأنبوبي Dorsal tubular nerve cord:

- يوجد في غير الحبليات في الجهة البطنية، أو أسـفل الجهـاز الهضمي، وهي مصمتـة.
 - أما في الحبليات فيوجـد فوق الجهاز الهضمي، ويتخذ شـكل أنبوب أجوف.
- خلال نمو أغلب الحبليات ينمو الطرف الأمامي للأنبوب ليكوّن **الدماغ**. أما الطرف الخلفي فيكون **الحبل الشوكي.**

الجيوب (الأكياس) البلعومية pharyngeal pouch:

هي أزواج من التراكيب في جميع الأجنة، تربط الأنبوب العضلي الواصل بين التجويـف الفمي والمريء.

تحوي الجيوب في **الحبليات المائية** شقوقا تفتح إلى الخارج. وقد تخصصت هذه التراكيب في ترشيح الغذاء، وإلى خياشيم لتبادل الغازات في الماء.

أما في الحبليات التي تعيش على **اليابسة** فلا تحتوي الجيوب البلعومية على شقوق، بل تخصصت جينياً إلى تراكيب أخرى، مثل لوزتى الحلق والغدة الزعترية.

الغدة الدرقية thyroid gland:


- تركيب ينظم الأيض والنمو والتكون الجنيني.
- تحوى اللافقاريات الحبلية قناة داخلية endostyle تفرز خلاياها بروتينات شبيهة بما تفرزه الغدة الدرقية.
 - الفقاريات الحبلية هي المخلوقات الوحيدة التي لها غدة درقية.

تنوع اللافقاريات الحبلية

جميعها حيوانـات بحرية. ويوجد 23 نوعًا من السهيم في شعبة حبليات الرأس، وتضم حبليات الذيل 1250 نوعا من الكيسيات.

السهيم:

حيوان صغير، يشبه السمكة، لكنه دون قشور، ويدفن جسمه في الرمل في مياه البحر الضحلة. يفتقر السهيم إلى الألوان في جلده، ويتكون الجلد من **طبقة واحدة** من الخلايا شفافة اللون. ويمكن مشاهدة حركة مرور الماء داخل الجسم.




وللحصول على الغذاء يدخل الماء فم السهيم، ويمر خلال الشقوق الخيشومية البلعومية؛ حيث يرشح الغذاء (**ترشيحي التغذي**)، ثم يمر إلى تركيب ُهضم، ثم يخرج الماء من خلال الشقوق الخيشومية. يختلف السهيم عن الفقاريات في عدم وجـود رأس أو أعضاء حس إلا مستقبلات الضوء ولوامس حسية صغيرة قرب الفم. يتركب الجهاز العصبي من أعصاب رئيسة متفرعة، ودماغ بسـيط فـي مقدمة الحيوان. يمر الدم عبر الجسـم بضخه في الأوعيـة الدموية، حيث لا يوجد قلب حقيقي. والجنس منفصل في السهيم، والتلقيح فيه خارجي.

الكيسيات (القميصيات):

سميت كذلك لوجود طبقة خارجية سميكة تسمى القميص تشبه الكيس، وتغطي جسم الحيوان الصغير. تعيش أغلب الكيسيات في المياه الضحلة، وبعضها يعيش في تجمعات على قاع المحيط. وتكون الكيسيات عموماً جالسة غير متحركة، وتظهر فيها الصفات المماثلة للحبليات فقط في مرحلة اليرقة.

والكيسيات **خناث** (تنتج كلا من البيـوض والحيوانات المنوية)، والتلقيح فيها خارجي.



لماذا تسمى الكيسيات بخاخات الماء؟

عندما تَهدَّد أو تشعر بالخطر تكون قادرة على إخراج سيل من الماء بقوة عبر السيفون الزفيري، فتشوش على المفترس القوي.

اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة في كل مما يأتي:

١- أي مما يأتي يُعدّ من اللافقاريات الحبلية؟

٢- أي مما يأتي يوجد في الحبليات خلال فترة من حياتها؟

أ) حبل ظهري، جهاز وعائى مائى، جيوب بلعومية، ذيل خلف شـرجى.

ب) قمیص، جیوب بلعومیة، حبل شوکی ظهري أنبوبی، ذیل خلف شـرجی.

ج) أقدام أنبوبية، حبل ظهري، جيوب بلعومية، ذيل خلف شـرجى


د) حبل شوكي ظهري أنبوبي، حبل ظهري، جيوب بلعومية، ذيل خلف شـرجي.

٣- شوكيات الجلد ذات صلة بالحبليات. أيّ الصفات الآتية تشتركان فيها؟

أ) لهما جيوب بلعومية. ب) بدائية الفم. ج) ثانوية الفم. د) تجويف جسمى كاذب.

٤- أي التراكيب الآتية في الحبليات يكوّنها الطرف الأمامي للحبل العصبي الظهري الأنبوبي؟

أ) الدماغ. ب) العضلات. ج) أعضاء الهضم. د) الحبل الشوكي.



استخدم الشكل الآتي للإجابة على السؤالين 0 و ٦.

0- أيّ التراكيب حل محله عظم أو غضروف في الفقاريات الحبلية؟

.5 (ع ص ع ع ع ص ع ع ع ص ع ا

٦- أيّ التراكيب يعد من الأعصاب محمية بسائل؟

أ) 1. ب) 3. ح) 5.

استخدم المفردات التالية لكتابة أسماء الأجزاء على الشكل أدناه:

شرج جيوب بلعومية ذيل خلف شرجي حبل ظهري فم قطع عضلية حبل عصبي ظهري أنبوبي الغدة الدرقية

